

中医/中西医执业（助理）金题



关注【金英杰医学教育】公众号，领取更多笔试资料

1:孕妇应慎用的药物是

A.金银花

B.连翘

C.牛黄

D.鱼腥草

E.蒲公英

答案:

解析:C

孕妇应慎用有通经祛瘀、行气破滞、活血堕胎作用，辛热性质的药物，如茅根、木通、瞿麦、通草、薏苡仁、赭石、芒硝、桃仁、牡丹皮、三棱、牛膝、干姜、肉桂、半夏、皂角、南星、槐花、蝉蜕、牛黄等，都属于妊娠期慎用药。故本题选 C。

2 肉豆蔻与白豆蔻均具有的功效是

- A. 涩肠止泻，下气平喘
- B. 温中散寒，行气消胀
- C. 温中行气，燥湿止带
- D. 收敛固涩，制酸止痛
- E. 涩肠止泻，敛肺止咳

答案:

解析:B

肉豆蔻功能温中，行气；煨用止泻。白豆蔻功能化湿，行气，温中，止呕。故本题选 B。

3 具有清热利湿是功效的药物

- A. 丹参
- B. 牛膝
- C. 苏木
- D. 姜黄
- E. 虎杖

答案:

解析:E

丹参功能活血祛瘀，凉血消痈，除烦安神。牛膝功能活血祛瘀，补肝肾，强筋骨，引血下行，利尿通淋。苏木功能活血疗伤，祛瘀通经。姜黄功能活血行气，通络止痛。虎杖功能利胆退黄，清热利湿，解毒，活血祛瘀，清肺祛痰。故本题选 E。

4 性微寒的行气药是

- A. 木香
- B. 香附
- C. 沉香
- D. 薤白
- E. 枳实

答案:

解析:E

木香辛苦，温。香附辛苦，平。沉香辛苦，温。薤白辛苦，温。枳实辛苦，微寒。故本题选 E。

5 中阳衰微，胃有寒湿者忌用的药物是

- A. 太子参
- B. 西洋参
- C. 益智仁
- D. 菟丝子
- E. 山药

答案:

解析:B

6 西洋参药性寒，能伤湿碍中，故中阳衰微，胃有寒湿者忌用。故本题选 B。

患者外感风寒，恶寒发热，无汗，腹痛，吐泻，舌苔白腻，治疗宜选用

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 香薷
- D. 防风
- E. 白芷

答案:

解析:C

7 香薷用于风寒表证、湿阻中焦证及水肿。故本题选 C。

知母不宜用于

- A. 肠燥便秘者
- B. 骨蒸潮热者
- C. 脾虚便溏者
- D. 肺热咳嗽者
- E. 内热消渴者

答案:

解析:C

8 知母性寒润，能滑肠，故脾虚便溏者尤应慎用。故本题选 C。

下列哪项属于合欢皮的功效

- A. 养心益肝
- B. 活血消肿
- C. 宁心安神
- D. 祛痰开窍
- E. 消散痈肿

答案:

解析:B

合欢皮【功效】解郁安神，活血消肿。

9 补气养血药中加入适量肉桂，其主要目的是

- A. 引火归原
- B. 补而不滞
- C. 散寒止痛
- D. 鼓舞气血生长
- E. 以上都不是

答案:

解析:D

久病体虚气血不足者，在补益气血方中加入少量肉桂，可鼓舞气血生长。

10 性寒滑肠，气虚便溏者慎用的药物是

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 柴胡
- D. 桑叶
- E. 蝉蜕

答案:

解析:B

牛蒡子：药性辛、苦、寒。归肺、胃经。辛苦性寒，于升浮之中又有清降之性，能外散风热，内解热毒，有清热解毒，消肿利咽之效，故可用治痈肿疮毒，丹毒，疔腮喉痹等热毒病证。因其性偏滑利，兼滑肠通便，故上述病证兼有大便秘结不通者尤为适宜。本品性寒，滑肠通便，气虚便溏者慎用。

题型:A1 型题

题目：

11 胶艾汤主治证的病机是

- A. 冲任虚损
- B. 脾阳不足
- C. 血热妄行
- D. 肝火犯肺
- E. 下焦瘀热

答案：

解析:A

胶艾汤有止血调经安胎之功用，用于妇女冲任虚损，崩漏下血之证。故本题选 A。

题型:A1 型题

题目：

12 温经汤《金匮要略》主治证候的病因病机是

- A. 五劳虚极
- B. 产后血虚受寒
- C. 冲任虚损
- D. 下焦蓄血
- E. 冲任虚寒，瘀血阻滞

答案：

解析:E

温经汤功能温经散寒，养血祛瘀，主治冲任虚寒，瘀血阻滞证。故本题选 E。

题型:A1 型题

题目：

13 下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是

- A. 大定风珠
- B. 消风散
- C. 川芎茶调散
- D. 地黄饮子
- E. 羚角钩藤汤

答案：

解析:B

消风散的组成药物有当归、生地、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草、木通。故本题选 B。

题型:A1 型题

题目：

14 枳术丸的功用是

- A. 行气化滞
- B. 消食导滞
- C. 消痞除薇
- D. 燥湿和胃
- E. 健脾消痞

答案:

解析:E

枳术丸消食健脾，主治脾胃虚弱，饮食停滞，脘腹胀满，不思饮食等证。故本题选 E。

题型:A1 型题

15 黄连解毒汤中栀子的配伍意义最准确的是

- A. 清上焦肺热
- B. 清泻心火以除烦
- C. 泻三焦之火从小便而出
- D. 清大肠湿热
- E. 清胃热

答案:

解析:C

黄连解毒汤

佐药

栀子：通泻三焦之火，导热下行，引邪热从小便而出

题型:A1 型题

题目:

16 《脾胃论》中清胃散的组成包括

- A. 当归身、牡丹皮
- B. 黄连、石斛
- C. 生地、麦冬
- D. 生地、生石膏
- E. 麦冬、生石膏

答案:

解析:A

清胃散的组成包括：生地黄、黄连、当归身、牡丹皮、升麻。《医方集解》中的清胃散含有生石膏，其清胃之力更强。

17 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余的药物是

- A. 熟地、鹿角霜、炮姜、桂枝、生甘草
- B. 生地、真阿胶、姜炭、桂枝、细辛
- C. 熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、生甘草

- D.熟地、龟板胶、干姜、肉桂、川芎
- E.生地、鹿角胶、炮姜、细辛、炙甘草

答案:

解析:C

阳和汤中用的是姜炭，肉桂，生甘草。

题型:A1 型题

18 善于治疗脾不统血，皮下紫癜的方剂是

- A.犀角地黄汤
- B.化斑汤
- C.归脾汤
- D.黄土汤
- E.温脾汤

答案:

解析:C

归脾汤主治：①心脾气血两虚证。心悸怔忡，健忘失眠，盗汗，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱。②脾不统血证。便血，皮下紫癜，妇女崩漏，月经超前，量多色淡，或淋漓不止，舌淡，脉细弱。

题型:A1 型题

题目:

19 八珍汤中的君药是

- A.太子参、白术
- B.党参、黄芪
- C.党参、当归
- D.人参、黄芪
- E.人参、熟地

答案:

解析:E

八珍汤君药：人参、熟地黄--益气养血。

题型:A1 型题

题目:

对天王补心丹的组成药物“二仁”描述正确的是

- A.柏子仁、酸枣仁
- B.郁李仁、砂仁
- C.酸枣仁、草果仁
- D.柏子仁、郁李仁
- E.柏子仁、砂仁

A

天王补心丹二仁指柏子仁、酸枣仁。

题型:A1 型题

题目:

20 固经丸的主治是

- A.脾肾阳虚之肾泄证
- B.心肾两虚证
- C.阴虚血热之崩漏
- D.脾肾亏虚，冲脉不固证
- E.肾虚湿热带下

答案:

解析:C

固经丸

【功用】滋阴清热，固经止血。

【主治证候】阴虚血热之崩漏。月经过多，或崩中漏下，血色深红或紫黑稠黏，手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数。

题型:A1 型题

题目:

21 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A. 生后 5~6 天出现，30~35 天完全消退
- B. 生后 3~4 天出现，21~28 天完全消退
- C. 生后 3~4 天出现，15~20 天完全消退
- D. 生后 2~3 天出现，10~14 天完全消退
- E. 生后 1~2 天出现，3~7 天完全消退

答案:

解析 B

生理性黄疸出现时间较晚，黄疸持续时间较短，足月儿生后 2~3 天出现，10~14 天完全消退，早产儿生后 3~4 天出现，21~28 天完全消退。黄疸程度较轻，以未结合胆红素为主，结合胆红素 $<26\mu\text{mol/L}$ 。无伴随病症，一般全身情况好。病理性黄疸出现时间较早，黄疸持续时间较长，黄疸程度较重，黄疸进展快，均有伴随病症。

题型:A1 型题

题目:

22 小儿感冒容易出现兼证，多见

- A. 夹火、夹痰、夹湿
- B. 夹火、夹痰、夹滞
- C. 夹风、夹痰、夹滞
- D. 夹惊、夹痰、夹滞
- E. 夹湿、夹惊、夹滞

答案:

解析 D

小儿上呼吸道感染常见兼夹证：夹痰、夹滞、夹惊。

题型:A1 型题

题目:

23 下列哪项不属于反复呼吸道感染的诊断标准

- A. 年龄 0~2 岁, 上呼吸道感染每年 7 次, 下呼吸道感染每年 3 次
- B. 年龄 2~3 岁, 上呼吸道感染每年 5 次, 下呼吸道感染每年 3 次
- C. 年龄 3~5 岁, 上呼吸道感染每年 6 次, 下呼吸道感染每年 2 次
- D. 年龄 6~12 岁, 上呼吸道感染每年 5 次, 下呼吸道感染每年 2 次以上
- E. 上呼吸道感染第 2 次距第 1 次至少要间隔 7 天以上

答案:

解析 B

反复呼吸道感染的诊断标准: ①年龄 0~2 岁, 上呼吸道感染每年 7 次, 下呼吸道感染每年 3 次。②年龄 3~5 岁, 上呼吸道感染每年 6 次, 下呼吸道感染每年 2 次。③年龄 6~12 岁, 上呼吸道感染每年 5 次, 下呼吸道感染每年 2 次以上。④上呼吸道感染第 2 次距第 1 次至少要间隔 7 天以上。

题型:A1 型题

题目:

24 足月男婴。出生后 7 小时即出现身黄, 目黄, 哭闹不安, 呕吐, 乳食不思, 尿黄, 稍伴发热, 舌质红, 苔黄稍腻, 指纹紫滞。治宜选用的药物是

- A. 茵陈理中汤加减
- B. 茵陈蒿汤加减
- C. 膈下逐瘀汤加减
- D. 羚角钩藤汤合茵陈蒿汤加减
- E. 黄连解毒汤加减

答案:

解析 B

湿热熏蒸证的证候: 主要表现为阳黄, 目黄、身黄, 其黄鲜明, 哭闹不安, 呕吐腹胀, 乳食不思, 尿黄便秘, 或伴有发热, 舌质红, 苔黄腻, 指纹紫滞。治法: 清热利湿退黄。方药: 茵陈蒿汤加味。

题型:A1 型题

题目:

25 小儿急性支气管炎风寒咳嗽证的首选方剂是

- A. 二陈汤
- B. 杏苏散
- C. 小青龙汤
- D. 三拗汤
- E. 麻黄汤

答案:

解析 B

小儿急性支气管炎风寒咳嗽证: 杏苏散, 风寒夹痰: 三拗汤+二陈汤。

题型:A1 型题

题目:

26 病毒性心肌炎的主要病原体是

- A. 埃可病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 肠道病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 流感病毒

答案:

解析 B

病毒性心肌炎是指由柯萨奇病毒、孤儿病毒（ECHO）、脊髓灰质炎、流感病毒感染引起的心肌局限性或弥漫性的急性或慢性炎症病变，属于感染性心肌疾病。

题型:A1 型题

题目:

27 小儿肺炎按病因分类，下列错误的是

- A. 大叶性肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 病毒性肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 细菌性肺炎

答案:

解析 A

小儿肺炎按病因可分为感染因素引起的肺炎，如细菌性肺炎、病毒性肺炎、支原体肺炎、衣原体肺炎、真菌性肺炎；非感染因素引起的肺炎，如吸入性肺炎、坠积性肺炎、嗜酸性粒细胞性肺炎等。

题型:A1 型题

题目:

28 多数急性肾小球肾炎患儿镜下血尿消失的时间是

- A. 1~2 周内
- B. 2~4 周内
- C. 1~2 个月
- D. 2~3 个月
- E. 3~6 个月

答案:

解析 E

多数急性肾小球肾炎患儿镜下血尿消失的时间是 3~6 个月。

题型:A1 型题

题目:

29 化脓性脑膜炎的常见并发症不包括

- A. 硬膜下积液
- B. 脑室管膜炎
- C. 脑栓塞
- D. 脑性低钠血症
- E. 脑积水

答案:

解析 C

化脓性脑膜炎常见并发症为：硬膜下积液、脑室管膜炎、脑性低钠血症、脑积水。

题型:A1 型题

题目：

30 以下哪项不是化脓性脑膜炎急性期抗生素使用的正确原则

- A. 早期用药
- B. 足量用药
- C. 足疗程用药
- D. 急性期静脉用药
- E. 口服用药

答案：

解析 E

31 对于化脓性脑膜炎患儿应尽早使用抗生素，以静脉给药为主，所选用药物应对血脑屏障有良好的通透性，治疗用药量要足，疗程要适当，联合用药时要注意药物之间的相互作用，注意药物的毒副作用。

题型:A1 型题

题目：

大量腹水而肝、脾难以触及时最适用

- A. 浅部触诊
- B. 深部滑行触诊
- C. 双手触诊
- D. 深压触诊
- E. 冲击触诊

答案：E

解析：深部滑行触诊：主要适用于腹腔深部包块和胃肠病变的检查。双手触诊：适用于肝、脾、肾、子宫和腹腔肿物的检查。深压触诊：用于探测腹部深在病变部位或确定腹腔压痛点。冲击触诊：适用于大量腹水而肝、脾难以触及时。

题型:A1 型题

题目：

32 下列除哪项外，均可为正常的叩诊音

- A. 震水音
- B. 浊音
- C. 鼓音
- D. 清音
- E. 实音

答案：A

解析：常见叩诊音（见下表）：叩诊音生理情况病理状态清音正常肺部的叩诊音—浊音肺的边缘所覆盖的心脏或肝脏部分肺组织含气量减少（如肺炎）鼓音泡区及腹部胃肺空洞、气胸或气腹过清音—肺气肿实音心脏、肝脏大量胸腔积液或肺实变—

题型:A1 型题

题目：

33 结膜有散在出血点可见于

- A. 脑水肿
- B. 贫血
- C. 黄疸
- D. 亚急性感染性心内膜炎
- E. 结膜炎

答案: D

解析: 发红、水肿、充血——结膜炎、角膜炎、沙眼早期; 苍白——贫血; 发黄——黄疸; 有滤泡或乳头——沙眼; 有散在出血点——亚急性感染性心内膜炎; 结膜下片状出血——出血性疾病、高血压、动脉硬化; 球结膜下水肿——脑水肿或输液过。

题型:A1 型题

题目:

34 下列疾病, 常使气管移向患侧的是

- A. 胸膜粘连
- B. 胸腔积气
- C. 大量胸腔积液
- D. 肺气肿
- E. 纵隔肿瘤

答案: A

解析: 大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及不对称性甲状腺肿大, 可将气管推向健侧; 肺不张、肺硬化、胸膜粘连等可将气管拉向患侧。

题型:A1 型题

题目:

35 心尖搏动增强可见于

- A. 心包积液
- B. 重症贫血
- C. 心肌炎
- D. 气胸
- E. 肺气肿

答案: B

解析: 心尖搏动增强可见于左心室肥大、甲亢、重症贫血及发热等疾病。

题型:A1 型题

题目:

36 肛门直肠指诊, 发现质地坚硬、表面凹凸不平的包块。见于

- A. 肛门直肠周围脓肿
- B. 肛裂与感染
- C. 直肠息肉
- D. 直肠癌
- E. 炎症并有组织破坏

答案: D

解析: 有剧烈触痛见于肛裂与感染; 触痛并有波动感见于肛门、直肠周围脓肿; 柔软光滑而有弹性包块见

于直肠息肉；质地坚硬、表面凹凸不平的包块见于直肠癌；指套带有黏液、脓液或血液见于炎症并有组织破坏。

题型:A1 型题

题目:

37 中枢性瘫痪的特点是

- A. 不出现病理反射
- B. 腱反射减弱
- C. 浅反射消失
- D. 肌张力降低
- E. 肌张力增强

答案: E

解析: 中枢性瘫痪, 瘫痪分布范围广, 单瘫、偏瘫、截瘫; 肌张力增强, 肌萎缩不明显; 腱反射亢进; 有病理反射; 无肌束颤动。

题型:A1 型题

题目:

38 下列各项, 属被动体位的是

- A. 角弓反张
- B. 翻动体位
- C. 肢体瘫痪
- D. 端坐呼吸
- E. 以上均非

答案: C

解析: 被动体位是指患者不能自己调整和变换肢体和躯干的位置, 见于极度衰弱和意识丧失者。故选 C。

题型:A2 型题

题目:

39 患者咳嗽。查体: 右侧呼吸动度减弱, 右下肺叩诊出现浊音。听诊可闻及支气管呼吸音。应首先考虑的是

- A. 右下肺不张
- B. 右下肺实变
- C. 右侧胸腔积液
- D. 右侧气胸
- E. 肺气肿

答案: B

解析: 右下肺受肝脏影响叩诊稍浊, 如在正常肺泡呼吸音部位听到支气管呼吸音即为异常支气管呼吸音, 或称管状呼吸音。常见于肺组织实变、肺内大空腔、压迫性肺不张。故选 B。

题型:A1 型题

题目:

40 心室收缩时颈静脉有搏动, 可见于

- A. 高血压病

- B.严重贫血
- C.三尖瓣关闭不全
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.甲状腺功能亢进症

答案：C

解析：如安静状态下出现明显的颈动脉搏动，提示心排血量增加或脉压增加的疾病，常见于甲状腺功能亢进症、高血压、主动脉瓣关闭不全或严重贫血等。如颈静脉在心室收缩期显著地搏动，提示三尖瓣关闭不全，心室收缩时血液从右心室向右心房方向返流。故选 C。

41 气血虚弱型闭经的临床表现下列不正确的是

- A.月经 2 个月未潮
- B.心悸气短
- C.倦怠神疲
- D.头晕乏力
- E.舌淡脉弱

【答案】：A

【解析】：闭经的临床表现：女子年逾 16 周岁，月经尚未来潮，或月经来潮后 1 年余，或已建立月经周期后，又中断 6 个月以上者。闭经气血两虚主要证候：月经周期延迟、量少、色淡红、质薄，渐至经闭不行；神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄；舌淡，苔薄，脉沉缓或细。

42 下列各项，不属放置宫内节育器禁忌证的是

- A.滴虫性阴道炎
- B.月经过多
- C.重度痛经
- D.宫颈口松
- E.足月产后 3 月

【答案】：E

【解析】：宫内节育器禁忌证：生殖器官炎症，如急性盆腔炎、阴道炎症、重度宫颈糜烂等；月经紊乱，如近 3 个月月经过多、月经频发或不规则阴道出血、重度痛经等；生殖器肿瘤、宫颈口过松、重度子宫脱垂等；严重的全身性疾病，如心力衰竭、重度贫血等；严重的出血性疾病。

43 月经将至或正值经期的脉象是

- A.脉细无力
- B.脉缓滑
- C.脉细数
- D.脉沉弱
- E.脉多滑利

【答案】：E

【解析】：月经脉：月经将至或正值月经期，脉多呈滑象，为月经常脉

44 首先提出“妇人以血为基本”的观点的著作是

- A.《经效产宝》
- B.《妇人大全良方》
- C.《证治准绳女科》
- D.《傅青主女科》
- E.《医宗金鉴》

【答案】：B

【解析】：《妇人良方大全》首先提出“妇人以血为基本”的观点，妇产科史上的划时代巨著。

45 带下过多的主要发病机理是

- A.外感湿邪，损及任、带，约固无力
- B.肾气不足，封藏失职，阴液滑脱而下
- C.湿邪影响任带，任脉不固，带脉失约
- D.脾虚生湿，流注下焦，伤及任带
- E.肝经湿热，流注下焦，伤及任带

【答案】：C

【解析】：带下过多的主要病机是湿邪伤及任带二脉，使任脉不固，带脉失约。湿邪是导致本病的主要原因

B.

【传染病学】

46 乙脑最常见和最早出现的症状是（ ）

- A.高热
- B.头痛
- C.呕吐
- D.颈项强直
- E.意识障碍

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

头痛是乙脑最常见和最早出现的症状【医学教育网原创】，疼痛部位不定。

故本题答案选 B。

【方剂学】

47 下列各项，不属苏合香丸主治证候是（ ）

- A.心腹卒痛
- B.高热烦躁
- C.牙关紧闭
- D.苔白
- E.脉迟

答案及解析：本题答案选 B。

苏合香丸属于温开剂。

功用：芳香开窍，【医学教育网原创】行气止痛。

主治：寒闭证。突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟。亦治心腹卒痛，甚则昏厥，属寒凝气滞者。

故本题答案选 B。

【诊断学基础】

48 住院病人的所有记录中，记录最完全、内容最丰富的是（ ）

- A.入院记录
- B.病程记录
- C.首次病程记录
- D.住院记录
- E.转科记录

答案及解析：本题答案为 D。

住院病人的所有记录中【医学教育网原创】，记录最完全、内容最丰富的是住院记录。

故本题答案选 D。

【中医内科学】

49 虚劳证，咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，苔薄白，脉弱。辨证应属（ ）

- A.肺阴虚证
- B.肺气虚证
- C.心气虚证
- D.脾气虚证
- E.肾气虚证

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案选 B。

虚劳之肺气虚证【医学教育网原创】

证候主症：咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，面白。

故本题答案选 B。

【中医儿科学】

50 下列哪项不是蛔厥证的临床症状（ ）

- A.腹部突然绞痛，主要在胃脘及右肋下
- B.伴恶心呕吐，常吐出蛔虫
- C.肢冷汗出
- D.腹胀腹痛，腹部有包块，推之移动
- E.疼痛可暂时缓解减轻

答案及解析：本题选 D。

蛔厥证

证候：有肠蛔虫症状，突然腹部绞痛，弯腰屈背，辗转不宁，肢冷汗出，恶心呕吐，常吐出胆汁或蛔虫。腹部绞痛呈阵发性，疼痛部位在右上腹或剑突下，疼痛可暂时缓解减轻，但又反复发作。重者腹痛持续而阵发性加剧，可伴畏寒发热，甚至出现黄疸。舌苔多黄腻，脉弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继则驱虫。

代表方剂：乌梅丸。

故本题答案选 D。

61. 脊柱后凸多发生于

- A.颈段脊柱
- B.胸段脊柱
- C.腰段脊柱
- D.骶段脊柱
- E.腰段及骶段脊柱

【正确答案】B

【答案解析】脊柱后凸多发生于胸段，见于佝偻病、脊柱结核、强直性脊柱炎、脊柱退行性变等。

62. 关于脊柱压痛的检查方法，下列正确的是

- A.取端坐位
- B.取半卧位
- C.取平卧位
- D.取侧卧位
- E.取蹲位

【正确答案】A

【答案解析】检查脊柱压痛时，患者取坐位，身体稍向前倾，医师用右手拇指自上而下逐个按压脊椎棘突及椎旁肌肉。

63. 可以使气管移向健侧的疾病为

- A. 一侧肺不张
- B. 一侧肺硬化
- C. 胸膜粘连
- D. 胸腔积液
- E. 肺气肿

【正确答案】D

【答案解析】气管检查：正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连时，气管被牵拉向患侧。

64. 下列不出现气管移位的是

- A. 气胸
- B. 胸腔积液
- C. 肺不张
- D. 肺气肿
- E. 胸膜肥厚粘连

【正确答案】D

【答案解析】气管检查：正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连时，气管被牵拉向患侧。

65. 关于颈部血管的检查，错误的是

- A. 当正常人立位和坐位时，颈外静脉不显露
- B. 颈动脉搏动，提示心排血量增加或脉压增大。
- C. 左心衰竭时可见到颈静脉怒张
- D. 心包积液时可见颈静脉怒张
- E. 上腔静脉梗阻时可见颈静脉怒张

【正确答案】C

【答案解析】正常人安静坐位或立位时，颈外静脉不显露，平卧时可见稍充盈。如果在坐位或半卧位(上半身与水平面形成 45°)见到明显颈静脉充盈，称为颈静脉怒张，提示体循环静脉血回流受阻或上腔静脉压增高，见于右心衰竭、缩窄性心包炎、心包积液及上腔静脉阻塞综合征等。颈静脉搏动可见于三尖瓣关闭不全。颈动脉搏动，提示心排血量增加或脉压增大。

66. 下列不属于皮肤黏膜出血的是

- A. 紫癜
- B. 瘀点
- C. 血肿
- D. 蜘蛛痣
- E. 瘀斑

【正确答案】D

【答案解析】蜘蛛痣是皮肤小动脉末端分支扩张所形成的血管痣。

67. 心前区隆起见于

- A. 冠心病
- B. 肺心病
- C. 先天性心脏病

D.心包炎

E.心肌炎

【正确答案】C

【答案解析】心前区隆起见于以下几种情况：①某些先天性心脏病，如法洛四联症、肺动脉瓣狭窄等。②儿童时期患慢性风湿性心脏瓣膜病伴右心室增大者。

68.叩诊发现心影呈梨形增大，是由于

A.右室、左室增大

B.右房增大

C.左房增大或合并肺动脉段扩大

D.右室、右房增大

E.左室增大，主动脉弓突出

【正确答案】C

【答案解析】左心房增大或合并肺动脉段扩大：心腰部饱满或膨出，心脏浊音区呈梨形，见于二尖瓣狭窄。

69.下列说法错误的是

A.杂音有生理性和病理性两类

B.震颤都是病理性的

C.心律不齐都是病理性的

D.血压过高和过低都不好

E.心动过速常是阵发的

【正确答案】C

【答案解析】健康青少年及儿童常见呼吸性窦性心律不齐。

70.胸廓一侧平坦或下陷见于

A.胸腔积液

B.肺气肿

C.肺不张

D.心包积液

E.气胸

【正确答案】C

【答案解析】胸廓一侧平坦或下陷见于肺不张、肺纤维化、广泛性胸膜增厚和粘连等

71.正常人支气管呼吸音可听到的部位为

A.左锁骨上窝

B.右锁骨上窝

C.胸骨角周围

D.胸骨上窝

E.肩胛间区

【正确答案】D

【答案解析】支气管呼吸音：正常人在喉部、胸骨上窝、背部第6颈椎至第2胸椎附近均可听到，如在肺部其他部位听到支气管呼吸音则为病理现象。

72.大量气胸患者，语音震颤

A.增强

B.减弱或消失

C.稍增强

D.正常

E.无变化

【正确答案】B

【答案解析】气胸

- (1) 望诊 患侧胸廓饱满，肋间隙增宽，呼吸动度减弱或消失。
- (2) 触诊 气管移向对侧，患侧语音震颤减弱或消失。
- (3) 叩诊 患侧呈鼓音。左侧气胸时，心界叩不出；右侧气胸时，肝浊音界下移。
- (4) 听诊 患侧呼吸音减弱或消失。

73. 语颤增强见于

- A. 肺气肿
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 肺实变
- E. 胸膜肥厚

【正确答案】D

【答案解析】语颤增强见于以下几种情况：①肺实变：见于肺炎链球菌肺炎、肺结核、肺脓肿及肺癌等。②压迫性肺不张：见于胸腔积液上方受压而萎瘪的肺组织及受肿瘤压迫的肺组织。③较浅而大的肺空洞：见于肺结核、肺脓肿、肺肿瘤所致的空洞。

74. 肺实变可出现的体征是

- A. 支气管语音增强
- B. 语颤减弱
- C. 叩诊鼓音
- D. 湿啰音
- E. 肺泡呼吸音增强

【正确答案】A

【答案解析】肺实变的体征：

- (1) 望诊两侧胸廓对称，患侧呼吸动度可局限性减弱或消失。
- (2) 触诊气管居中，患侧语音震颤增强。
- (3) 叩诊患侧呈实音。
- (4) 听诊患侧肺泡呼吸音消失，可听到病理性支气管呼吸音，支气管语音增强。

75. 检查大量腹水患者的肝脏时，应用的触诊方法是

- A. 冲击触诊法
- B. 滑行触诊法
- C. 深压触诊法
- D. 浅部触诊法
- E. 双手触诊法

【正确答案】A

【答案解析】冲击触诊（浮沉触诊法）适用于大量腹水而肝、脾难以触及时。

76. 下列会出现腹肌紧张的是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 恶性肿瘤晚期
- C. 体弱的老年人
- D. 重症肌无力
- E. 大量放腹水后

【正确答案】A

【答案解析】腹壁紧张度增加（腹肌紧张）①弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急

性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。②局限性腹肌紧张多系局限性腹膜炎所致，如右下腹腹壁紧张多见于急性阑尾炎，右上腹腹壁紧张多见于急性胆囊炎；腹膜慢性炎症时，触诊如揉面团一样，称为揉面感，常见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎。

77.深吸气时脾脏在左肋下 4cm 但未超过脐水平，临床为脾肿大

- A.轻度
- B.中度
- C.重度
- D.正常
- E.无法确定

【正确答案】B

【答案解析】脾肿大的分度方法：深吸气时脾脏在肋下不超过 2cm 者为轻度肿大；超过 2cm 但在脐水平线以上，为中度肿大；超过脐水平线或前正中线为高度肿大，又称巨脾。中度以上脾肿大时其右缘常可触及脾切迹，这一特征可与左肋下其他包块相区别。

78.板状腹可见于

- A.急性阑尾炎
- B.急性胆囊炎
- C.肠结核
- D.急性胃肠穿孔
- E.大量腹水

【正确答案】D

【答案解析】弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。

79.库瓦济埃征阳性应考虑

- A.胆囊炎
- B.胆石症
- C.胰头癌
- D.肝脓疡
- E.溶血性贫血

【正确答案】C

【答案解析】胰头癌压迫胆总管导致胆囊肿大时无压痛，但有逐渐加深的黄疸，称库瓦济埃征阳性。

80.关于语颤的描述，下列不正确的是

- A.发音强、音调低、胸壁薄者语颤强
- B.左胸上部较右胸上部强
- C.前胸上部较下部强
- D.后胸下部较上部强
- E.男性较女性强

【正确答案】B

81.对伦理学的叙述不正确的是

- A.伦理学亦称道德哲学
- B.伦理学是关于道德现象及其理论的学科
- C.道德由个人素质决定的
- D.道德是人们在社会生活实践中形成
- E.道德由经济基础决定的

【正确答案】C

【答案解析】伦理学亦称道德哲学，是关于道德现象及其理论的学科。道德是人们在社会生活实践中形成，由经济基础决定，用善恶标准评价，以社会舆论，内心信念和传统习俗来调节的人与人、人与社会、人与自然之间关系的原则和规范的总和。

82.医学道德的作用不包括哪一项

- A.对人民健康具有保障作用
- B.对医疗质量具有保障作用
- C.对经济效益的保障作用
- D.对医疗卫生事业具有促进作用
- E.对社会文明具有推动作用

【正确答案】C

【答案解析】医学道德是医务人员的职业道德，简称医德，是医务人员处理与患者、与社会关系的原则和规范。医务人员的道德品质对人民健康和医疗质量具有保障作用，对医疗卫生事业具有促进作用，对社会文明具有推动作用。

83.不属于现代医学目的是

- A.预防疾病
- B.促进和维护健康
- C.解除由疾病引起的痛苦
- D.维护患者尊严，延长寿命，追求安详死亡
- E.发展经济

【正确答案】E

【答案解析】现代医学目的是，致力于预防疾病，减少发病率，促进和维护健康；治疗疾病，解除由疾病引起的痛苦；照料患者，维护患者尊严，延长寿命，追求安详死亡；提高生命质量，优化生存环境，增进身心健康。

84.提出“大医精诚”的医家是

- A.张仲景
- B.孙思邈
- C.李时珍
- D.张锡纯
- E.陈实功

【正确答案】B

【答案解析】孙思邈，唐代著名医学家，视病人如亲人，无欲无求，普同一等，先发大慈恻隐之心，不管昼夜寒暑，饥渴疲劳，一心救助。一心救助。如“论大医习业”“论大医精诚”提出的医德原则和医德规范成为中国传统医德的重要内容，成为后世医家行为的规范，成为激励后世医家践行医德的精神力量。

85.医务人员对患者诚信、宽厚，潜心医学事业，对医学科学忠诚，体现了

- A.仁爱
- B.严谨
- C.诚挚
- D.公正
- E.奉献

【正确答案】C

【答案解析】医德品质中诚挚，表现在医生忠诚医学科学、潜心医学事业，对患者讲诚信，具有宽厚、诚挚的人格品德。

86.功利论的特征包括

- A.在疾病的预防、诊断上建功立业

- B.对病人所患疾病的做出正确的诊断和有效的治疗，使病人尽早康复
- C.具有明确的为病人解除病痛的动机，做出正确的诊断，达到显著的治疗效果
- D.在疾病的治疗、康复上建功立业
- E.以上皆是

【正确答案】E

【答案解析】医德功利的特征：1.在疾病的预防、诊断、治疗、康复上建功立业；对病人所患疾病的做出正确的诊断和有效的治疗，使病人尽早康复。2.具有明确的为病人解除病痛的动机，做出正确的诊断，达到显著的治疗效果。

87.关于医德品质的说法不正确的是

- A.是医务人员在长期执业行为中形成和表现出来的稳定的医学道德气质
- B.是医德认识、医德情感和医德意志的统一
- C.表现医生忠诚于科学、潜心于医学事业的人格品德
- D.为了追求快乐和幸福
- E.为了患者和社会的利益，可以牺牲自身的利益

【正确答案】D

【答案解析】医德品质是医务人员在长期的职业行为中形成和表现出来的稳定的医学道德气质、习惯和特征。医德品质是医德认识、医德情感和医德意志的统一。其内容之一“奉献”指出为了患者和社会的利益而牺牲自身的利益。D项是“功利论”的特征，故不符合。

88.医学人道主义的核心内容包括

- A.尊重病人的生命、人格、权利
- B.尊重病人的生命、自由、意愿
- C.尊重病人的人格、尊严、权利
- D.尊重病人的生命、意愿、尊严
- E.尊重病人的权利、人格、自由

【正确答案】A

【答案解析】医学人道主义的核心内容包括尊重病人的生命、尊重病人的人格、尊重病人的权利。

二、A2

89.患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰，经检查诊断为肺炎链球菌肺炎，其治疗应首选

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.磺胺药
- D.氟喹诺酮类药
- E.头孢唑啉钠

【正确答案】A

【答案解析】肺炎链球菌肺炎，抗菌药物治疗首选青霉素。

90 小儿的舒张压正常值应为收缩压的

- A. 1 / 3
- B. 1 / 4
- C. 1 / 5
- D. 2 / 3
- E. 1 / 6

答案:D

解析:D

舒张压 (mmHg) = 收缩压 \times 2 / 3。 (kPa 值 = mmHg 测定值 \div 7.5)。

91

小儿基本脉象是

- A. 浮、沉、迟、数、洪、细
- B. 浮、沉、缓、疾、有力、无力
- C. 浮、沉、缓、疾、洪、细
- D. 浮、沉、迟、数、洪、弱
- E. 浮、沉、迟、数、有力、无力

答案:E

解析:E

小儿脉象有浮、沉、迟、数、有力、无力六种。

92 既能治疗前头痛，又善治目疾的腧穴是

- A. 列缺
- B. 悬钟
- C. 昆仑
- D. 阳白
- E. 太阳

答案:D

解析:D

列缺主治:1 咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病症; 2 头痛、齿痛、项强、口眼歪斜等头项部疾患。悬钟主治:1 痴呆、中风等髓海不足疾患; 2 颈项强痛, 胸胁满痛, 下肢痿痹。昆仑主治:1 后头痛、项强、腰骶疼痛、足踝肿痛等痛证; 2 癫痫; 3 滞产。阳白主治:1 前头痛; 2 目痛、视物模糊、眼睑瞤动等目疾。太阳主治:1 头痛; 2 目疾; 3 面瘫。

93 下列各项, 不属于感染性发热疾病的是

- A. 疟疾
- B. 猩红热
- C. 病毒性肝炎
- D. 广泛性皮炎
- E. 伤寒

答案:D

解析:D

1. 感染性发热临床上最多见, 各种病原体所引起的急、慢性感染均能引起感染性发热。包括细菌、病毒、支原体、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等。

2. 非感染性发热

(1) 无菌性坏死物质吸收如大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。

(2) 抗原-抗体反应如风湿热、血清病、药物热、结缔组织疾病等。

(3) 内分泌与代谢障碍如甲亢、大量脱水等。

(4) 皮肤散热减少如广泛性皮炎、鱼鳞癣、慢性心功能不全等。

(5) 体温调节中枢功能失常如脑出血、脑外伤、中暑、安眠药中毒等直接损害体温调节中枢, 使其功能失常而发热。

(6) 自主神经功能紊乱影响到体温调节过程, 使产热大于散热, 属功能性发热, 多为低热。

94 长期使用解热或激素类药物后, 常出现的热型是

- A. 消耗热
- B. 不规则热
- C. 回归热
- D. 稽留热

- E. 弛张热

答案:B

解析:B

热型是指发热时的体温曲线类型, 在临床病例的诊断和鉴别诊断中有重要参考意义。本题中由于长期使用退热药物, 干扰患者的体温调节, 使得患者不能形成明确规律的体温曲线, 故发热病人体温曲线无一定规律。C 指体温急骤上升至 39°C 或以上, 持续数天下降至正常, 有热期与无热期规律性交替, 见于回归热、霍奇金病。D 指体温恒定在 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上, 见于大叶性肺炎、伤寒高热期等。E 指体温在 39°C 以上, 24 小时内波动超过 2°C , 见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

95 发热不伴有寒战的有

- A. 败血症
- B. 大叶性肺炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 伤寒
- E. 重症肺结核

答案:D

解析:D

发热伴寒战常见于肺炎链球菌性肺炎、败血症、急性胆囊炎、急性肾盂肾炎、疟疾、流感等。伤寒常伴皮疹出现。故本题选 D。

96 伴有呼吸困难与发绀的突发性胸部剧痛或绞痛常见于

- A. 心肌梗死
- B. 心绞痛
- C. 肺栓塞
- D. 肺淤血
- E. 胸膜炎

答案:C

解析:C

①胸痛伴有咳嗽、咳痰和（或）发热，常见于气管、支气管和肺部疾病。②胸痛伴呼吸困难常提示病变累及范围较大，如大叶性肺炎、自发性气胸、渗出性胸膜炎和肺栓塞等。③胸痛伴咯血，主要见于肺栓塞、支气管肺癌。④胸痛伴苍白、大汗、血压下降或休克时，多见于心肌梗死、夹层动脉瘤、主动脉窦瘤破裂和大块肺栓塞。⑤胸痛伴吞咽困难多提示食管疾病，如反流性食管炎等。故本题选 C。

97 左心衰竭发生呼吸困难的主要机制是

- A. 肺淤血
- B. 肺泡张力增加
- C. 肺泡弹性减退
- D. 肺循环压力升高
- E. 以上都不是

答案:A

解析:A

左心衰竭是一种以呼吸困难、胸闷、咳嗽、气喘为主要表现的心脏病急症。左室前后负荷过重导致急性心肌收缩力下降、左室舒张末期压力增高、排血量下降，从而引起以肺循环淤血为主的缺血缺氧、呼吸困难等临床症候群。肺淤血使气体弥散功能降低，引起缺氧和呼吸困难。故本题选 A。

98 正常血清总胆红素含量为

- A. $0\sim 6.8\ \mu\text{mol/L}$
- B. $0.7\sim 1.7\ \mu\text{mol/L}$
- C. $1.7\sim 10.26\ \mu\text{mol/L}$
- D. $1.7\sim 17.1\ \mu\text{mol/L}$
- E. $1.7\sim 21.7\ \mu\text{mol/L}$

答案:D

解析:D

黄疸是由于血清中胆红素升高致使皮肤、黏膜和巩膜发黄的症状和体征。正常血清总胆红素为 $1.7\sim 17.1\ \mu\text{mol/L}$ 。胆红素在 $17.1\sim 34.2\ \mu\text{mol/L}$ ，临床不易察觉，称为隐性黄疸，超过 $34.2\ \mu\text{mol/L}$ 时出现临床可见黄疸。故本题选 D。

99 诊断 6 岁以上小儿营养性缺铁性贫血的标准，其血红蛋白值应低于的数值是选项：

- A. 80g/L
- B. 90g/L

C.100g/L

D.110g/L

E.120g/L

答案:D

解析:3个月~6岁小儿营养性缺铁性贫血的标准,其血红蛋白值小于等于110g/L;6岁以上的血红蛋白值应小于120g/L。

100.慢性肾衰竭的首发症状是

选项:

A.酸碱平衡紊乱

B.高血压

C.食欲不振、恶心、呕吐

D.乏力、失眠、记忆力减退

E.骨质疏松症

答案:C

解析:慢性肾衰竭患者最早出现的症状经常是在消化系统,通常表现为食欲不振、恶心、呕吐等。患者口中有异味,可有消化道出血

101.男性患者,慢性肺心病病史5年,受凉后出现咳、痰量较多,伴气喘加重、下肢浮肿,其关键性的治疗措施是

A.控制肺部感染

B.解痉平喘

C.吸氧

D.应用利尿剂

E.使用洋地黄

【正确答案】A

【答案解析】控制感染为治疗慢性肺心病的关键措施。慢性肺心病并发的感染多为混合性感染,故应联合用药,一般可选用青霉素类、氨基糖甙类、氟喹诺酮类及头孢菌素类等。根据痰培养和药物敏感试验选用抗生素更合理。多采用静脉用药。长期应用抗生素要防止真菌感染。

102.患者男,56岁。慢性咳嗽病史12年,近1-2年咳嗽加重,无明显季节性,伴活动后气短、胸闷等,应考虑的诊断是

A.COPD

B.慢性肺心病

C.支气管哮喘

D.间质性肺炎

E.支气管扩张症

【正确答案】A

【答案解析】根据患者慢性咳嗽病史伴活动后气短、胸闷表现考虑COPD。COPD症状起病缓慢,病程漫长并逐渐加重。

(1)慢性咳嗽:随病程发展可终身不愈,晨间咳嗽明显,夜间有阵咳或排痰。

(2)咳痰:一般为白色黏液或浆液泡沫状痰,偶可带血丝,清晨排痰较多。

(3)气短及呼吸困难:为COPD的典型症状。表现为呼气性呼吸困难,伴呼气延长。

(4)喘息和胸闷:部分患者特别是重度患者或急性加重时出现喘息。

103.男性,40岁,4年来每年冬季咳嗽,咳少量白痰或伴喘息,每年发病3个月余,无发热、盗汗等症状,无粉尘接触史,患者最可能出现的表现是

- A.左上肺湿啰音
- B.肺功能 FEV₁/FVC<65%
- C.左下肺叩诊呈浊音
- D.X线胸片示两下肺蜂窝状改变
- E.胸部 CT 示两上肺多个薄壁空洞

【正确答案】B

【答案解析】患者慢性咳嗽、伴有气短及呼吸困难同时无发热、盗汗等症状，无粉尘接触史排除炎症以及哮喘，考虑 COPD，此时肺功能 FEV₁/FVC

104.老年患者，多年吸烟史，近 2 个月来咳嗽、体重下降、发热、痰中持续带血，首先考虑的诊断是

- A.支气管扩张症
- B.继发性肺结核
- C.原发性支气管肺癌
- D.急性肺脓肿
- E.肺炎链球菌肺炎

【正确答案】C

【答案解析】患者多年吸烟史，近 2 个月来咳嗽、体重下降、发热、痰中持续带血考虑原发性支气管肺癌。其表现有：咳嗽为常见的早期症状，多呈刺激性干咳或伴少量黏液痰。如肿瘤压迫导致支气管狭窄，呈持续性高音调金属音咳嗽。继发感染时，则咳脓性痰。因癌组织血管丰富，痰内常间断或持续带血，如侵及大血管可导致大咯血。如肿瘤引起支气管部分阻塞，可引起局限性喘鸣，并有胸闷、气急等。全身症状有体重下降、发热等。

105.患者李某，支气管哮喘病史 3 年，今晨突然发作，为控制发作应首选

- A.沙丁胺醇
- B.阿托品
- C.泼尼松
- D.色甘酸二钠
- E.维拉帕米

【正确答案】A

【答案解析】β₂受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物。短效-速效β₂受体激动剂如沙丁胺醇。

106.患者青年男性，突发寒战、高热、胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰伴有肺实变体征，拟诊为肺炎链球菌肺炎，有助于诊断的检查是

- A.白细胞计数
- B.痰病原学检查
- C.X线透视
- D.纤维支气管镜
- E.血沉

【正确答案】B

【答案解析】肺炎链球菌肺炎病原学检查：痰直接涂片发现典型的革兰染色阳性、带荚膜的球菌，即可初步作出病原学诊断。痰培养 24—48 小时可以确定病原体。

107.男性，65 岁，慢支病史 5 年，近来反复发作，病程进展最可能出现的并发症是

- A.阻塞性肺气肿
- B.间质性肺炎
- C.支气管扩张
- D.肺癌
- E.肺结核

【正确答案】A

【答案解析】反复发作的慢性支气管炎，很可能会引起 COPD。慢性阻塞性肺疾病（COPD）是一种以持续存在的气流受限为特征的肺部疾病，气流受限不完全可逆，呈进行性发展，主要累及肺部。

108. 男性，67 岁，慢性肺心病史 6 年，因呼吸道感染原有症状、体征加重，因睡眠障碍服用镇静剂 3 天后，出现精神恍惚，烦躁不安，可能出现的并发症是

- A. 消化道出血
- B. 心律失常
- C. 肺性脑病
- D. 休克早期
- E. 酸碱平衡失调

【正确答案】C

【答案解析】患者慢性肺心病史 6 年，因呼吸道感染原有症状、体征加重，出现精神恍惚，烦躁不安，这是因为严重缺氧及二氧化碳潴留导致中枢神经功能紊乱，出现谵妄、意识模糊甚至昏迷等一系列神经、精神表现，这也被称之为肺性脑病。

109. 患者男性，20 岁，接触花粉后，突然鼻痒、打喷嚏，继之出现带哮鸣音的呼气性呼吸困难，喉中发出哮鸣音，诊断应考虑是

- A. 喘息型慢性支气管炎
- B. 心源性哮喘
- C. 肺癌
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张

【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘主要表现为发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难，其发作常与吸入外源性变应原有关。

110. 女性，16 岁，支气管哮喘病史 3 年，在吸入刺激性气体后哮喘发作，肺部检查可出现的叩诊音是

- A. 鼓音
- B. 浊音
- C. 过清音
- D. 清音
- E. 实音

【正确答案】C

【答案解析】哮喘发作时胸部呈过度充气状态，故叩诊应为过清音。

（共用题干）

111 患者，男，40 岁。近 2 个月右上腹疼痛伴消瘦。查体：肝肋下 3cm，脾肋下 2cm，移动浊音阳性。

HBsAg 阳性，B 超检查见肝右叶有一直径 5cm 占位病变。

.最可能的诊断是

- A. 肝硬化
- B. 细菌性肝脓肿
- C. 肝血管瘤
- D. 肝癌
- E. 多囊肝

【正确答案】D

【答案解析】有典型表现者诊断不难，但已属晚期。凡有肝病史的中年人，尤其是男性患者，如有不明原因的肝区疼痛、消瘦、进行性肝肿大，应做 AFP、B 超、CT 等有关检查，进而明确诊断。满足下列三项中

的任何一项，即可诊断肝癌：①具有两种典型影像学（超声、增强 CT、MRI 或选择性肝动脉造影）表现，病灶>2cm。②一项典型的影响学表现，病灶>2cm，AFP>400μg/L。③肝脏活检阳性。

112 甲型肝炎病毒的主要传播途径是

- A. 血液及血制品
- B. 垂直传播
- C. 媒介生物
- D. 粪-口途径
- E. 呼吸道

答案:

解析 D

甲型肝炎病毒的主要传播途径是粪-口途径。

题型:A1 型题

题目:

113 重型肝炎诊断及判断预后的重要指标是

- A. 血清胆红素明显升高
- B. 酶胆分离
- C. 凝血酶原活动度明显降低
- D. A/G 比值倒置
- E. 血清转氨酶活性明显升高

答案:

解析 C

PTA（凝血酶原活动度） $\leq 40\%$ 为肝细胞大量坏死的肯定界限，为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标。

题型:A1 型题

题目:

114 有关肝炎病毒血清学标志物的描述，下列哪项是不正确的

- A. 慢性 HBV 感染抗-HBc IgM 也可阳性
- B. 抗-HAV IgM 阳性可诊断为急性 HAV 感染
- C. HBsAg 阳性表明患者有传染性
- D. 抗-HCV 阳性为 HCV 既往感染
- E. 抗-HBs 是保护性抗体

答案:

解析 D

一般认为抗-HCV 阳性是感染的标志，包括既往感染和现症感染。

题型:A2 型题

题目:

115 患者，男，25 岁。近 2 周自觉乏力，食欲不振，厌油，腹胀。检查：巩膜无黄染，肝肋缘下 2 cm，有压痛。丙氨酸氨基转氨酶升高。应首先考虑的疾病是

- A. 急性肝炎
- B. 慢性肝炎
- C. 重型肝炎
- D. 淤血性肝硬化

E.肝炎肝硬化

答案:

解析 A

患者有乏力，食欲不振，厌油的临床表现，说明肝脏出现问题，而体检发现肝脏肿大并且有压痛，丙氨酸转氨酶升高，而没有消瘦的症状，并且发病较急，考虑为急性肝炎。

题型:A2 型题

题目:

116 患儿近日常感无力，精神萎靡，食欲不佳，并诉右上腹隐痛。检查：面色黄，肝于肋缘下 3 cm 可触及，有压痛。实验室检查：尿胆红素（+），尿胆原（+）。应首先考虑的疾病是

- A. 蚕豆病
- B. 胃炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 急性病毒性肝炎
- E. 胆结石

答案:

解析 D

蚕豆病是由于遗传因素和食用蚕豆所引起的而患者并无食用蚕豆史，并且肝脏发生肿大也不符合，可以排除；而胃炎不会引起黄疸，所以排除；C、E 都是与胆道梗阻有关，而发生胆道梗阻不会是隐痛，会发生剧烈疼痛，可以排除。

题型:A2 型题

题目:

117 患者，男，20 岁。半个月来发热 37.5℃，伴周身乏力，食欲不振，尿色加深如深茶样。化验肝功能：ALT 500 U/L，胆红素 80 mmol/L，抗-HAV IgM（+），HBsAg（+），抗-HBc IgG（+）。应诊为

- A. 急性甲型黄疸型肝炎
- B. 急性甲型合并乙型黄疸型肝炎
- C. 急性乙型肝炎，既往感染甲肝病毒
- D. 急性乙型黄疸型肝炎
- E. 急性甲型黄疸型肝炎，乙肝病毒携带

答案:

解析 E

该年轻男性患者发病半个月，有发热、乏力等全身感染症状，有食欲不振和转氨酶升高的肝炎症状，有尿色浓茶样和胆红素升高的黄疸表现，因此为急性黄疸型肝炎，结合 HAV IgM（+），支持急性甲型黄疸型肝炎，患者还有 HBsAg（+）和抗-HBc IgG（+），说明是乙肝病毒携带。

题型:A1 型题

题目:

118 下列关于人感染高致病性禽流感的叙述，错误的是

- A. 传染源主要为病禽
- B. 传播途径主要经呼吸道
- C. 人类普遍缺乏免疫力
- D. 夏季发病少
- E. 暴发流行多在秋季

答案:

解析 E

禽流感一年四季均可发生,冬、春季节多暴发流行,夏季发病较少,多呈散发,症状也较轻。

题型:A1 型题

题目:

119 人免疫缺陷病毒的主要特征是

- A. 双链 DNA 病毒,外有类脂包膜
- B. 单链 DNA 病毒,外有类脂包膜
- C. 单链 RNA 病毒,外有类脂包膜
- D. 双链 RNA 病毒,含逆转录酶
- E. 双链 DNA 病毒,含逆转录酶

答案:

解析 C

人类免疫缺陷病毒为含逆转录酶的单链 RNA 病毒,外层有类脂包膜。

题型:A1 型题

题目:

120 感染 HIV 后,临床无明显症状,但血中可检出病毒及抗体,此期的持续时间一般是

- A. 1~2 年
- B. 3~4 年
- C. 4~5 年
- D. 2~10 年
- E. 12~15 年

答案:

解析 D

艾滋病无症状感染期:所有的 HIV 感染者均有这一期。此期病毒处于低水平复制状态,患者无任何临床症状,但血清中可检出病毒及抗体,有传染性,可持续 2~10 年或更久。

题型:A1 型题

题目:

121 确诊流行性脑脊髓膜炎最可靠的依据是

- A. 高热、头痛、呕吐
- B. 皮肤有淤点及淤斑
- C. 脑膜刺激征 (+)
- D. 脑脊液符合化脓性脑膜炎改变
- E. 以上都不是

答案:

解析 E

细菌学培养阳性及流脑特异性血清免疫检测阳性为确诊脑脊液符合化脓性脑膜炎的主要依据。

题型:A1 型题

题目:

122 伤寒菌血液培养,阳性率最高的时间是

- A. 第一周
- B. 第二周
- C. 第三周
- D. 第四周
- E. 第五周

答案:

解析 A

伤寒菌进行血培养时在病程的第一至二周阳性率高达 80%~90%,第三周降到 50%,以后更低。而第一周病情在初期,症状逐渐明显,这时阳性率逐渐升高,所在第一周末的时候会达到高峰。

123、患者饥不欲食的原因是()

- A. 胃热
- B. 胃寒
- C. 食积
- D. 脾气虚
- E. 胃阴虚

学员提问：为什么？

答案及解析：本题选 E.

胃阴虚：胃的阴液不足所出现的证候，又称胃阴不足。由胃热、胃火炽盛，或温热病耗伤胃阴所致。临床表现常见口咽发干，多以睡后明显，不思饮食，或饥不欲食，并有心烦、低热、大便不调、干呕作呃，舌红少苔或无苔，脉细数。一般以胃病常见症状伴见阴虚症状为辨证要点。

以下知识点供您参考：

了解患者食欲状况，进食多少，对于判断病体的脾胃功能以及疾病的预后转归，有较重要的临床意义：

食欲减退或不欲食，胃纳呆滞，多是脾胃功能失常的表现。若食少见于久病，兼有面色萎黄、形瘦、倦怠等症者，属脾胃虚弱；而食少伴有胸闷、腹胀、肢体困重、舌苔厚腻者，则多是脾湿不运。

厌恶食物或恶闻食臭，即为厌食，又称“恶食”，多见于伤食。妇女怀孕，亦可有厌食的反应，多因妊娠后冲脉之气上逆，胃失和降所致。厌油腻厚味，多见于肝胆脾胃湿热的病证。

食欲过于旺盛，食后不久即感饥饿者，为消谷善饥，往往身体反见消瘦，这是胃火炽盛，腐熟太过所致；有饥饿感，但不想吃，或进食不多者，称为饥不欲食，多因胃阴不足，虚火上扰所致；易饥多食，但大便溏泻，消化不好，属胃强脾弱。

嗜食生米、泥土等异物，尤多见于小儿，往往是虫积的征象。妇女妊娠偏嗜某种食物，一般不属病态。

疾病过程中，食量渐增，表示胃气渐复，食量渐减，常是脾胃功能衰退的表现。若久病之人，本不能食，但突然反而暴食，这是中焦脾胃之气将绝的征象，称为“除中”，也是“回光返照”的一种表现。

因此本题选 E.

124、 患者，男，50岁。腰膝酸软冷痛，小便清长，腹痛便秘。用药宜首选()

A.雄黄

B.白矾

C.皂矾

D.硼砂

E.硫黄

答案及解析：本题选 E.

患者出现腰膝酸软冷痛，小便清长，腹痛便秘，腰膝酸软冷痛，小便清长为阳虚之像，故此题宜选用有温肾壮阳，兼通便的药物。硫黄有此作用。

硫黄

【性能】酸，温；有毒。归肾、大肠经。

【功效】外用解毒杀虫疗疮；内服补火助阳通便。

125、下列哪一条经脉与胞宫没有直接连属关系()

A.心经

B.肝经

C.肾经

D.冲脉

E.任脉

答案与解析：本题答案为 B.

冲、任、督三脉下起胞宫，上与带脉交会，冲、任、督、带又上连十二经脉，因此胞宫的生理功能主要与冲、任、督、带四脉的功能有关，从而使冲、任、督、带四脉在妇女生理中具有重要的地位。

肾与胞宫有一条直通的经络联系，即《素问·奇病论》说的“胞络者，系于肾”。

心与胞宫有一条直通的经络联系，即《素问·评热病论》所说：“胞脉者属心而络于胞中”。

肝脉与任脉交会于“曲骨”，又与督脉交会于“百会”，与冲脉交会于“三阴交”，可见肝脉通过冲、任、督三脉与胞宫相联系。并不是直接与胞宫有关联。

因此本题答案选 B。

126、患者男性，32岁，左下肢红、肿、热、痛，边界不清，压痛明显，应首先考虑()

A.疥

B.痈

C.疽

D.丹毒

E.急性蜂窝织炎

答案及解析：本题答案为 E。

急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下、肌间隙或深部蜂窝组织的急性弥漫性化脓性感染。表浅的急性蜂窝织炎，局部明显红肿、剧痛，与正常区无明显分界，扩展快，中央部可因缺血而坏死。深在的急性蜂窝织炎，局部红肿不明显，常有局部水肿和深部压痛，但病情重，可有高热、寒战、头痛、全身无力、白细胞计数增加等全身症状。

丹毒是以患部突然皮肤鲜红成片，色如涂丹，灼热肿胀，迅速蔓延为主要表现的急性感染性疾病。

本病相当于西医的急性网状淋巴管炎。

疔是指生于皮肉之间，以局部光软无头，红肿疼痛，结块范围多在 6~9cm 大小，发病迅速，易肿

疥是由疥虫引起的皮肤传染病。皮损呈针头大小的丘疹、水疱，非常刺痒。皮损多见于手指间、腕、肘窝、腋窝、腹股沟等皱折部位。

疽指局部皮肤肿胀坚硬而皮色不变的毒疮。好发于项后、背部等皮肤厚韧处。多发于中老年人。根据病程演化，临床可分为三期：初期患处起一肿块，上有粟粒样脓头，肿块渐向四周扩大，脓头增多，色红灼热，高肿疼痛。伴发热恶寒、头痛纳差。溃脓期肿块进一步增大，疮面渐渐腐烂，形似蜂窝，肿块范围常超过 10cm，甚至大于 30cm。伴壮热、口渴、便秘、溲赤等。收口期脓腐渐，新肉开始生长，逐渐愈合。整个病程约 1 个月左右，病情初期在第 1 周，溃脓期在第 2 周到第 3 周，收口期在第 4 周。

故本题答案选 E.

127、下列哪组经脉没有按照气血循行流注顺序排列()

A.胆经、肝经、肺经

B.心经、小肠经、肾经

C.大肠经、胃经、脾经

D.肾经、心包经、三焦经

E.三焦经、胆经、肝经

答案及解析：本题答案为 B.

十二经脉的流注次序为 起于肺经→大肠经→胃经→脾经→心经→小肠经→膀胱经→肾经→心包经→三焦经→胆经→肝经，较后又回到肺经。周而复始，环流不息。

可以按照“肺大胃脾心小肠，膀胱肾包焦胆肝肺”口诀记忆十二经脉的流注次序，效果很好!

故本题答案选 B

128. 雷尼替丁的药物分类是：

【答案】E。解析：(1)本题考查医学基础学-药理学-雷尼替丁。(2)主要的 H₂ 受体阻断药有西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁、罗沙替丁以及乙溴替丁和米吩替丁。

(129 题共用备选答案)

A.呋塞米

B.氨苯蝶啶

C.葡萄糖

D.氢氯噻嗪

E.螺内酯

129. 用于治疗轻、中度水肿的药物是：

【答案】D。解析：(1)本题考查医学基础学-药理学-利尿药。(2)中效能利尿药主要用于治疗轻、中度水肿。中效能利尿药：主要作用于远曲小管近端；噻嗪类

(131 ~ 132 题共用备选答案)

A.肝炎

B.胃炎

C.肠炎

D.脾破裂

E.肾结石

131.出现腹痛伴黄疸的疾病是：

131. 【答案】A。解析：(1)本题考查临床医学-内科学-肝炎。(2)腹痛是消化系统疾病的常见症状，是一种主观感觉，可分为急性腹痛和慢性腹痛；黄疸是由于血清中胆红素升高致皮肤、黏膜和巩膜发黄的症状和体征。腹痛伴黄疸多提示肝胆系统及胰腺疾病。

132. 出现腹痛伴休克的疾病是：

132. 【答案】D。解析：(1)本题考查临床医学-内科学-腹痛。(2)腹痛伴休克指腹部疼痛并伴有休克症状，常见于急性腹腔内出血、急性梗阻性化脓性胆道炎症、绞窄性肠梗阻、消化性溃疡急性穿孔、急性胰腺炎、腹腔脏器急性扭转、急性心肌梗塞、休克型肺炎，脾破裂会导致大量出血。

(133~134 题共用备选答案)

A.寒凝、气滞、血瘀、热毒

B.寒凝、气滞、血瘀、痰阻

C.热毒、饮、瘀

D.肝阳上亢、痰浊内蕴 E.热毒、湿毒、饮、瘀

133. 上述各项，属于符合心肌梗死中医病机的是：

133. 【答案】B。解析：(1)该题考查的是内科学-循环系统-冠心病的中医病机。(2)本病的病因与年老体衰、情志内伤、饮食不节、寒邪内侵等因素有关。基本病机为心脉痹阻不通，心失所养。病性本虚标实，本虚是气虚、阳虚、阴虚，以心气虚为主；标实为寒凝、气滞、血瘀、痰阻，以血瘀为主。疼痛剧烈者，多以实证为主，疼痛不典型或疼痛缓解后则多以虚证为主。病位在心，且与肝、脾、肾相关。本病病情凶险，易生他证。若心气心阳耗损至极，可出现心阳暴脱、阴阳离决之危证。故此题选 B。

134. 上述各项，属于符合原发性高血压中医病机的是：

134. 【答案】D。解析：(1)该题考查的是内科学-循环系统-高血压的中医病机。(2)本病形成的主要原因有情志失调、饮食不节、久病过劳及先天禀赋不足等。高血压病发病主要与肝、脾、肾等脏腑关系密切；病因为情志失调、饮食不节、久病劳伤、先天禀赋不足等；主要病理环节为风、火、痰、瘀、虚；病机性质为本虚标实，肝肾阴虚为本，肝阳上亢、痰浊内蕴为标。故此题选 D。

(135~136 题共用备选答案)

A.健脾益气，化湿止泻

B.消食导滞，和中止泻

C.抑肝扶脾，燥湿止泻

D.清热燥湿，分利止泻

E.芳香化湿，解表散寒

135. 患者腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，脘腹胀满，其中医治法是：

135. 【答案】B。解析：(1)该题考查的是内科学-脾胃病证-泄泻的中医辨证论治。(2)患者腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，脘腹胀满。属泄泻食滞肠胃证。治法：消食导滞，和中止泻。代表方剂：保和丸加减。健脾益气，化湿止泻治疗泄泻脾胃虚弱证。故 A 错。抑肝

扶脾，燥湿止泻治疗泄泻肝气乘脾证。故 C 错。清热燥湿，分利止泻治疗泄泻湿热伤中证。故 D 错。芳香化湿，解表散寒治疗泄泻寒湿内盛证。故 E 错。故此题选 B。

136. 患者泄泻清稀，脘闷食少，腹痛肠鸣，恶寒头痛，其中医治法是：

136. 【答案】E。解析：(1)该题考查的是内科学-脾胃病证-泄泻的中医辨证论治。

(2)患者泄泻清稀，脘闷食少，腹痛肠鸣，恶寒头痛。属泄泻寒湿内盛证。治法芳香化湿，解表散寒。代表方剂：藿香正气散加减。保和丸加减。健脾益气，化湿止泻治疗泄泻脾胃虚弱证。故 A 错。抑肝扶脾，燥湿止泻治疗泄泻肝气乘脾证。故 C 错。清热燥湿，分利止泻治疗泄泻湿热伤中证。故 D 错。消食导滞，和中止泻治疗泄泻食滞肠胃证。故 B 错。故此题选 E。

(137~138 题共用备选答案)

A.磺脲类

B.α-葡萄糖苷酶抑制剂

C.双胍类

D.胰岛素

E.噻唑烷二酮

137. 治疗糖尿病体形肥胖并伴有血脂异常者，应首选的药物是：

137. 【答案】C。解析：(1)该题考查的是内科学-内分泌系统疾病-糖尿病的治疗。(2)糖尿病体形肥胖并伴有血脂异常者，应首选的药物是双胍类。磺脲类尤适用空腹血糖升高的中青年 2 型糖尿病患者。故 A 错。 α -葡萄糖苷酶抑制剂尤适用仅餐后血糖增高患者。故 B 错。胰岛素多适用于胰岛素依赖性的 I 型糖尿病，经药物治疗无效或效果不明显的 II 型糖尿病。故 D 错误。噻唑烷二酮为胰岛素增敏剂，通过增加外周组织对胰岛素的敏感性、改善胰岛素抵抗而降低血糖。故此题选 C。

138. 治疗糖尿病仅餐后血糖增高者，应首选的药物是：

138. 【答案】B。解析：(1)该题考查的是内科学-内分泌系统疾病-糖尿病的治疗。(2)糖尿病仅餐后血糖增高者，首选的药物是 α -葡萄糖苷酶抑制剂。常用的 α -葡萄糖苷酶抑制剂主要是阿卡波糖。糖尿病体形肥胖并伴有血脂异常者，应首选的药物是双胍类。故 C 错误。磺脲类尤适用空腹血糖升高的中青年 2 型糖尿病患者。故 A 错。胰岛素多适用于胰岛素依赖性的 I 型糖尿病，经药物治疗无效或效果不明显的 II 型糖尿病。故 D 错误。噻唑烷二酮为胰岛素增敏剂，通过增加外周组织对胰岛素的敏感性、改善胰岛素抵抗而降低血糖。故此题选 B。

(139~140 题共用备选答案)

A.消瘰丸

B.泻心汤

C.六味地黄丸

D.龙胆泻肝汤

E.天王补心丹

139. 治疗甲状腺功能亢进症肝火旺盛证，应首选的方剂是：

139. 【答案】D。解析：(1)该题考查的是内科学-内分泌系统疾病-甲状腺功能亢进中医辨证论治。(2)甲状腺功能亢进症肝火旺盛证的治法是：清肝泻火，解郁散结。首选的方剂是：龙胆泻肝汤合藻药散加减。消瘰丸主治痰火凝结之瘰疬痰核。故 A 错。泻心汤治邪火内炽，迫血妄行，吐血，衄血，便秘溲赤；三焦积热，眼目赤肿，口舌生疮，外证疮疡，心胸烦闷，大便秘结；湿热黄疸，胸中烦热痞满，舌苔黄腻，脉数实者。故 B 错。六味地黄丸滋补肝肾。肝肾阴虚证。腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，口燥咽干，牙齿动摇，足跟作痛，小便淋沥，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数。故 C 错。天王补心丹具有补心安神、滋阴清热的功效。适用于治疗心肾不足、

阴亏血少所致的虚烦心悸、睡眠不安、精神衰疲、梦遗健忘、不耐思虑、大便干燥或口舌生疮等病症。故 E 错。故此题选 D。

140. 治疗甲状腺功能亢进症阴虚火旺证，应首选的方剂是：

140. 【答案】E。【答案】E。解析：(1)该题考查的是内科学-内分泌系统疾病-甲状腺功能亢进中医辨证论治。(2)甲状腺功能亢进症肝火旺盛证应用天王补心丹补心安神、滋阴清热(E 对)；消瘰丸主治痰火凝结之瘰疬痰核(A 错)；泻心汤治邪火内炽，迫血妄行，吐血，衄血，便秘溲赤；三焦积热，眼目赤肿，口舌生疮，外证疮疡，心胸烦闷，大便秘结；湿热黄疸，胸中烦热痞满，舌苔黄腻，脉数实者(B 错)；六味地黄丸滋补肝肾。肝肾阴虚证。腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，口燥咽干，牙齿动摇，足跟作痛，小便淋沥，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数(C 错)；甲状腺功能亢进症肝火旺盛证用龙胆泻肝汤清肝泻火，解郁散结(D 错)。故此题选 E。

(共用选项)

A.月经情况

B.生育情况

C.冶游史

D.家族遗传病史

E.预防接种史

141.属于个人史的是

【正确答案】 C

【答案解析】 个人史包括以下几个方面：①社会经历。②职业和工作条件。③习惯与嗜好。④冶游史。

142.属于既往史的是

【正确答案】 E

【答案解析】 既往史包括患者既往的健康状况和过去曾经患过的疾病（包括各种传染病）、外伤手术、预防接种、过敏史等，尤其是与现病有密切关系的疾病的历史。

（共用选项）

A.水肿

B.甲状腺肿

C.反甲

D.爪形手

E.梭状关节

143.类风湿性关节炎时出现

【正确答案】 E

【答案解析】 指关节变形以类风湿性关节炎引起的梭形关节最常见。

144.贫血时出现

【正确答案】 C

【答案解析】 匙状甲（反甲）常见于缺铁性贫血，偶见于风湿热。

（共用选项）

A.脊柱后凸

B.脊柱前凸

C.脊柱生理性弯曲

D.姿势性侧凸

E.器质性侧凸

145.正常人的脊柱立位时从侧面观可见

【正确答案】 C

【答案解析】 正常人的脊柱立位时从侧面观可见脊柱生理性弯曲。

146.由于儿童发育期坐、立姿势经常不端正可致

【正确答案】D

【答案解析】脊柱侧凸：姿势性侧凸多见于儿童发育期坐立位姿势不良、椎间盘突出症、脊髓灰质炎等；器质性侧凸时，改变体位不能使侧凸得到纠正，见于佝偻病、脊椎损伤、胸膜肥厚等。

(共用选项)

- A.右侧卧位时明显
- B.坐位稍前倾时明显
- C.仰卧位深吸气时明显
- D.左侧卧位更明显
- E.下蹲时减弱，立位时增强

147.二尖瓣狭窄的舒张中晚期杂音

【正确答案】D

【答案解析】左侧卧位可使二尖瓣狭窄的舒张中晚期隆隆样杂音更明显。

148.主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音

【正确答案】B

【答案解析】前倾坐位可使主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音更易于听到。

(共用选项)

- A.神灵主义医学模式

B.自然哲学医学模式

C.机械论医学模式

D.生物医学模式

E.生物-心理-社会医学模式

149.把人比作机器，疾病是机器某部分零件失灵，用机械观解释一切人体现象的医学模式是

【正确答案】C

【答案解析】16——17 世纪，欧洲文艺复兴运动带来了工业革命，推动了科学进步，也影响了医学。把人比作机器，用机械观解释一切人体现象，把疾病看作人体某部分零件失灵。这种医学模式忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性。

150.认为心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系医学模式是

【正确答案】E

【答案解析】生物-心理-社会医学模式认为人的心理与生理、精神及躯体、机体内外环境相互作用，心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系。认识人类的健康和疾病，既要考虑生物学因素，又要重视心理、社会因素的影响。维护人的健康、治疗人的疾病需应用生物、心理、社会诸多学科、技术的方法。

151 不属于咳逆倚息不得卧，卧则气逆的临床意义是

A.肺气壅塞

B.心阳不足

C.水气凌心

D.肺有伏饮

E.肺脾两虚

答案:E

解析:E

咳逆倚息而不得卧，卧则气逆，多是心阳不足，水气凌心。肺脾两虚不属于此范畴。

152 虚里搏动数急而时有一止的临床意义是

A.宗气不守

B.宗气内虚

C.宗气将绝

D.宗气内陷

E.心肺气绝

答案:A

解析:A

虚里搏动数急而时有一止，为宗气不守。

153 下列不见于肾阴虚表现的是

A.腰膝酸软

B.头晕耳鸣

C.齿松发脱

D.失眠多梦

E.神情呆钝

答案:E

解析:E

肾阴虚：表现为阴虚内热及阴虚阳亢之象，证见腰膝酸痛，头晕耳鸣，失眠多梦，五心烦热，潮热盗汗，遗精早泄，咽干颧红，舌红少津无苔，脉细数等。齿松发脱也是肾阴虚表现。

154 下列不属于少阴证治疗范畴的方剂是

- A.四逆汤证
- B.黄连阿胶汤证
- C.附子汤证
- D.五苓散证
- E.真武汤证

答案:D

解析:D

五苓散主治证候：膀胱气化不利之蓄水证。小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入则吐；或脐下动悸，吐涎沫而头目眩晕；或短气而咳；或水肿、泄泻。舌苔白，脉浮或浮数。少阴之为病，以“脉微细，但欲寐”为主要脉症。由于阳气衰微，营血不足，不鼓血行，不充脉道，故脉微而细；心肾衰减，神气失养，精神极度衰惫，似睡而非睡，呈昏沉迷糊“但欲寐”之状。故五苓散不属于少阴证。

- A.戴眼反折
- B.目睛微定
- C.昏睡露睛
- D.双睑下垂
- E.横目斜视

155 痰热内闭的目态是

答案:B

解析:B

目睛微定是指病人的两眼固定，不能转动，常为肝风内动之先兆，或见于痰热内闭证。双睑下垂多为先天不足，脾肾亏虚。A指病人眼睛上视不能转动，多见于小儿急惊风；C多见于脾胃虚衰，或吐泻伤津。

脾肾两亏的目态是

答案:D

解析:D

目睛微定是指病人的两眼固定，不能转动，常为肝风内动之先兆，或见于痰热内闭证。双睑下垂多为先天不足，脾肾亏虚。A指病人眼睛上视不能转动，多见于小儿急惊风；C多见于脾胃虚衰，或吐泻伤津。

156 孕妇应慎用的药物是

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 牛黄
- D. 鱼腥草
- E. 蒲公英

答案:C

解析:C

孕妇应慎用有通经祛瘀、行气破滞、活血堕胎作用，辛热性质的药物，如茅根、木通、瞿麦、通草、薏苡仁、赭石、芒硝、桃仁、牡丹皮、三棱、牛膝、干姜、肉桂、半夏、皂角、南星、槐花、蝉蜕、牛黄等，都属于妊娠期慎用药。故本题选 C。

157 羚羊角入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烩化

答案:D

解析:D

需另煎的药材主要是某些贵重药材，是为了更好地煎出有效成分，故羚羊角入汤剂需另煎。故本题选 D。

158 钩藤入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烩化

答案:B

解析:B

有效成分不耐煎煮，久煎容易被破坏的药（如青蒿、大黄、番泻叶、臭梧桐、麦芽、谷芽、神曲、白芥子、杏仁、钩藤等），入汤剂宜后下。故本题选 B。

159 蝉蜕的主要归经是

- A. 肺、脾
- B. 肺、肾
- C. 肺、心
- D. 肺、肝
- E. 肺、大肠

答案:D

解析:D

蝉蜕主要归肺、肝经。故本题选 D。

160 治疗热毒蕴结，咽喉红肿疼痛，又兼肺热咳嗽，痰多者，应首选

- A. 射干
- B. 鱼腥草
- C. 马勃
- D. 板蓝根
- E. 山豆根

161 (共用选项)

A.黏液血便

B.腹痛，排便次数增多

C.腹泻，便后缓解

D.腹部压痛

E.里急后重

162.溃疡性结肠炎最主要的症状是

【正确答案】 C

【答案解析】 腹泻，为溃疡性结肠炎最主要的症状，常反复发作或持续不愈，轻者每天排便 2—4 次，便血轻或无。重者排便频繁，脓血显见，甚至大量便血。黏液血便是本病活动期的重要表现。

163.溃疡性结肠炎活动期的重要表现是

【正确答案】 A

【答案解析】腹泻，为溃疡性结肠炎最主要的症状，常反复发作或持续不愈，轻者每天排便 2—4 次，便血轻或无。重者排便频繁，脓血显见，甚至大量便血。黏液血便是本病活动期的重要表现。

(共用选项)

- A. 颗粒管型
- B. 透明管型
- C. 少量白细胞
- D. 畸形红细胞
- E. 白细胞管型

164. 尿沉渣检查，肾盂肾炎多见

【正确答案】 E

【答案解析】尿沉渣检查，肾盂肾炎多见白细胞管型，慢性肾衰竭多见颗粒管型。

165 尿沉渣检查，慢性肾衰竭多见

【正确答案】 A

【答案解析】尿沉渣检查，肾盂肾炎多见白细胞管型，慢性肾衰竭多见颗粒管型。

(共用选项)

A. 37.3℃—38℃

B.39.1°C——41°C

C.38.1°C——39°C

D.>41°C

E.39.1°C——40°C

166.低热为

【正确答案】A

【答案解析】按发热的高低可分为：低热为 37.3°C——38°C；中等度热为 38.1°C——39°C；高热为 39.1°C——41°C；超高热为 41°C以上。

167.中等度热为

【正确答案】C

【答案解析】按发热的高低可分为：低热为 37.3°C——38°C；中等度热为 38.1°C——39°C；高热为 39.1°C——41°C；超高热为 41°C以上。

(共用选项)

A.白血病

B.传染性单核细胞增多症

C.急性胆囊炎

D.钩端螺旋体病

E.流行性感冒

168 发热伴寒战常见于

【正确答案】 C

【答案解析】 发热伴寒战见于肺炎球菌肺炎、败血症、急性溶血性疾病、急性胆囊炎、疟疾等。

169.发热伴结膜充血常见于

【正确答案】 D

【答案解析】 发热伴随结膜充血见于流行性出血热、斑疹伤寒、钩端螺旋体病等。

(共用选项)

A.输尿管结石

B.十二指肠溃疡

C.急性胆囊炎

D.心绞痛

E.颅内压增高

170 心前区疼痛呈压榨样并有窒息感常见于

【正确答案】 D

【答案解析】 心前区疼痛呈压榨样并有窒息感常见于心绞痛。

171.右上腹疼痛放射至右肩胛下区常见于

【正确答案】 C

【答案解析】 右上腹疼痛放射至右肩胛下区常见于急性胆囊炎

172.关于视网膜的叙述，下列哪项是正确的

- A.中央凹是盲点 B.视神经盘感光较敏锐 C.睫状体部有感光作用
- D.虹膜部无感光作用 E.以上都不对

答案：D

173.不属于膜迷路的结构是

- A.前庭 B.椭圆囊 C.球囊 D.膜半规管 E.蜗管

答案：A

174.《中华人民共和国执业医师法》适用于

- A.依法取得执业医师资格的人
- B.依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格的专业医务人员
- C.依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，在医疗机构中执业的专业医务人员
- D.依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗机构中执业的专业医务人员

员

E.依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员

答案：E

175 具备下列条件的可以参加执业助理医师资格考试：具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中试用期满

A.6 个月 B.11 个月 C.一年 D.二年 E.三年

答案：C

176.以下情形中不予医师执业注册的是

A.受过刑事处罚的

B.受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满三年的

C.不具有完全民事行为能力的

D.受过吊销医师执业证书行政处罚的

E.受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起至申请注册之日不满三年的

答案：C

177.医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形之一是

A.受罚款行政处罚

B.受警告行政处罚

C.受责令暂停几个月执业活动的行政处罚

D.中止医师执业活动满一年的

E.受吊销执业证书行政处罚的

答案：E

178.医师使用的药品消毒药剂和医疗器械应当是

A.所在医疗单位允许使用的 B.正式生产的 C.有经营权的单位销售的

D.经临床证明可以使用的 E.经国家有关部门批准使用

答案：E

179.未经医师(士)亲自诊查病人或亲自接产中,医疗机构不得出具以下证明文件,除了

A.疾病诊断书 B.健康证明书 C.死产报告书

D.死亡证明书 E.医疗纠纷分析证言

答案：E

180.我国的传染病防治法规定管理的在传染病是指

A.鼠疫、艾滋病 B.鼠疫、霍乱 C.鼠疫、霍乱、艾滋病

D.鼠疫、霍乱、伤寒和副伤寒 E.鼠疫、霍乱、艾滋病、伤寒和副伤寒

答案：B

181 下列剂型中没有固定剂型的是

A. 酒剂

B. 锭剂

C. 茶剂

D. 丹剂

E. 散剂

答案:D

解析:D

内服丹剂没有固定剂型，有丸剂也有散剂；外用丹剂亦称丹药。故本题选 D。

182 清热解毒与疏散风热并用，寓“火郁发之”之义的方剂是

A. 黄连解毒汤

B. 普济消毒饮

C. 清瘟败毒饮

D. 青蒿鳖甲汤

E. 龙胆泻肝汤

答案:B

解析:B

火郁，是指热邪伏于体内；发，是因势利导、发泄之意。普济消毒饮中升麻、柴胡疏散风热，并引诸药上达头面，且寓“火郁发之”之意，功兼佐使之用。故本题选 B。

183 胶艾汤主治证的病机是

A. 冲任虚损

B. 脾阳不足

C. 血热妄行

D. 肝火犯肺

E. 下焦瘀热

答案:A

解析:A

胶艾汤有止血调经安胎之功用，用于妇女冲任虚损，崩漏下血之证。故本题选 A。

184 旋覆代赭汤的功用不包括

A. 益气

B. 降逆

- C. 和胃
- D. 止咳
- E. 化痰

答案:D

解析:D

旋覆代赭汤降逆化痰，益气和胃。故本题选 D。

185 两臂酸痛或抽掣，不得上举，两手麻木，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 茯苓丸
- B. 定痫丸
- C. 地黄饮子
- D. 补阳还五汤
- E. 独活寄生汤

答案:A

解析:A

茯苓丸的主治为两臂酸痛或抽掣，不得上举，两手麻木，舌苔白腻，脉弦滑者。定痫丸主治痰热痫证，症见忽然发作，晕倒，甚则抽搐，目斜口喎，痰涎直流，叫喊作声。地黄饮子主治舌体强硬不能言语，筋骨软弱不能行走，病人口干但不思饮，脉象沉、细、弱。补阳还五汤主治舌体强硬不能言语，筋骨软弱不能行走，病人口干但不思饮，脉象沉、细、弱。独活寄生汤主治痹证日久，肝肾两虚，气血不足证，腰膝疼痛，痿软，肢节屈伸不利。

186 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余的药物是

- A. 熟地、鹿角霜、炮姜、桂枝、生甘草
- B. 生地、真阿胶、姜炭、桂枝、细辛
- C. 熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、生甘草
- D. 熟地、龟板胶、干姜、肉桂、川芎
- E. 生地、鹿角胶、炮姜、细辛、炙甘草

答案:C

解析:C

阳和汤中用的是姜炭，肉桂，生甘草。

187 哮喘持续状态是指哮喘发作严重，时间持续在

- A. 1~2 小时
- B. 3~4 小时
- C. 5~6 小时
- D. 8~12 小时
- E. 24 小时以上

答案:E

解析:E

哮喘持续状态是指哮喘发作严重，时间持续在 24 小时以上。故本题选 E。

188 治疗原发性支气管肺癌阴虚毒热证，应首选

- A. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
- B. 血府逐瘀汤
- C. 导痰汤
- D. 沙参麦冬汤
- E. 十枣汤

答案:A

解析:A

治疗原发性支气管肺癌阴虚毒热证，治以滋阴解毒，方选沙参麦冬汤合五味消毒饮加减。B 用于气滞血瘀证，C 用于痰湿毒蕴证，D 合五味消毒饮用于阴虚毒热证。故本题选 A。

189 前间壁心肌梗死特征性心电图改变，见于

- A. V3、V4、V5
- B. V1、V2、V3、V4、V5
- C. V1、V2、V3
- D. V5、I、aVL
- E. II、III、aVF

答案:C

解析:C

前间壁心肌梗死特征性心电图改变常常表现在 V1、V2、V3 导联。V3、V4、V5 与 V1、V2、V3、V4、V5 属于广泛前壁梗死；V5、I、avL 属于侧壁梗死；II、III、aVL 属于下壁梗死。故本题选 C。

190 治疗冠心病心绞痛气阴两虚证，可采用的是

- A. 血府逐瘀汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂、钙离子拮抗剂
- B. 补阳还五汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂、利尿剂
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤与硝酸酯制剂、ACEI 剂、钙离子拮抗剂
- D. 生脉散合炙甘草汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂、钙通道阻滞剂
- E. 当归四逆汤合苏合香丸与利尿剂、硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂

答案:D

解析:D

治疗冠心病心绞痛气阴两虚，治以益气养阴，活血通络，方选生脉散合炙甘草汤加减。西药选择硝酸酯制剂（硝酸甘油、单硝酸异山梨酯）、 β 受体阻滞剂（普萘洛尔）、钙通道阻滞剂（维拉帕米）。故本题选 D。

191 风湿性心脏瓣膜病并发栓塞，最常见于

- A. 二尖瓣狭窄合并心力衰竭
- B. 二尖瓣狭窄合并心房纤颤
- C. 二尖瓣关闭不全合并心力衰竭
- D. 二尖瓣关闭不全合并主动脉瓣关闭不全
- E. 二尖瓣狭窄合并关闭不全

答案:B

解析:B

192 患者，男，32 岁。皮肤出现青紫斑点 5 日，伴有鼻衄，口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。治疗本病应首选的方剂是

选项:

- A. 泻白散
- B. 十灰散
- C. 茜根散
- D. 归脾汤
- E. 黄土汤

答案:B

解析:紫斑之血热妄行证的主症：皮肤出现青紫斑点或斑块，或伴有鼻衄、齿衄，便血、尿血，或有发热，口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。治宜清热解毒，凉血止血，方用十灰

散加减。

193 题型:A2 型题

题目:

黄疸患者,身目俱黄,黄色鲜明,恶心欲吐,发热恶寒,无汗身痛,小便短赤,舌苔薄黄腻,脉弦滑。治疗应首选

选项:

- A.大柴胡汤
- B.小柴胡汤
- C.麻黄连翘赤小豆汤
- D.茵陈蒿汤
- E.犀角散

答案:C

解析:黄色鲜明为阳黄,恶心欲吐,发热恶寒,无汗身痛,为湿热壅阻于表,气机不畅,脾运失职。故为湿热兼表证,用清热利湿,加重宣散化湿的力量,用麻黄连翘赤小豆汤。故选C。茵陈蒿汤用于热重于湿无表证者;犀角散用于急黄热毒入血证。

194 题型:A1 型题

题目:

有头疽切开引流常作

选项:

- A.对口引流
- B.一字形切口
- C.十字形切口
- D.梭形切口
- E.S形切口

答案:C

解析:有头疽的外治方法。有头疽的酿脓期,若疮肿有波动感,采用手术扩创排毒,作“+”或“++”字形切开。

195 题型:A1 型题

题目:

下列各项中不属于疔的疾病是

选项:

- A.颈疔
- B.脐疔
- C.腋疔
- D.锁喉疔
- E.委中毒

答案:D

解析:颈疔、脐疔、腋疔、委中毒均属于疔的范畴,而锁喉疔属于发的范

196 题型:A2 型题

题目:

患者，女，28岁。产后乳房胀痛，位于乳房外上方皮肤焮红，肿块形似鸡卵，压痛明显，按之中软，有波动感，伴壮热口渴。切开引流的部位及切口是
选项：

- A.循乳络方向做放射状切口
- B.乳晕旁弧形切口
- C.脓肿处做任意切口
- D.以乳头为中心的弧形切口
- E.脓肿波动明显处做切口

答案:A

解析:一般采用与乳头方向呈放射状的切口，切口位置选择脓肿稍低的部位，切口长度与脓腔基底的大小一致，使引流通畅不致袋脓，但需避免手术损伤乳络形成乳痿。因为乳腺每一腺叶有单独的腺管(乳管)，呈放射状聚向乳头，并分别开口于乳头

197 题型:A2 型题

题目:

患者，男，65岁。因感冒伴发口唇成群小水疱，破溃后呈糜烂与结痂，自觉瘙痒，灼热。其治法是

选项:

- A.内服黄连解毒汤
- B.内服普济消毒饮
- C.内服五味消毒饮
- D.外搽青吹口油膏
- E.外搽白玉膏

答案:D

解析:本病好发于皮肤黏膜交界处，如口角、唇缘、鼻孔周围和外生殖器等处，若发生在口腔、咽部、眼结膜等处，称黏膜热疮；发生于外生殖器部位，称阴部热疮。皮损以糜烂、结痂为主，若向愈时，以紫金锭磨水，或青吹口油膏、黄连膏等外搽，内服辛夷清肺饮加减

198 题型:A2 型题

题目:

患者，男，18岁。双手背起结节2年，如豆般大，坚硬粗糙，表面蓬松枯槁，色黄，皮损范围有扩大趋势，无任何不适，舌红苔薄，脉弦数。诊断为

选项:

- A.扁瘡
- B.跖疣
- C.鼠乳
- D.疣目
- E.丝状疣

答案:D

解析:疣是一种发于皮肤浅表的良性赘生物。因其皮损形态及发病部位不同而名称各异，如发于手背、手指、头皮等处者，称疣目。

199 题型:A2 型题

题目:

患者，女，18岁。两小腿皮肤炎症在急性阶段，大量渗液且红肿。外治剂宜用

选项:

- A.洗剂
- B.粉剂
- C.溶液湿敷
- D.油剂
- E.软膏

答案:C

解析:皮损以糜烂、渗液为主者应予溶液湿敷。皮损以糜烂、渗液为主者，选用绿茶、马齿苋、黄柏、羊蹄草、石韦、蒲公英、桑叶等；煎水湿敷，或以10%黄柏溶液湿敷。第十一节接触性皮炎

200 题型:A1 型题

题目:

以下哪一项为淋病的临床特点

选项:

- A.龟头红肿，包皮内有多量脓性分泌物
- B.外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿
- C.尿道分泌物少，为黏液状
- D.尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物
- E.外生殖器多为单个无痛性溃疡

答案:D

解析:本病患者在排尿开始时尿道外口刺痛或灼热痛，排尿后疼痛减轻。尿道口溢脓，开始为浆液性分泌物，以后逐渐出现黄色黏稠的脓性分泌物