

全国护士执业资格考试

考前密押卷(三)

专业实务

1、上消化道出血最常见的原因是

- A、门脉高压症
- B、出血性胃炎
- C、消化性溃疡
- D、胃癌
- E、胆道出血

答案：C

2、慢性心力衰竭最常见的诱因是

- A、妊娠
- B、水电解质平衡紊乱
- C、服用洋地黄药物
- D、感染
- E、过度劳累

答案：D

3、发生急性左心衰竭时，病人应采取的体位是

- A、平卧位
- B、头高脚低位
- C、头低脚高位
- D、侧卧位
- E、坐位，两腿下垂

答案：E

4、对于急性肺水肿病人，护士应选择哪种给氧方式

- A、持续低流量给氧
- B、低流量间断给氧
- C、高流量持续给氧
- D、高流量持续酒精湿化给氧
- E、低流量持续酒精湿化给氧

答案：D

5、左心功能不全最早和最常见的症状是

- A、劳力性呼吸困难
- B、咳嗽
- C、气短，伴咳粉红色泡沫痰
- D、心悸
- E、少尿

答案：A



英杰医学

YINGJIE.COM

6、下列关于心源性水肿的说法正确的是

- A、是左心功能不全的表现
- B、水肿时醛固酮减少
- C、毛细血管内压降低
- D、水肿先出现在身体下垂部位
- E、有效循环血容量增多

答案：D

7、蜘蛛痣的形成与下列何种因素有关

- A、血小板减少
- B、血中雌激素增加
- C、毛细血管脆性增加
- D、凝血机制障碍
- E、严重感染

答案：B

8、治疗军团菌肺炎的首选抗生素是

- A、林可霉素
- B、红霉素
- C、庆大霉素
- D、头孢氨苄
- E、羟氨苄青霉素

答案：B

9、咯血患者的关键护理措施是

- A、消除心理不良因素
- B、保持呼吸道通畅
- C、减少活动，保持安静
- D、准备好急救药品和器械
- E、给予镇静、镇咳等对症处理

答案：B

10、关于胸腔闭式引流的护理，下列哪项不正确

- A、病人可采取半卧位
- B、观察引流管是否通畅
- C、注意无菌操作
- D、引流管的位置必须低于胸腔
- E、肺组织修复后立即拔管

答案：E

11、患者女，34岁。今早主诉昨晚夜间多梦易醒，下午医生开出医嘱：地西洋 5mg，po，sos。当晚患者睡眠良好，该患者医嘱未执行。值班护士应在次日上午，在该项医嘱栏内

- A、用红笔写上“作废”
- B、用蓝笔写上“未用”
- C、用红笔写上“未用”
- D、用蓝笔写上“失效”
- E、用红笔写上“失效”

答案：C

12、鼻饲液的温度为



-
- A、28 ~ 30℃
 - B、30 ~ 31℃
 - C、32 ~ 34℃
 - D、35 ~ 36℃
 - E、38 ~ 40℃

答案：E

13、判断患者临床死亡期的主要指标是

- A、桡动脉搏动不可触及
- B、肌张力减退
- C、身体温度接近室温
- D、脑干反射消失
- E、瞳孔对光反射消失

答案：D

14、静脉输液时，茂菲氏滴管内的液面自行下降，原因是

- A、输液速度过快
- B、滴管或滴管以下导管有漏气
- C、环境温度太低
- D、输液瓶挂得太高
- E、患者肢体摆放不当

答案：B

15、胆囊造影前一日晚餐应给予

- A、高热量、高蛋白饮食
- B、无脂肪、低蛋白饮食
- C、高脂肪、高蛋白饮食
- D、低蛋白、低糖饮食
- E、高热量、低蛋白饮食

答案：B

16、无菌技术操作时，正确的是

- A、定期检查无菌物品保存情况，有效期为14天
- B、操作者要修剪指甲，为方便操作，应将手表尽量塞进衣袖
- C、取出的用物没有用完应及时放回原无菌容器中
- D、操作环境要清洁，操作前半小时禁止清扫工作
- E、操作者不得跨越无菌区，手臂始终保持在操作台面以上

答案：D

17、法洛四联症的四种病理变化中最重要的是

- A、肺动脉狭窄
- B、主动脉骑跨
- C、室间隔缺损
- D、房间隔缺损
- E、动脉导管未闭

答案：A

18、室性心动过速最常见的病因是

- A、心脏瓣膜病
- B、感染性心内膜炎

- C、冠心病
- D、心肌炎
- E、心肌病

答案：C

19、常见的青紫型先天性心脏病是

- A、动脉瓣狭窄
- B、房间隔缺损
- C、室间隔缺损
- D、法洛四联症
- E、动脉导管未闭

答案：D

20、临床上最常见的心律失常为

- A、窦性心律不齐
- B、窦性心动过缓
- C、窦性心动过速
- D、心室颤动
- E、期前收缩

答案：E

21、下列保持大便通畅措施中，心力衰竭病人不适宜采用的是

- A、摄入足够量的水分
- B、养成定时大便的习惯
- C、开塞露的应用
- D、进食容易消化的食物
- E、多吃含纤维素多的食物

答案：A

22、心脏瓣膜的功能是

- A、防止感染
- B、净化血液
- C、起部分血液泵作用
- D、调节心脏功能
- E、防止血液反流

答案：E

23、二尖瓣膜位于什么部位

- A、左侧房室之间
- B、右侧房室之间
- C、左心室与主动脉之间
- D、右心室与主动脉之间
- E、左右心室之间

答案：A

24、心脏传导系统中自律性最高的是

- A、房室结
- B、结间束
- C、希氏束
- D、窦房结



E、浦肯野细胞

答案：D

25、长期卧床的心力衰竭病人，进行皮肤护理的重点部位是

A、胫前

B、踝部

C、腹部

D、双下肢

E、腰骶部

答案：E

26、由于心排血量突然下降出现的晕厥为称

A、心脏骤停

B、阿-斯综合征

C、脑卒中

D、低血糖综合征

E、急性心肌梗死

答案：B

27、低血糖反应的急救有效措施是

A、减少胰岛素用量

B、就地休息

C、立即输入氯化钠

D、立即食糖果或含糖饮料

E、加大饭量

答案：D

28、关于丹毒病人的护理，下列哪项是错误的

A、急性期局部做热敷

B、局部硫酸镁湿敷

C、患肢抬高，制动

D、抗生素的应用

E、需床边隔离

答案：A

29、护理程序五个步骤中，哪项是错误的

A、评估

B、诊断

C、治疗

D、实施

E、评价

答案：C

30、低钾血症时静脉输液补钾速度一般不超过

A、10mmol/h

B、20mmol/h

C、30mmol/h

D、40mmol/h

E、50mmol/h

答案：B



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

31、高钾血症时，静脉注射 10%葡萄糖酸钙的作用是

- A、改善微循环状况
- B、纠正酸中毒
- C、促使钾离子移向细胞内
- D、增加神经肌肉应激性
- E、增加心肌收缩力

答案：C

32、下列哪一项不是评价营养不良的指标

- A、体重下降超过 20%
- B、血浆白蛋白小于 30g/L
- C、血浆转铁蛋白小于 200mmol/L
- D、血糖高于 160mg/dL
- E、握力明显减弱

答案：D

33、容易引起急性肾衰竭的损伤是

- A、严重挤压伤
- B、广泛擦伤
- C、严重撕裂伤
- D、多处刺伤
- E、冻伤

答案：A

34、休克时病人的体位应取

- A、半卧位
- B、头低足高位
- C、头与躯干抬高 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ ，下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- D、头高足低位
- E、侧卧位

答案：C

35、破伤风最早出现的症状是

- A、角弓反张
- B、张口不便
- C、苦笑面容
- D、牙关紧闭
- E、四肢抽搐

答案：B

36、痈与疔的主要鉴别点是

- A、常见于糖尿病患者
- B、致病菌不同
- C、全身中毒症状明显
- D、发生的部位不一样
- E、创面有多个脓肿

答案：E

37、手术区皮肤消毒范围应包括切口周围

- A、5cm



英杰医学
NYINGJIE.COM

- B、10cm
- C、15cm
- D、20cm
- E、25cm

答案：C

38、心跳、呼吸骤停患者，初期复苏护理的首要措施是

- A、立即呼救
- B、开放呼吸道
- C、迅速开放静脉输液通路
- D、严密观察病情变化
- E、准备好常用急救药物和器械物品

答案：B

39、防止术后肺不张，下列哪项是错误的

- A、术前一周卧床休息，减少活动
- B、术前控制呼吸道感染
- C、嗜烟者术前戒烟1~2周
- D、术中或术后防止呕吐物吸入
- E、术前锻炼深呼吸

答案：A

40、烧伤的严重程度分类主要根据是

- A、致伤因子
- B、烧伤部位
- C、病人年龄
- D、烧伤面积和深度
- E、病人体质

答案：D

41、护士的道德义务不包括

- A、监督患者权利实现
- B、保护患者隐私
- C、减轻患者痛苦
- D、告知病情
- E、尊重患者决定

答案：A

42、以下可作为申请护士执业注册的学历证书是

- A、高等教育自学考试护理学专业本科毕业证书
- B、普通中等专业学校三年制全日制普通中专毕业证书
- C、普通高等学校夜大护理学专业大专毕业证书
- D、成人高等学校全日制护理学专业专升本毕业证书
- E、重点高等医学教育机构网络教育毕业证书

答案：B

43、护士申请延期注册的时间应为

- A、有效期届满前60天
- B、有效期届满后半年
- C、有效期届满当天



D、有效期届满前 30 天

E、有效期届满后 30 天

答案：D

44、护士的面部表情应根据不同的环境和需要有所不同，下列不妥的是

A、任何情况不气愤

B、面对病人时，应真诚友好

C、面对疾病缠身者，应给予关注和安慰

D、面对疼痛的患者应微笑

E、面对危重病人，表情凝重

答案：D

45、根据我国《献血法》规定，择期手术患者手术用血应

A、自行采血

B、自身储血

C、家属献血

D、同型输血

E、互助献血

答案：B

46、某癌症患者检查患有艾滋病，护士在对此患者的护理行为中违反护理伦理的是

A、对其一视同仁

B、尊重患者

C、认真观察病情变化

D、鼓励积极配合治疗

E、以患者为例大力宣传艾滋病

答案：E

47、患者，女性，65 岁，因车祸脑部外伤入院手术。术后第 4 天患者可以唤醒，随后入睡，对所提问题能正确回答，但反应迟钝。护士根据患者的情况判断患者的意识状态属于

A、昏睡

B、嗜睡

C、浅昏迷

D、深昏迷

E、意识模糊

答案：B

48、患者女，60 岁，住院期间需要吸氧，错误的操作是

A、给氧期间不可随意调节氧流量

B、先调节好流量再插管

C、插管前检查导管是否通畅

D、插管前用湿棉签清洁鼻腔

E、停用氧气时先关流量开关

答案：E

49、患者，女性，60 岁，因尿毒症行肾移植术，术后 24h 内护士应给予患者

A、一级护理

B、二级护理

C、三级护理

D、特级护理

E、24h 监护护理

答案：D

50、患者，男性，90岁，因休克型肺炎死亡。临床死亡的诊断标准是

A、出现尸僵

B、各器官新陈代谢停止

C、血压测不到

D、神经反射消失

E、心跳呼吸停止，各种反射消失

答案：E

51、下列哪项对促进乳汁分泌是有害的

A、授乳

B、精神受刺激

C、按摩乳房

D、充足睡眠

E、良好营养

答案：B

52、胎体最早进入骨盆的部分称

A、胎先露

B、胎产式

C、胎方位

D、衔接

E、入盆

答案：A

53、关于早产概念，下列哪项正确

A、妊娠20周至36周间终止者

B、妊娠24周至36周间终止者

C、妊娠28周至36周间终止者

D、妊娠28周至37周间终止者

E、妊娠36周至38周间终止者

答案：D

54、属于横产式的是

A、右枕横

B、肩左前

C、骶左后

D、骶左横

E、颊左前

答案：B

55、属于孕激素的生理作用是

A、使增生期子宫内膜转化为分泌期

B、促使子宫发育及肌层变厚

C、使乳腺腺管增生

D、使阴道上皮增生角化

E、促使水钠潴留

答案：A



英杰医学
INYINGJIE.COM

56、患者，女性，32岁。因晚期产后出血入院，保守治疗不正确的是

- A、止血
- B、平卧位
- C、控制感染
- D、取半坐卧位
- E、防止休克

答案：D

57、最有效的方法是

- A、使用冰槽进行头部降温
- B、冰袋头部冷敷
- C、30%乙醇擦浴
- D、40℃温水擦浴
- E、冰囊冷敷大动脉处

答案：C

58、下列哪项与骨盆底作用无关

- A、承载和支持盆腔脏器
- B、控制排尿
- C、保持盆腔脏器的正常位置
- D、分娩时协助先露部旋转与下降
- E、封闭骨盆出口

答案：B

59、下述哪项属于子宫附件

- A、阴道口
- B、大阴唇
- C、小阴唇
- D、阴唇系带
- E、输卵管

答案：E

60、以下哪项不是儿科临床护理程序的内容

- A、对患儿及家属进行评估
- B、制订实施护理计划
- C、作出护理诊断
- D、进行护理评价
- E、进行出院指导

答案：E

61、患者，男性，37岁，出差中感染了疟疾，发作时明显寒战，全身发抖，面色苍白，口唇发绀，寒战持续约10分钟，体温骤升至40℃，面色潮红，皮肤干热，烦躁不安，持续约3小时，体温又骤降至正常。经过几天的间歇期后，又再次发作，此患者发热的热型是

- A、弛张热
- B、稽留热
- C、间歇热
- D、波浪热
- E、不规则热

答案：C

62、患者，女性，65岁。因胸痛就诊，既往有心绞痛八年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛，症状的主要区别是

- A、引起诱因不同
- B、疼痛部位不同
- C、疼痛性质不同
- D、疼痛表现不同
- E、疼痛持续时间不同

答案：E

63、患者，女性，66岁，大学教授，因血压高住院治疗。适用于该患者的最佳护患关系模式是

- A、指导型
- B、指导-合作型
- C、共同参与型
- D、被动型
- E、主动-被动型

答案：C

64、患者，女性，54岁，有溃疡病史10年，突然上腹部剧痛并波及右下腹。查体：右上腹压痛、反跳痛、肌紧张。护士采取的措施中最重要的是

- A、观察生命体征的变化
- B、禁食胃肠减压
- C、应用制酸药
- D、应用抗生素
- E、卧床休息

答案：B

65、患者，女性，62岁。慢性阻塞性肺气肿病史十多年。今日傍晚进餐时一米粒呛入气管引起剧烈咳嗽，突然呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重。最可能是发生了

- A、自发性气胸
- B、支气管阻塞
- C、胸腔积液
- D、肺栓塞
- E、心肌梗死

答案：A

66、患者，男性，22岁，既往体健，体检时发现肝功能正常，抗-HBs阳性，反复查HBV其他血清标记物均为阴性。表示此患者为

- A、对乙型肝炎病毒有免疫力
- B、乙型肝炎病情稳定
- C、乙型肝炎有传染性
- D、乙型肝炎病毒携带者
- E、乙型肝炎恢复期

答案：A

67、30岁初孕妇，孕38周。自妊娠37周开始自觉头痛、眼花。护士查血压165/105mmHg，宫缩不规律，胎心141次/min，化验单示尿蛋白3.0g/24h。此时该护士首先应采取哪项措施

- A、遵医嘱静脉滴注缩宫素
- B、静脉滴注硫酸镁

C、门诊治疗并注意随访

D、住院待产

E、急诊剖宫产

答案：B

68、初产妇，32岁，行会阴侧切术，产后第4天，会阴伤口水肿，无分泌物和压痛。护士为其制订的护理措施中哪项应除外

A、用1:5000高锰酸钾坐浴

B、会阴擦洗2次/d

C、用95%酒精湿敷

D、局部红外线照射

E、保持外阴清洁干燥

答案：A

69、某产妇，双胎妊娠，产前合并有轻度妊娠期高血压疾病，产后阴道持续出血，胎儿娩出后24小时出血量达600ml，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是

A、胎膜残留

B、胎盘残留

C、凝血功能障碍

D、子宫收缩乏力

E、软产道裂伤

答案：D

70、早产儿，出生后3h出现呼吸困难，拒乳，口唇青紫，三凹征明显，两肺闻及湿啰音，X线胸片透亮度减低。护士制订的护理计划中最主要的护理诊断是

A、营养不足

B、活动无耐力

C、有感染的危险

D、气体交换受损

E、有皮肤受损的危险

答案：D

71、患者女性19岁，患1型糖尿病2年，每日注射胰岛素，平均40U，近1周因胰岛素用完，而停用胰岛素治疗。乏力3天，昏迷4小时，入院。以下哪项检查是最重要的

A、行CT检查

B、做血气分析

C、行血常规检查

D、导尿查尿糖

E、抽血查血糖血酮体

答案：E

72、休克患者经扩容治疗后，测中心静脉压20cmH₂O，血压80/50mmHg，应考虑

A、血容量严重不足

B、心功能不全

C、容量血管过度收缩

D、容量血管过度扩张

E、心功能恢复

答案：B

73、一男性肺癌患者，病理诊断为小细胞肺癌，首选的治疗方法为

- A、手术切除
- B、放射治疗
- C、化疗
- D、单纯营养支持
- E、免疫治疗

答案：C

74、男性，30岁，电工，操作不慎，电流接触不良产生电弧热，引起头面、颈部烧伤，有水疱，部分水疱破损，创面基底苍白，有疼痛，对病人烧伤面积和深度的估计是

- A、4%深Ⅱ度
- B、4%浅Ⅱ度
- C、9%深Ⅱ度
- D、9%浅Ⅱ度
- E、4%Ⅲ度

答案：C

75、患者背部大片明显红、肿、痛，与正常皮肤之间的界限不清，无波动感，伴有寒战、发热、白细胞增加，最可能的诊断是

- A、疖
- B、痈
- C、蜂窝织炎
- D、浅表脓肿
- E、丹毒

答案：B

76、某3岁小儿接种乙脑疫苗，5分钟后突然出现烦躁不安，面色苍白，口周发青，四肢湿冷呼吸困难，脉细弱，应考虑

- A、接种后局部反应
- B、接种后全身反应
- C、接种后局部强反应
- D、接种后中等反应
- E、接种后过敏性休克

答案：E

77、某婴儿出生时体重为3.5kg，生后5个月体重应是

- A、5kg
- B、6kg
- C、7kg
- D、8kg
- E、11kg

答案：C

78、急、慢性胃炎患者有少量出血时，为中和胃酸可给予

- A、米汤
- B、肉汤
- C、绿色蔬菜
- D、温开水
- E、凉开水

答案：A

79、某一外伤患者有休克、昏迷、脾破裂、开放性气胸、开放性胫腓骨骨折等危急情况，抢救时首先应

- A、用升压药物
- B、输血、输液
- C、手术止血
- D、骨折固定
- E、封闭胸壁伤口

答案：B

80、患者，女性，60岁，心率120次/分，心音强弱不等，心律不规则，测脉搏时脉细弱，62次/分且极不规则，为准确观察，护士应

- A、3人一人测心率，一人测脉率，一人计时
- B、2人同时分别测心率和脉率
- C、1人同时测心率和脉率
- D、先测脉率，后测心率
- E、先测心率，后测脉率

答案：B

81、患者，男性，20岁。患血小板减少性紫癜，检查口腔时发现口腔黏膜有散在斑点，左侧下牙龈有瘀斑，为此患者进行口腔护理，应特别注意

- A、蘸水不可过湿以防呛咳
- B、动作轻稳，勿损伤黏膜
- C、擦拭时先擦拭瘀斑处
- D、擦拭时勿触及咽部以免恶心
- E、所有用品均应无菌

答案：B

82、患儿女，9个月。生后一直奶粉喂养，未加辅食，体检：营养差，皮肤苍白，化验：血红蛋白60g/L，红细胞 $2 \times 10^{12}/L$ ，此患儿确诊为营养性缺铁性贫血，导致该患儿缺铁的主要原因是

- A、铁的丢失过多
- B、铁的储存不足
- C、生长发育快
- D、铁的摄入不足
- E、铁的吸收利用障碍

答案：D

83、正常8个月婴儿，体重大约为

- A、6.5kg
- B、7.5kg
- C、8kg
- D、8.5kg
- E、9.2kg

答案：C

84、患儿男，生后2天，已按时完成疫苗接种。体格检查正常，准备出院。家长询问第二次乙使疫苗接种的时间，护士回答正确的是

- A、1月

- B、2月
- C、3月
- D、4月
- E、5月

答案：A

85、患儿，4岁。低钙抽搐需用钙剂治疗，护士凭经验从固定位置取出10%葡萄糖酸钙，未核对。注射后患儿死亡，经查实推注的竟是10%氯化钾。该护士的行为属于

- A、医疗差错
- B、故意犯罪
- C、意外事故
- D、过失犯罪
- E、侵权行为

答案：D

86、男，45岁，吸烟史20年，慢性支气管炎史5年，近1年咳嗽咳痰，发作频繁。护士为病人进行健康教育，下列哪项不妥

- A、增强营养
- B、注意保暖
- C、戒烟和体育锻炼
- D、需经常使用抗生素
- E、镇咳祛痰药

答案：D

87、男，45岁，吸烟史20年，慢性支气管炎史5年，近1年咳嗽咳痰，发作频繁。缓解期宜采用的治疗是

- A、扶正固本免疫治疗
- B、预防性应用抗生素
- C、祛痰止咳剂
- D、小剂量皮质激素
- E、支气管扩张剂

答案：A

88、男性，40岁，体重60kg，因食管癌进食困难1月余。主诉：乏力，极度口渴，尿少而色深。检查：血压、体温均正常，眼窝凹陷，唇、舌干燥，皮肤弹性差。该病人的水、电解质失衡诊断为

- A、轻度高渗性缺水
- B、中度高渗性缺水
- C、重度高渗性缺水
- D、等渗性缺水
- E、低渗性缺水

答案：B

89、男性，40岁，体重60kg，因食管癌进食困难1月余。主诉：乏力，极度口渴，尿少而色深。检查：血压、体温均正常，眼窝凹陷，唇、舌干燥，皮肤弹性差。根据上面水电解质失衡的诊断此病人应补充哪种液体

- A、林吸氏液
- B、3~5%盐水
- C、葡萄糖溶液 + 盐水

D、2%碳酸氢钠

E、乳酸钠

答案：C

90、男性，40岁，体重60kg，因食管癌进食困难1月余。主诉：乏力，极度口渴，尿少而色深。检查：血压、体温均正常，眼窝凹陷，唇、舌干燥，皮肤弹性差。补液后口渴减轻，尿量增多，测血清钾浓度为 3.1mmol/L 。应在尿量达下列哪项指标时补给钾盐

A、 $>20\text{ml/h}$

B、 $>25\text{ml/h}$

C、 $>30\text{ml/h}$

D、 $>35\text{ml/h}$

E、 $>40\text{ml/h}$

答案：E

91、某新生儿出生体重2800克，身长50cm，面色红润，哭声响亮，一般情况好，现母乳喂养该新生儿开乳时间是

A、生后半小时内喂母乳

B、生后6小时喂母乳

C、生后12小时喂母乳

D、生后18小时喂母乳

E、生后24小时喂母乳

答案：A

92、某新生儿出生体重2800克，身长50cm，面色红润，哭声响亮，一般情况好，现母乳喂养母亲授乳时最好的体位是

A、平卧位

B、坐位

C、右侧卧位

D、左侧卧位

E、位

答案：B

93、某新生儿出生体重2800克，身长50cm，面色红润，哭声响亮，一般情况好，现母乳喂养授乳后婴儿应取的体位是

A、左侧卧位

B、右侧卧位

C、平卧位

D、头侧位

E、坐位

答案：B

94、患者，男性，45岁，车祸。患者尺骨、桡骨骨折，伴有开放性伤口，行上臂管型石膏固定。护士为患者采取的正确处理措施是

A、石膏绷带未凝结前，肢体可以随意活动

B、为不影响远端血供，石膏固定应该宽松

C、石膏固定过程中患肢制动，抬高

D、包裹石膏的患肢疼痛时，患者可自行服用镇痛药

E、严密观察被固定肢体的血供

答案：E

95、患者，男性，45岁，车祸。患者尺骨、桡骨骨折，伴有开放性伤口，行上臂管型石膏固定。护士采取的措施中下列哪项可预防患肢发生失用性骨质疏松

- A、加强营养支持
- B、石膏固定不能太紧
- C、未固定的肢体抬高
- D、患肢做肌肉舒缩活动
- E、寒冷季节时肢体远端应注意保暖

答案：D

96、患者，男性，26岁，自感低热、乏力、食欲缺乏，有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等，就医诊断为浸润型肺结核，收入院抗结核治疗。此患者需要隔离，护士应采取以下哪种隔离措施

- A、接触性隔离
- B、一般隔离
- C、呼吸道隔离
- D、严密隔离
- E、昆虫隔离

答案：C

97、患者，男性，26岁，自感低热、乏力、食欲缺乏，有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等，就医诊断为浸润型肺结核，收入院抗结核治疗。关于疾病防治，护士的正确操作应除外

- A、病室每日用紫外线进行空气消毒
- B、护士在病房里不密切接触患者时，可不戴口罩
- C、给予异烟肼、链霉素治疗
- D、需密切观察患者用药后有无副作用
- E、患者痰液用消毒液搅拌静置2h后倒掉

答案：B

98、患者，女性，55岁。有糖尿病史，患者自述外阴瘙痒，白带呈豆腐渣样，妇科检查：外阴有抓痕，黏膜有白色膜状物。该患者为

- A、细菌性阴道病
- B、滴虫阴道炎
- C、宫颈糜烂
- D、老年性阴道炎
- E、外阴阴道假丝酵母菌病

答案：E

99、患者，女性，55岁。有糖尿病史，患者自述外阴瘙痒，白带呈豆腐渣样，妇科检查：外阴有抓痕，黏膜有白色膜状物。局部用冲洗液的浓度是

- A、0.1%~0.5%碳酸氢钠溶液
- B、0.3%~0.5%碳酸氢钠溶液
- C、2%~4%碳酸氢钠溶液
- D、4%~5%碳酸氢钠溶液
- E、5%~6%碳酸氢钠溶液

答案：C

100、患者，女性，55岁。有糖尿病史，患者自述外阴瘙痒，白带呈豆腐渣样，妇科检查：外阴有抓痕，黏膜有白色膜状物。局部冲洗后阴道应放置

- A、青霉素

- B、红霉素
 - C、链霉素
 - D、甲硝唑泡腾片
 - E、制霉菌素片
- 答案：E

实践能力

1、呼吸衰竭发生时，最早因缺氧发生损害的组织器官是

- A、大脑
- B、心脏
- C、肝脏
- D、脾脏
- E、肺脏

答案：A

2、二尖瓣面容的特点是

- A、两颊部蝶形红斑
- B、两颊部紫红，口唇轻度发绀
- C、两颊黄褐斑
- D、午后两颊潮红，面色红润
- E、面部毛细血管扩张

答案：B

3、不属于新生儿常见的正常生理状态的是

- A、乳腺增大
- B、生理性黄疸
- C、臀红
- D、假月经
- E、螳螂嘴

答案：C

4、急性黄疸型肝炎黄疸前期最突出的表现是

- A、消化道症状
- B、呼吸道症状
- C、泌尿道症状
- D、呼吸系统症状
- E、血液系统症状

答案：A

5、对血液疾病患者进行长期用药指导的内容不包括

- A、药物的名称剂量、用药方法
- B、教会病人或家属观察药物的不良反应监测
- C、教会病人或家属观察药物的疗效
- D、根据药物疗效调整药物剂量
- E、指导患者时间药效的观点

答案：D

6、新生儿硬肿症最先受累的部位是



-
- A、上肢
 - B、面颊
 - C、下肢
 - D、后背
 - E、臀部

答案：C

7、肝硬化患者出现全血细胞减少的原因主要是

- A、血液稀释
- B、脾功能亢进
- C、肝衰竭
- D、营养不良
- E、隐性失血过多

答案：B

8、强迫症的发病高峰的年龄阶段是

- A、婴儿期
- B、幼儿期
- C、青少年期
- D、性成熟期
- E、老年期

答案：C

9、典型心绞痛发作的部位常位于

- A、心前区且向左上肢前内侧放射
- B、胸骨体中段或上段后且向左上肢前内侧放射
- C、胸骨下段且向左肩背部放射
- D、心尖区且向左肩背部放射
- E、右肋缘且向右上肢前外侧放射

答案：B

10、急性心肌梗死的处理中不正确的是

- A、控制休克
- B、消除心律失常
- C、使用止痛药物
- D、再灌注心肌
- E、保护肾功能

答案：E

11、下列哪项检查结果提示可能是慢性肝炎与肝硬化

- A、血清转氨酶升高
- B、血清碱性磷酸酶升高
- C、血清直接胆红素升高
- D、白蛋白与球蛋白比例倒置
- E、凝血酶原时间延长

答案：D

12、成年男性正常的血红蛋白参考值为

- A、100 ~ 140g/L
- B、110 ~ 150g/L



英杰医学
YINGJIE.COM

- C、120 ~ 160g/L
- D、140 ~ 170g/L
- E、170 ~ 200g/L

答案：C

13、镜下脓尿是指离心沉淀后的尿沉渣在每高倍镜视野中见到的白细胞为

- A、1 个
- B、2 个
- C、3 个
- D、4 个
- E、5 个

答案：E

14、网织红细胞减少，主要见于

- A、缺铁性贫血
- B、出血性贫血
- C、再生障碍性贫血
- D、溶血性贫血
- E、营养性巨幼细胞贫血

答案：C

15、尿蛋白定量标本瓶内应加防腐剂

- A、甲苯 5ml
- B、甲醛 5ml
- C、浓盐酸 5ml
- D、稀盐酸 5ml
- E、石碳酸 5ml

答案：A

16、下列哪项检查，主要反映肾小球滤过功能

- A、酚红排泄试验
- B、尿液常规检查
- C、尿浓缩稀释试验
- D、内生肌酐清除率检查
- E、一小时尿细胞排泄率检查

答案：D

17、上消化道出血病人的粪便可呈

- A、脓血样
- B、果酱样
- C、米泔水样
- D、柏油样
- E、白陶土样

答案：D

18、下列哪项化验结果是冠心病的危险因素：

- A、血清总胆固醇下降
- B、血清甘油三脂下降
- C、血清高密度脂蛋白 - 胆固醇增高
- D、血清低密度脂蛋白 - 胆固醇增高



英杰医学

YINGJIE.COM

E、血清肌酸磷酸激酶降低

答案：D

19、在体液平衡中下列哪项不对

A、细胞内液约为体重的 40%

B、细胞外液约为体重的 20%

C、组织间液约为体重的 15%

D、血浆约为体重的 5%

E、它们之间是非动态平衡

答案：E

20、脑复苏中首选的脱水剂为

A、25%葡萄糖液

B、50%葡萄糖液

C、20%甘露醇

D、速尿

E、尿素

答案：C

21、尿路结石的主要症状是

A、发热寒颤

B、排尿困难

C、尿频尿急、尿不尽

D、与活动有关的疼痛

E、无痛性血尿

答案：D

22、右心衰竭病人查体时可出现

A、细脉

B、颈静脉怒张

C、阵发性夜间呼吸困难

D、心尖区收缩期奔马律

E、双肺底湿啰音

答案：B

23、慢性支气管炎最常见的并发症为

A、肺脓肿

B、呼吸道感染

C、阻塞性肺气肿

D、支气管扩张

E、哮喘

答案：C

24、绒毛癌最常见的死亡原因是

A、阴道转移

B、淋巴转移

C、脑转移

D、肾转移

E、骨转移

答案：C



英杰医学

YINGJIE.COM

25、肝性脑病最早出现的临床表现是

- A、角弓反张
- B、锥体束征阳性
- C、视物模糊
- D、昏迷不醒，呼之不应
- E、性格和行为改变

答案：E

26、支气管扩张患者一天中咳嗽、咳痰最重的时间是

- A、晨起
- B、白天
- C、睡醒
- D、凌晨
- E、傍晚

答案：A

27、腹外疝内容物最多见的是

- A、小肠
- B、大网膜
- C、大肠
- D、盲肠
- E、膀胱

答案：A

28、急性胆囊炎在非手术治疗期间若出现胆囊穿孔，最主要的护理措施是

- A、做好紧急手术的准备
- B、药物止痛
- C、镇静心理安慰
- D、物理降温
- E、药物降温

答案：A

29、支气管扩张大咯血患者最危险且最常见的并发症是

- A、严重失血
- B、休克
- C、窒息
- D、继发感染
- E、高热

答案：C

30、产后出血为胎儿娩出后 24h 内阴道出血量超过

- A、250ml
- B、350ml
- C、500ml
- D、800ml
- E、1000ml

答案：C

31、有关 B 超检查胆道疾病的优点中，哪项不正确

- A、确诊率高



金英杰医学
YINYINGJIE.COM

-
- B、安全，无痛苦
 - C、术前不需禁食、禁水
 - D、无任何禁忌证
 - E、是无损伤检查法

答案：C

32、胆总管结石与胰头癌的主要鉴别点是

- A、有无皮肤瘙痒
- B、有无胆囊肿大
- C、有无进行性加重黄疸
- D、有无肝功能改变
- E、有无淀粉酶改变

答案：C

33、王先生，35岁，长期吸烟，右下肢反复发作静脉炎，并有间歇性跛行，最可能的诊断是

- A、雷诺病
- B、动脉栓塞
- C、大动脉炎
- D、血栓闭塞性脉管炎
- E、动脉硬化性闭塞症

答案：D

34、泌尿外科患者的护理中，尤为重要的是

- A、记出入量
- B、保持床单位整洁
- C、鼓励多饮水
- D、保持尿液引流通畅
- E、及时更换被浸湿的敷料

答案：D

35、下列哪项不是膀胱镜检查的禁忌证

- A、膀胱容量小于50毫升
- B、膀胱肿瘤早期
- C、全身感染严重
- D、尿路急性炎症
- E、尿道狭窄

答案：B

36、骨折、脱位共有的特殊体征是

- A、弹性固定
- B、异常活动
- C、骨擦音
- D、畸形
- E、关节部位空虚

答案：D

37、开放性骨折最重要的治疗措施是

- A、早期彻底清创
- B、早期使用抗生素

- C、及时使用 TAT
- D、及时复位固定
- E、镇静止痛

答案：A

38、下列哪项不是骨折的专有体征

- A、功能障碍
- B、创伤处畸形
- C、假关节活动
- D、骨擦音
- E、骨擦感

答案：A

39、妊娠后心血管系统发生变化不会出现的是

- A、心搏出量增加
- B、心率加快
- C、大血管扭曲
- D、心尖部可闻舒张期杂音
- E、膈肌上抬，心脏变位

答案：D

40、新生儿出生时呼吸频率约为

- A、10~20 次/分
- B、20~30 次/分
- C、30~40 次/分
- D、40~60 次/分
- E、60~70 次/分

答案：D

41、患者，女性，34 岁，停经 3 个月，腹痛，阴道规则出血 2 周，今日阴道流出水泡状物。

查体：子宫如孕 4 个月大，正确的诊断是

- A、异位妊娠
- B、不全流产
- C、葡萄胎
- D、侵蚀性葡萄胎
- E、子宫肌瘤

答案：C

42、患者，男性，35 岁，患有风湿热 8 年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为慢性风湿性瓣膜病、二尖瓣狭窄，二尖瓣狭窄最早出现的症状是

- A、消化道症状
- B、咯血
- C、劳力性呼吸困难
- D、肝区疼痛
- E、全身水肿

答案：C

43、患者，女性，46 岁，诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血病因，首选的检查方法是

- A、大便隐血试验

- B、X线检查
- C、内镜检查
- D、血常规检查
- E、B超检查

答案：C

44、患者，女性，足月产后4天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软。考虑其最可能的病理是

- A、腹膜炎
- B、阴道炎
- C、盆腔结缔组织炎
- D、急性输卵管炎
- E、子宫内膜炎

答案：E

45、患儿女，6个月，被医生诊断为维生素D缺乏性佝偻病初期，此患儿主要症状是

- A、颅骨软化
- B、肋骨串珠
- C、肌肉松弛
- D、佝偻病手镯
- E、神经精神症状

答案：E

46、患者，男性，34岁，既往体健，2小时前在提重物后突然剧烈头痛，伴喷射状呕吐，呼吸减慢，心率减慢，血压升高，这种现象是

- A、急性颅脑感染
- B、脑神经受刺激
- C、牵涉性头痛
- D、颅内压增高
- E、神经官能症

答案：D

47、患者，女性，70岁，慢性支气管炎，有长期吸烟史，2周前因感冒导致急性加重，护士对其进行健康指导，正确的是

- A、绝对卧床休息
- B、制订戒烟目标和计划
- C、预防性服用少量抗生素
- D、控制液体摄入量
- E、尽量控制咳嗽

答案：B

48、患儿，2岁，消瘦，哭闹时青紫，平静后青紫消失，查体：胸骨左缘2~3肋间可闻及收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进，并固定分裂。该患儿最可能的诊断是

- A、室间隔缺损
- B、房间隔缺损
- C、动脉导管未闭
- D、法洛四联症
- E、主动脉狭窄

答案：B

49、患者，女性，70岁，突感胸骨后疼痛，窒息濒死感，伴恶心、呕吐及出冷汗，含服硝酸甘油疼痛不缓解。最可能的诊断为

- A、急性胰腺炎
- B、心绞痛
- C、主动脉狭窄
- D、急性心肌梗死
- E、心肌炎

答案：D

50、新生儿，日龄7d，孕30周出生。出生体重1500g，转入NICU监护。今日无明显诱因出现颜面及全身皮肤发绀，SpO₂由95%降至82%，心率96次/分，呼吸不规则，两次呼吸间隙停止时间为22s。护士考虑患儿可能出现的情况是

- A、呼吸暂停
- B、新生儿呼吸窘迫综合征
- C、缺血缺氧性脑病
- D、吸入性肺炎
- E、急性肺炎

答案：B

51、婴儿佝偻病的主要病因是

- A、饮食中缺钙
- B、甲状旁腺激素缺乏
- C、缺乏维生素D
- D、缺乏维生素A
- E、食物中钙、磷比例不当

答案：C

52、新生儿排出胎便的正常时间是

- A、12小时内
- B、18小时内
- C、24小时内
- D、36小时内
- E、48小时内

答案：C

53、新生儿期是指

- A、自出生脐带结扎开始至生后28天内
- B、自受孕至生后脐带结扎
- C、自受孕28周开始至生后28天
- D、自出生脐带结扎开始至生后7天
- E、自出生脐带结扎开始至生后满1个月

答案：A

54、孙先生，40岁，因寒战高热，咳嗽，胸痛，来院急诊，胸透右上肺有云絮状阴影，查痰肺炎球菌(+)，该病人血象如何？

- A、嗜酸性粒细胞增加
- B、淋巴细胞增加
- C、中性粒细胞增加
- D、大单核细胞增加



E、嗜碱性细胞增加

答案：C

55、郑女士，38岁，已确诊糖尿病，昨天下午突然昏睡，送医院经尿化验认为是糖尿病酮症酸中毒，请问尿验应有何显示？

A、尿蛋白（+）

B、尿白细胞增加

C、尿糖（+）

D、尿酮体（+++）

E、尿红细胞增多

答案：D

56、病人腹壁静脉曲张，脐以上的腹壁静脉血流方向由下向上，脐以下亦由下向上。可能性最大的原因是

A、门静脉高压

B、上腔静脉回流受阻

C、下腔静脉回流受阻

D、大量腹水

E、脾肿大

答案：C

57、某病人心前区较饱满。体查：有奇脉，颈静脉怒张，肝颈静脉回流征阳性。应考虑为：

A、先天性心脏病

B、右心功能不全

C、左心功能不全

D、心包积液

E、纵膈肿瘤

答案：D

58、王女士，25岁，因被车撞伤，病人烦躁不安，脉快，收缩压正常、脉压小，面色苍白，出冷汗考虑是：

A、疼痛引起

B、休克早期

C、休克期

D、休克晚期

E、精神紧张引起

答案：B

60、患者，女性，33岁。2个月来出现外阴瘙痒，检查见外阴充血、肿胀，阴道分泌物无异常。评估诱因时，应重点询问

A、饮食习惯

B、卫生习惯

C、睡眠习惯

D、活动习惯

E、教育情况

答案：B

61、一婴儿扶腋下能站立，两手能各握一玩具，能喃喃地发出单音节，能伸手取物。根据这些表现，该婴儿的最可能的月龄为



金英杰医学
JUNYINGJIE.COM

- A、4 个月
- B、5 个月
- C、7 个月
- D、9 个月
- E、10 个月

答案：B

62、患者，女性，66 岁。因颅内压增高，头痛逐渐加重，行腰椎穿刺脑脊液检查。术后突然停止呼吸，血压下降。该患者最可能发生了

- A、小脑幕切迹疝
- B、枕骨大孔疝
- C、脑栓塞
- D、脑干缺血
- E、心肌梗死

答案：B

63、经产妇，4 天前顺产一健康新生儿，该产妇出现下述哪项临床表现时，护士应立即报告医生

- A、口腔温度为 36.5℃
- B、脉率为 109 次 / 分
- C、汗液分泌增多
- D、排尿次数频繁
- E、呼吸为 22 次 / 分

答案：B

64、肺结核的化疗原则不包括

- A、早期
- B、规律
- C、全程
- D、足量
- E、联合

答案：D

65、患者，男性，70 岁。诊断为肝性脑病入院。患者目前处于昏迷状态，下列护理措施错误的是

- A、给予舒适体位
- B、使用床档，防止坠床
- C、口腔护理预防口腔感染
- D、大量利尿
- E、定时翻身，防止压疮

答案：D

66、患者，女性，45 岁，确诊为胃溃疡活动期，其最可能的腹痛特点是

- A、夜间腹痛明显
- B、空腹时腹痛明显
- C、餐后半小时至 1 小时腹痛明显
- D、餐后即刻腹痛明显
- E、进餐时腹痛明显

答案：C



67、患者，男性，35岁，从事园林工作，不慎造成中毒来院就诊，护士应提醒患者在喷洒农药时特别要注意的防护措施是

- A、戴好防护用具
- B、穿长腿裤，戴护目镜
- C、穿长袖上衣
- D、穿质厚的长袖上衣及长裤
- E、戴好口罩手套

答案：D

68、患儿男，5岁，出生后2个月发现心脏杂音，确诊室间隔缺损，近日来，患儿无诱因出现青紫、不喜动、乏力、呼吸急促，考虑该患儿可能出现

- A、艾森门格综合征
- B、法洛四联症
- C、呼吸衰竭
- D、差异性青紫
- E、心力衰竭

答案：A

69、患者，女性，24岁，因重度甲状腺功能亢进入院，准备择期手术治疗，术前准备期间，病人因害怕手术而焦虑不安，该病人目前主要的护理问题是

- A、不舒适
- B、焦虑
- C、自我形象紊乱
- D、有皮肤完整性受损的危险
- E、营养失调：低于机体需要量

答案：B

70、患者，男性，30岁。诊断再生障碍性贫血。血常规显示红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $60g/L$ ，白细胞 $2.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ ，该病人最大的危险是

- A、心力衰竭
- B、失血过多
- C、继发感染
- D、牙龈出血
- E、颅内出血

答案：C

71、患者，男性，50岁。患“幽门管溃疡”2个月，现原有疼痛节律消失，出现餐后上腹部饱胀，频繁呕吐宿食，最可能的并发症为

- A、穿孔
- B、癌变
- C、出血
- D、幽门梗阻
- E、慢性胃肠炎

答案：D

72、一男性，24岁，劳动中突然发生剧烈头痛，呕吐和意识不清。体检：浅昏迷，血压 $120/80mmHg$ ，体温 $37^{\circ}C$ ，颈抵抗、颈胸距4横指，克尼格（Kernig）征阳性。右上眼睑轻度下垂，右眼球外展位，右侧瞳孔 $4mm$ 、光反应迟钝，左侧瞳孔 $2mm$ 、光反应灵敏。左肢体活动差，左侧巴彬斯基征阳性。诊断为蛛网膜下腔出血。

深昏迷区别于浅昏迷的最有价值的特点是

- A、无任何自主运动
- B、全身反射消失
- C、不能被唤醒
- D、大小便失禁
- E、肌肉松弛

答案：B

73、一男性，24岁，劳动中突然发生剧烈头痛，呕吐和意识不清。体检：浅昏迷，血压120/80mmHg，体温37°C，颈抵抗、颈胸距4横指，克尼格（Kernig）征阳性。右上眼睑轻度下垂，右眼球外展位，右侧瞳孔4mm、光反应迟钝，左侧瞳孔2mm、光反应灵敏。左肢体活动差，左侧巴宾斯基征阳性。诊断为蛛网膜下腔出血病人有颈抵抗、颈胸距4横指，表示病人存在

- A、浅反射异常
- B、深反射异常
- C、病理反射
- D、颈项强直
- E、以上都不是

答案：D

74、一男性，24岁，劳动中突然发生剧烈头痛，呕吐和意识不清。体检：浅昏迷，血压120/80mmHg，体温37°C，颈抵抗、颈胸距4横指，克尼格（Kernig）征阳性。右上眼睑轻度下垂，右眼球外展位，右侧瞳孔4mm、光反应迟钝，左侧瞳孔2mm、光反应灵敏。左肢体活动差，左侧巴宾斯基征阳性。诊断为蛛网膜下腔出血克尼格征阳性，表示病人存在

- A、浅反射异常
- B、深反射异常
- C、病理反射
- D、脑膜刺激征
- E、以上都不是

答案：D

75、一男性，24岁，劳动中突然发生剧烈头痛，呕吐和意识不清。体检：浅昏迷，血压120/80mmHg，体温37°C，颈抵抗、颈胸距4横指，克尼格（Kernig）征阳性。右上眼睑轻度下垂，右眼球外展位，右侧瞳孔4mm、光反应迟钝，左侧瞳孔2mm、光反应灵敏。左肢体活动差，左侧巴宾斯基征阳性。诊断为蛛网膜下腔出血双侧瞳孔不等大提示

- A、视神经病
- B、阿托品中毒
- C、昏睡
- D、颅内出血
- E、青光眼

答案：D

76、一男性，24岁，劳动中突然发生剧烈头痛，呕吐和意识不清。体检：浅昏迷，血压120/80mmHg，体温37°C，颈抵抗、颈胸距4横指，克尼格（Kernig）征阳性。右上眼睑轻度下垂，右眼球外展位，右侧瞳孔4mm、光反应迟钝，左侧瞳孔2mm、光反应灵敏。左肢体活动差，左侧巴宾斯基征阳性。诊断为蛛网膜下腔出血巴宾斯基征阳性的表现是

- A、腹壁肌立即收缩
- B、股四头肌收缩，小腿伸展角以内出现抵抗或疼痛

- C、病人仰卧位，一侧髋关节屈成直角，小腿抬高
D、足部拇指背伸，其余四趾呈扇形展开
E、病人俯卧位，下肢自然伸直，托起病人头部前屈时，病人两下肢发生不自主的屈曲

答案：D

77、一位 45 岁已婚妇女，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多，检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑可能诊断为

- A、滴虫性阴道炎
B、霉菌性阴道炎
C、老年性阴道炎
D、宫颈糜烂
E、非特异性阴道炎

答案：B

78、一位 45 岁已婚妇女，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多，检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑为确定诊断，进一步应检查

- A、双合诊
B、尿常规
C、阴道窥器检查
D、阴道分泌物悬滴检查
E、宫颈粘液检查

答案：D

79、一位 45 岁已婚妇女，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多，检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑如镜检有假菌丝，首选药物

- A、广谱抗生素
B、制霉菌素
C、灭滴灵
D、曲古霉素
E、乙烯雌酚

答案：B

80、一位 45 岁已婚妇女，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多，检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑局部用哪种溶液冲洗最好

- A、1%乳酸
B、2% - 4%碳酸氢钠
C、0.2%新洁尔灭
D、1: 5000 高锰酸钾
E、生理盐水

答案：B

81、患者，男性，60 岁，散步时突然头痛、眩晕，伴呕吐、步态不稳。查体：血压 180/105mmHg (24/14kPa)，心率 62 次 / min，双眼向右眼震，右侧指鼻欠稳准，右侧巴氏征阳性。患者最可能患有的疾病是

- A、脑桥出血
B、蛛网膜下腔出血
C、小脑出血
D、大脑中动脉出血
E、脑血栓形成

答案：C

82、患者，男性，60岁，散步时突然头痛、眩晕，伴呕吐、步态不稳。查体：血压180/105mmHg（24/14kPa），心率62次/min，双眼向右眼震，右侧指鼻欠稳准，右侧巴氏征阳性。为明确诊断，应给予的进一步检查是

- A、脑血管造影
- B、脑电图
- C、头颅CT
- D、脑脊液检查
- E、肝功能肾功能检查

答案：C

83、患者，男性，60岁，散步时突然头痛、眩晕，伴呕吐、步态不稳。查体：血压180/105mmHg（24/14kPa），心率62次/min，双眼向右眼震，右侧指鼻欠稳准，右侧巴氏征阳性。处理措施不正确的是

- A、使用利血平降血压
- B、必要时行气管切开，保持气道通畅
- C、20%甘露醇250ml快速静脉滴注，每6~8h一次
- D、立即卧床休息
- E、持续心电监测，密切观察意识状态的变化

答案：A

84、患者，女性，25岁，学生。晨运后感左侧胸闷、胀痛，气促出冷汗。查体：神清，面色苍白，唇发绀，呼吸30次/分，左上肺叩诊呈鼓音，呼吸音消失，心率110次/分，律齐。该患者最可能的诊断是

- A、心绞痛
- B、自发性气胸
- C、肺炎
- D、肋骨骨折
- E、肋间神经痛

答案：B

85、患者，女性，25岁，学生。晨运后感左侧胸闷、胀痛，气促出冷汗。查体：神清，面色苍白，唇发绀，呼吸30次/分，左上肺叩诊呈鼓音，呼吸音消失，心率110次/分，律齐。为明确诊断，最佳辅助检查是

- A、血常规
- B、胸部CT
- C、胸部X线
- D、ECG
- E、血气分析

答案：C

86、患者，女性，60岁，主诉反复上腹疼痛，空腹时疼痛明显，进餐后可缓解，夜间上腹痛明显，排黑便3天，急诊入院。分诊护士判断患者最有可能是发生了

- A、胃溃疡出血
- B、十二指肠溃疡出血
- C、消化道出血
- D、胃炎出血
- E、肝硬化出血

答案：B

87、患者，女性，60岁，主诉反复上腹疼痛，空腹时疼痛明显，进餐后可缓解，夜间上腹痛明显，排黑便3天，急诊入院。分诊护士认为患者的出血量最少为

- A、20ml
- B、60ml
- C、120ml
- D、150ml
- E、250ml

答案：B

88、患者，女性，24岁，患唇痂10天，红肿明显。一天前出血昏迷、高热，眼结膜充血、水肿，眼球突出。患者感染的致病菌可能是

- A、金黄色葡萄球菌
- B、溶血性链球菌
- C、结核杆菌
- D、白色假丝酵母菌
- E、拟杆菌

答案：A

89、患者，女性，24岁，患唇痂10天，红肿明显。一天前出血昏迷、高热，眼结膜充血、水肿，眼球突出。患者唇痂的并发症是

- A、脓毒症
- B、高热昏迷
- C、海绵状静脉窦炎
- D、蛛网膜下腔出血
- E、脑膜炎

答案：C

90、某产妇，妊娠38周，产前合并有轻度妊娠高血压疾病，产后阴道持续出血，胎儿娩出后24小时出血量达550ml时，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是

- A、子宫收缩乏力
- B、胎盘残留
- C、软产道裂伤
- D、凝血功能障碍
- E、胎膜残留

答案：A

91、某产妇，妊娠38周，产前合并有轻度妊娠高血压疾病，产后阴道持续出血，胎儿娩出后24小时出血量达550ml时，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。

该产妇给药首选

- A、麦角新碱
- B、硫酸镁
- C、酚磺乙胺
- D、维生素K
- E、缩宫素

答案：E

92、某产妇，妊娠 38 周，产前合并有轻度妊娠高血压疾病，产后阴道持续出血，胎儿娩出后 24 小时出血量达 550ml 时，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。用药时注意观察的是

- A、体温
- B、脉搏
- C、尿量
- D、膝腱反射
- E、宫底高度

答案：E

93、某产妇，妊娠 38 周，产前合并有轻度妊娠高血压疾病，产后阴道持续出血，胎儿娩出后 24 小时出血量达 550ml 时，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。若产妇次日又出血约 200ml 时，下列措施中不是必须实施的是

- A、按摩子宫
- B、应用宫缩剂
- C、输血
- D、刮宫
- E、应用抗生素

答案：C

94、某产妇，妊娠 38 周，产前合并有轻度妊娠高血压疾病，产后阴道持续出血，胎儿娩出后 24 小时出血量达 550ml 时，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。该产妇最不可能出现的护理问题是

- A、有组织灌注量改变的危险
- B、有感染的危险
- C、有受伤的危险
- D、皮肤完整性受损
- E、疲乏

答案：D

95、患者，女性，40 岁，外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检：心率 120 次/分，血压 70/45mmHg，气管向左偏移，颈部广泛皮下气肿，右侧胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。最可能的诊断是

- A、血气胸
- B、肺挫裂伤
- C、肋骨骨折
- D、张力性气胸
- E、创伤性窒息

答案：D

96、患者，女性，40 岁，外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检：心率 120 次/分，血压 70/45mmHg，气管向左偏移，颈部广泛皮下气肿，右侧胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。此时，首选的治疗措施是

- A、气管切开
- B、剖胸探查
- C、胸腔穿刺抽气减压
- D、补液输血抗休克
- E、镇静止痛

答案：C

97、患者，女性，40岁，外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检：心率120次/分，血压70/45mmHg，气管向左偏移，颈部广泛皮下气肿，右侧胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。若对该病人实施胸腔闭式引流，以排气为主要目的的胸腔引流管安放的位置是

- A、锁骨中线第2肋间
- B、锁骨中线第3肋间
- C、锁骨重点第4肋间
- D、腋中线第5、6肋间
- E、腋中线第7、8肋间

答案：A

98、患儿，8个月，母乳喂养，未加辅食。近1个月来，面色苍白，烦躁易怒，舌面光滑，有轻微震颤，肝与肋下3.6cm。血常规：Hb90g/L,RBC 1.9×10^{12} /L，血清维生素B₁₂降低。该患儿可能的诊断是

- A、营养性巨幼细胞贫血
- B、缺铁性贫血
- C、营养性混合性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、溶血性贫血

答案：A

99、患儿，8个月，母乳喂养，未加辅食。近1个月来，面色苍白，烦躁易怒，舌面光滑，有轻微震颤，肝与肋下3.6cm。血常规：Hb90g/L,RBC 1.9×10^{12} /L，血清维生素B₁₂降低。该患儿最适宜的治疗是给予

- A、输红细胞
- B、铁剂和维生素C
- C、维生素B₁₂和叶酸
- D、补叶酸
- E、补铁剂

答案：C

100、患儿，8个月，母乳喂养，未加辅食。近1个月来，面色苍白，烦躁易怒，舌面光滑，有轻微震颤，肝与肋下3.6cm。血常规：Hb90g/L,RBC 1.9×10^{12} /L，血清维生素B₁₂降低。护士向患儿家长介绍预防本病的重点是

- A、按时补充维生素D和补钙
- B、多晒太阳
- C、按时添加辅食
- D、纠正不良饮食习惯
- E、注意休息

答案：C