

2021 中 西 医 助 理 医 师 考 试

# 模拟密押卷

**2021 年**  
**中 西 医 助 理 医 师**  
**资 格 考 试 专 用**

## 第一单元

### 一、A1 型选择题 (1~94 题)

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1、证候的概念是

- A. 疾病发展某一阶段的病理概括
- B. 是对疾病症状与体征的鉴别概括
- C. 是对疾病症状与体征的分析概括
- D. 对疾病表现症状的综合概括
- E. 对阴阳气血失调临床表现的概括

2、具有“藏而不泻”特点的是

- A. 五脏
- B. 六腑
- C. 奇恒之腑
- D. 五官
- E. 五体

3、与精神意识思维活动关系最密切的是

- A. 心主血脉功能
- B. 肝主疏泄的功能
- C. 肺主治节的功能
- D. 脾主运化的功能
- E. 肾主藏精的功能

4、具有“喜燥恶湿”特性的脏腑是

- A. 肝
- B. 脾

- C. 胃
- D. 肾
- E. 肺

5、属肝之志的是

- A. 忧
- B. 怒
- C. 恐
- D. 喜
- E. 思

6、“水火既济”的“水火”所指的脏是

- A. 心脾
- B. 肝肺
- C. 脾肾
- D. 心肾
- E. 肝肾

7、与气虚关系最密切的脏腑是

- A. 心、肺
- B. 肺、脾
- C. 肺、肾
- D. 脾、胃
- E. 肝、肺

8、目的视觉功能主要取决于

- A. 肾中精气的充盈
- B. 肝血的充足
- C. 脾气的健运
- D. 肾阳的蒸化
- E. 肾阴的滋养

9、充养脑髓、滑利骨节的主要是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

10、具有司眼睑开合，“分主一身左右之阴阳”功能的是

- A. 冲脉
- B. 督脉
- C. 阴、阳跷脉
- D. 阴、阳维脉
- E. 任脉

12、致病后可出现各种秽浊症状或可阻遏气机的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 火、热邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

13、患者胃肠热盛，大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，神昏谵语，但又兼见面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿。其病机是

- A. 虚中夹实
- B. 真实假虚
- C. 由实转虚
- D. 真虚假实
- E. 实中夹虚

14、以热治热的治法适用于

- A. 瘀血所致崩漏者
- B. 阴寒内盛，格阳于外而见热象者
- C. 里热盛极，阳盛格阴而见寒象者
- D. 因脾虚而致痞满且大便不畅者
- E. 因实热壅积而致大便不通者

15、失神与少神的共同表现是

- A. 言语失伦
- B. 表情淡漠
- C. 倦怠乏力
- D. 面色晦暗少华
- E. 以上都不是

16、心、脾二经有热可致

- A. 强硬舌
- B. 颤动舌
- C. 痿软舌
- D. 吐弄舌
- E. 歪斜舌

17、可提示疾病发展转折点的是

- A. 自汗
- B. 盗汗
- C. 绝汗
- D. 冷汗
- E. 战汗

18、腹胀满，无压痛，叩之作空声，可见于

- A. 水臌
- B. 气胀
- C. 痰饮
- D. 积聚

E. 内痛

19、暑淫证候的表现是

A. 头昏沉，嗜睡，胸脘痞闷 B.

口渴饮水，口唇鼻咽干燥 C.

发热恶热，汗出，气短神疲D.

突发皮肤瘙痒、丘疹

E. 肠鸣腹泻，脘腹拘急冷痛

20、以下哪项临床症状血虚证与血瘀证均可见

A. 心悸

B. 脉涩

C. 手麻

D. 腹痛

E. 闭经

21、产后大出血，继则冷汗淋漓，面色苍白，甚则晕厥。其病机是

A. 气血两虚

B. 气血失和

C. 气不摄血

D. 气随血脱

E. 气滞血瘀

22、少阳病本证的临床表现是

A、口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食

B、呕吐不止，剑突下急迫感，烦躁

C、胸烦满，烦惊谵语，小便不利，一身尽重，难以转侧

D、腹满而吐，食不下，大便泄泻，口不渴，时腹自痛，四肢欠温

E、恶寒，发热，头痛，便溏，脉浮

23、气陷证的临床表现是

A、畏寒肢冷

B、动则汗出

C、少气懒言

D、脘腹坠胀

E、舌淡苔白

24、下列各项，是正常舌象表现的是

A、舌质红

B、舌体瘦薄

C、舌体淡嫩少苔

D、舌苔薄白

E、舌体短缩

25、治疗瘰疬、癭瘤等证的药物具有的药味是

A、苦

B、甘

C、咸

D、涩

E、淡

26、下列药物中能燥湿止带的是

A. 防风

B. 白芷

C. 羌活

D. 苍耳子

E. 藁本

27、善于疏散半表半里之邪而有和解退热之功的药物是

A、菊花

B、柴胡

C、升麻

D、桑叶

E、蝉蜕

28、白花蛇蛇草的功效是

A. 祛风，解表，止痛

B. 祛风，通络，利尿

C. 祛风，活络，定惊

D. 祛风湿，强筋骨 E.

祛风湿，治骨鲛

29、治疗热淋涩痛，应选用

A. 大黄

B. 芦荟

C. 番泻叶

D. 甘遂

E. 大戟

30、既能祛风湿，又能消骨鲛的药物

是

A. 威灵仙

B. 防己

C. 狗脊

D. 独活

E. 木瓜

31、利水渗湿作用较强，治疗水湿停

滯所致小便不利、水肿、泄泻、带下，

宜首选

A. 石韦

B. 滑石

C. 萆薢

D. 木通

E. 猪苓

32、上入肺、中走脾、下达肾与膀胱

的药是

A. 木香

B. 陈皮

C. 香附

D. 乌药

E. 青皮

33、具有行气调中止痛功效的药物是

A. 柿蒂

B. 木香

C. 香附

D. 乌药

E. 薤白

34、既能杀虫，又能润肺止咳的药物

是

A. 贯众

B. 槟榔

C. 花椒

D. 雷丸

E. 榧子

35、上能敛肺气，下能滋肾阴的药物

是

A. 诃子

B. 五味子

C. 乌梅

D. 五倍子

E. 覆盆子

36、“以补为固”补而兼疏的方剂是

- A. 牡蛎散
- B. 固冲汤
- C. 健脾丸
- D. 玉屏风散
- E. 真人养脏汤

37、小青龙汤的组成药物中含有

- A. 黄连
- B. 杏仁
- C. 细辛
- D. 熟地黄
- E. 石膏

38、大黄附子汤主治的是

- A. 食积便秘
- B. 血虚便秘
- C. 气虚便秘
- D. 脾约便秘
- E. 冷积便秘

39、逍遥散中配伍薄荷的用意是

- A. 疏肝解郁
- B. 散肝透邪
- C. 疏郁透邪
- D. 疏肝散热
- E. 清利头目

40、青蒿鳖甲汤中有先入后出之妙的药对是

- A. 知母、青蒿
- B. 青蒿、鳖甲
- C. 知母、丹皮

D. 生地、知母

E. 青蒿、生地

41、左金丸中黄连与吴茱萸的用量比例为

- A. 1:1
- B. 2:1
- C. 6:1
- D. 3:1
- E. 4:1

42、属于固涩剂适应范围的病证是

- A. 血热崩漏
- B. 肺虚久咳
- C. 火动遗精
- D. 伤食泄泻
- E. 热病多汗

43、酸枣仁汤中养肝血，安心神的药物是

- A. 知母
- B. 川芎
- C. 茯苓
- D. 甘草
- E. 酸枣仁

44、越鞠丸中以行气为主的药物是

- A. 木香
- B. 沉香
- C. 香附
- D. 枳壳
- E. 厚朴

45、支气管哮喘可出现的呼吸困难是

- A. 混合性呼吸困难
- B. 心源性呼吸困难
- C. 吸气性呼吸困难
- D. 呼气性呼吸困难
- E. 中毒性呼吸困难

46、慢性进行性头痛伴呕吐、视神经盘水肿提示

- A. 脑血栓形成
- B. 颅骨骨折 C. 偏头痛
- D. 颅内占位性病变
- E. 三叉神经痛

47、按压形成后的皮肤凹陷在按压结束后很快恢复见于

- A. 心源性水肿
- B. 肾源性水肿
- C. 肝源性水肿
- D. 营养不良性水肿
- E. 内分泌源性水肿

48、下列除哪项外均属于现病史的内容

- A. 起病情况
- B. 主要症状及伴随症状
- C. 诊疗经过
- D. 病程中的一般情况
- E. 家族成员患同样疾病的情况

49、适用于大量腹水而肝、脾难以触及的触诊方法是

- A. 浅部触诊法

- B. 深部滑行触诊法
- C. 双手触诊法
- D. 深压触诊法
- E. 冲击触诊法

50、落日征可见于

- A. 小头畸形
- B. 维生素 D 缺乏佝偻病
- C. 脑膜炎
- D. 脑积水 E.

颅内出血

51、蛛网膜下隙出血的特征是

- A. 昏迷
- B. 脑膜刺激征阴性
- C. 血性脑脊液
- D. “三偏”征
- E. 失语

52、诊断心绞痛最常用的方法是

- A. 超声检查
- B. 心电图
- C. 血清淀粉酶检查
- D. 冠状动脉造影 E.

放射性核素检查

53、肺炎球菌肺炎的痰液特征是

- A. 粉红色泡沫样痰
- B. 鲜红色痰
- C. 棕褐色痰
- D. 铁锈色痰
- E. 灰黄色痰

54、下列关于血尿素氮的改变及临床意义的叙述。正确的是

- A. 上消化道出血时，血尿素氮减少
- B. 大面积烧伤时，血尿素氮减少
- C. 严重的肾盂肾炎，血尿素氮减少
- D. 血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性差
- E. 血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性强

55、下列哪个部位是手阳明大肠经和足阳明胃经的交接处

- A. 眶下孔凹陷处
- B. 下眼眶缘
- C. 鼻翼旁
- D. 颧骨旁
- E. 口角旁

56、在八脉交会穴中，通督脉的是

- A. 足临泣
- B. 公孙
- C. 后溪
- D. 照海
- E. 列缺

57、骨度分寸规定，髌枢至膝中的距离是

- A. 13 寸
- B. 14 寸
- C. 16 寸
- D. 18 寸
- E. 19 寸

58、手三里穴位于阳溪穴与曲池穴连线上，曲池穴下

- A. 5 寸
- B. 4 寸
- C. 3 寸
- D. 2 寸
- E. 1 寸

59、在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉是

- A. 足少阴肾经
- B. 足阳明胃经
- C. 手太阴肺经
- D. 足太阴脾经
- E. 手厥阴心包经

60、下列哪项不属足太阴经的主治范围

- A. 妇科病
- B. 口舌病
- C. 前阴病
- D. 肾脏病
- E. 脾胃病

61、阴郄穴位于尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕掌侧远端横纹上

- A. 0.5 寸
- B. 1 寸
- C. 1.5 寸
- D. 2 寸
- E. 2.5 寸

62、下列穴位中有纠正胎位作用的是



- A. 隐白
- B. 中渚
- C. 至阴
- D. 涌泉
- E. 合谷

63、下列腧穴中，治疗汗证首选的是

- A、复溜
- B、然谷
- C、太溪
- D、阴谷
- E、大钟

64、在肘前区，肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中的腧穴是

- A、少海
- B、小海
- C、曲泽
- D、曲池
- E、尺泽

65、以下关于选择性叙述错误的是

- A、选择性是药物分类和临床选药的依据
- B、选择性低的药物作用范围广
- C、选择性低的药物不良反应多见
- D、剂量增大，选择性提高
- E、药物作用的选择性是相对的

66、治疗有机磷农药中毒毒蕈碱样症状的药物是

- A、阿托品
- B、氯磷定

- C、利多卡因
- D、甲硝唑(灭滴灵)
- E、双复磷

67、阿托品禁用于

- A. 膀胱刺激征
- B. 中毒性休克
- C. 青光眼
- D. 房室传导阻滞
- E. 麻醉前给药

68、关于 $\beta$ 受体阻滞药的禁忌证，错误的是

- A、严重心功能不全
- B、支气管哮喘
- C、高血压
- D、重度房室传导阻滞
- E、窦性心动过缓

69、关于丙戊酸钠，下列叙述哪项不正确

- A. 为广谱抗癫痫药
- B. 其抗癫痫作用与 GABA 有关
- C. 对小发作优于乙琥胺，为治疗小发作的首选药物
- D. 对大发作疗效不及苯妥英钠
- E. 对精神运动性发作疗效近似卡马西平

70、下列哪种原因所致的呕吐，用氯丙嗪治疗无效

- A. 尿毒症
- B. 癌症

C. 放射病 D.

药物中毒E.

晕动病

71、镇痛效力为吗啡的 100 倍的是

A. 哌替啶

B. 喷他佐辛

C. 美沙酮 D.

芬太尼 E.

可待因

72、H<sub>2</sub>受体阻滞药物的应用是

A、晕动病呕吐

B、胃十二指肠溃疡

C、皮肤瘙痒和水肿

D、支气管哮喘

E、过敏性鼻炎

73、痛风患者应慎用的药物是

A. 甘露醇

B. 丙磺舒 C.

氯沙坦 D.

卡托普利E.

氢氯噻嗪

74、普萘洛尔抗心律失常的主要作用是

A. 治疗量的膜稳定作用

B. 扩张血管，减轻心脏负荷

C. 消除精神紧张

D. 加快心率和传导

E. 阻断心脏的β受体，降低自律性，减慢心率

75、病原体进入人体后，是否引起疾病，主要取决于

A. 病原体的数量

B. 病原体的毒力

C. 病原体的致病能力和抗体的免疫功能

D. 病原体的侵袭力

E. 机体的抵抗能力

76、转为慢性肝炎比例最高的是

A. 甲型肝炎病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 丙型肝炎病毒

D. 丁型肝炎病毒

E. 戊型肝炎病毒

77、高热、头痛、呕吐，全身皮肤散在瘀点，颈项强直，最可能的诊断是

A. 结核性脑膜炎

B. 流行性脑脊髓膜炎

C. 流行性乙型脑炎 D.

伤寒

E. 中毒性细菌性痢疾

78、下列有关消毒的叙述，错误的是A、是切断传播途径，防止传染发生的重要措施

B、可保护医护人员免受感染

C、可防止患者再被其他病原体感染

D、即使有了强有力的消毒措施，医护人员也必须采取防护措施

E、对不同的传染病消毒效果相似

79、关于乙脑的表现说法错误的是

- A、起病急骤
- B、头痛是最早出现的症状
- C、神志不清可于病程第 2 天出现
- D、呼吸衰竭以中枢性为主
- E、病程 2 周后才出现肢体瘫痪

80、在感染过程中，最常见的表现形式是

- A、病原体被消灭或排出体外
- B、隐性感染
- C、显性感染
- D、病原携带状态
- E、潜伏性感染

81、下列关于布鲁菌病临床特征的描述，正确的是

- A、发热并伴有寒战
- B、血压升高
- C、关节、肌肉疼痛
- D、乏力，多汗，多疲劳不堪
- E、眼结膜水肿

82、下列有关标准预防的叙述，错误的是

- A、要防止血源性及非血源性疾病的传播
- B、强调双向防护
- C、所有的患者均被视为具有潜在感染者
- D、要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施

E、脱去手套后可以不洗手

83、AIDS 患者肺部继发感染的常见病原体是

- A、肺炎球菌
- B、葡萄球菌
- C、链球菌
- D、军团菌
- E、肺孢子菌

84、下列各项，可致人群对某种传染病易感性增高的是

- A、该传染病流行过后
- B、人群中一般抵抗力的提高
- C、人群中自动免疫的推广
- D、病原体的变异
- E、抗生素的广泛应用

85、我国卫生法基本原则不包括的内容是

- A. 保护公民身体健康
- B. 患者有权自主选择医疗机构
- C. 预防为主
- D. 兼顾经济与社会效益
- E. 卫生工作社会化

86、医师甲经执业医师注册，在某医疗机构执业。1 年后，该医师受聘到另一医疗机构执业。其改变执业地点的行为

- A. 医疗机构允许即可
- B. 应到准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续

C. 无须经过准予注册的卫生行政部门  
办理变更注册手续

D. 任何组织和个人无权干涉

E. 只要其医术高明，就不受限制

87、除特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不得超过多少日的常用量

A. 1 日

B. 3 日

C. 5 日

D. 7 日

E. 14 日

88、国家实行预防接种证制度的对象是

A、儿童

B、在校学生

C、未成年人

D、成年人

E、全体社会公民

89、突发公共卫生事件严重危害

A、公众权益

B、社会公众利益

C、经济秩序

D、社会秩序

E、社会公众健康

90、正确处理医务人员之间关系的道德原则，不包括

A、互相尊重

B、互相支持

C、互相爱护

D、互相监督

E、互相学习

二、A2 型选择题（95~122 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

91、患者，男，40 岁。素有高血压病史，现症见眩晕耳鸣，面红头胀，腰膝酸软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉弦细。其病机是 A. 阴虚内热

B. 阴损及阳

C. 阴虚阳亢

D. 阳损及阴

E. 阴虚火旺

92、患者，男，45 岁。心烦不寐，眩晕耳鸣，健忘，腰酸梦遗，舌红少津，脉细数。其病变所在脏腑是

A. 心、脾

B. 肺、肾

C. 肺、肝

D. 心、肾

E. 肝、胃

93、患者，女，37 岁，恶寒发热，头身疼痛，无汗。鼻塞流涕，脉浮紧。

其舌苔应是

- A. 白厚
- B. 薄白
- C. 黄腻
- D. 花剥
- E. 白腻

94、患者，男，56岁，头痛且空，每兼眩晕，腰痛酸软，神疲乏力，遗精带下，耳鸣失眠，舌红少苔，脉细无力，此属何种头痛

- A. 肝阳头痛
- B. 肾虚头痛
- C. 气血亏虚头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 痰浊头痛

95、患儿，男，4岁。因发热，腹泻来诊。脉浮，大小不齐，应考虑为

- A. 痰食
- B. 风痰
- C. 寒湿
- D. 积滞
- E. 风热

96、患者男性，46岁。高血压病史10年。现面红头胀，眩晕耳鸣，腰膝痠软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉细弦。其病机是

- A. 阴虚阳亢
- B. 阴虚内热
- C. 阴虚火旺
- D. 阴损及阳

E. 阳损及阴

97、患者，女，18岁，外感风寒，恶寒发热，无汗，腹痛，吐泻，舌苔白腻。治疗宜选用

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 香薷
- D. 防风
- E. 白芷

98、患者，女，30岁，小便短数，灼热刺痛，尿色黄赤，舌苔黄腻，脉数。治疗应选用

- A. 大蓟
- B. 地榆
- C. 槐花
- D. 白茅根
- E. 侧柏叶

99、患者，女，38岁。头痛连及项背，遇风则痛甚，恶风寒喜裹头戴帽，口不渴，苔薄白，脉浮。用药应首选的是

- A. 发散风寒药
- B. 发散风热药
- C. 活血化瘀药
- D. 理气药
- E. 祛风湿药

100、患者，男，42岁。全头胀痛，急躁易怒，口苦胁痛，面红目赤，便秘

溲赤，舌边尖红，苔黄，脉弦数。用药应首选的是

- A、全蝎、蜈蚣
- B、磁石、牡蛎
- C、龙胆、栀子
- D、天麻、石决明
- E、川芎、川牛膝

101、患儿，男，12岁。患流行性出血热，经治疗基本恢复，但仍低热未退，夜热早凉，热退无汗，形体消瘦，舌红少苔，脉细数。用药应首选的药物是

- A、地骨皮
- B、赤芍
- C、牡丹皮
- D、黄柏
- E、生地黄

102、患者，女，42岁，身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 凉膈散
- C. 生脉散
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清暑益气汤

103、患者恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸

- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

104、患者，女，58岁。绝经数年，忽又来潮，量多、色淡，肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚。治疗应选用

- A. 归脾汤
- B. 四物汤
- C. 当归补血汤
- D. 温经汤
- E. 黄土汤

105、某男，67岁，喘促日久，现咳嗽痰多，气急胸闷，苔腻，脉滑，治疗应选用

- A. 越婢加半夏汤
- B. 苏子降气汤
- C. 涤痰汤
- D. 平喘固本汤
- E. 真武汤合五苓散

106、患者，女，36岁。漏下不止，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 四物汤
- C. 黄土汤
- D. 胶艾汤
- E. 小蓟饮子

107、患者，女，37岁，眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 镇肝息风汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 半夏白术天麻汤

108、患者，女，28岁，咳嗽痰黄，胸闷痞满，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

109、患者呼吸急促，查体：气管向左偏移。右侧胸廓饱满，叩诊出现实音。应首先考虑的是

- A. 右侧胸腔积液
- B. 右侧气胸
- C. 肺气肿
- D. 右侧大叶性肺炎
- E. 右侧肺不张

110、患者，女，20岁。突然发作上腹痛，按压后疼痛程度减轻。应首先考虑的是

- A. 胃溃疡
- B. 胃痉挛

- C. 胃炎
- D. 急性胃扩张
- E. 胃穿孔

111、患者，女，32岁。饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐，呕后腹痛反而加重，服解痉剂无效。检查：体温39℃。心率120次/分，腹部紧张，有压痛、反跳痛，血清淀粉酶400U，血钙

1.63mmol/L。应首先考虑的是

- A. 急性心肌梗死
- B. 溃疡病穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性肠梗阻

112、患者，男，45岁。自觉心慌，时息时作，健忘失眠。治疗应首选

- A. 三阴交
- B. 神门
- C. 足三里
- D. 太溪
- E. 合谷

113、患者，老年男性。无明显诱因突然昏仆，不省人事，半身不遂，目合口张，鼻鼾息微，遗尿，汗出，四肢厥冷，脉细弱。治疗应首选

- A. 背俞穴，灸法
- B. 足阳明经穴，灸法
- C. 足厥阴经穴，针刺用泻法
- D. 任脉经穴，灸法

E. 督脉经穴，灸法

114、某男，因恼怒后两胁胀痛，胸闷不舒，呕恶不欲食，口苦，舌红，脉弦滑。针灸取穴为

A. 期门、阳陵泉、太冲、足三里

B. 支沟、阳陵泉、期门、丘墟 C.

期门、阳陵泉、膈俞、三阴交D.

肝俞、肾俞、期门、三阴交

E. 大包、阳陵泉、三阴交、足三里

116、男，45岁。双眼睑下垂6~7天，渐加重，近一两天四肢或活动无力，晨起轻，下午重，休息后减轻，活动后加重。诊断：重症肌无力。对该病人最好用哪种药物治疗

A. 毛果芸香碱

B. 毒扁豆碱 C.

新斯的明 D.

阿托品

E. 加兰他敏

117、关于阿托品常见的不良反应，错误的是

A、皮肤苍白、体温升高

B、便秘

C、口干

D、视力模糊

E、心悸、眩晕

118、患儿，3岁，尚热、头痛、呕吐，全身皮肤散在瘀点，脑膜刺激征阳性，烦躁不安。实验室检查：血白细胞升高，

脑脊液呈化脓性改变。最可能的诊断是

A. 结核性脑膜炎

B. 流行性脑脊髓膜炎

C. 流行性乙型脑炎 D.

伤寒

E. 中毒性细菌性痢疾

119、5岁女童，因发热头痛3天，昏迷半天，于2013年9月3日入院。体查：体温40℃，浅昏迷，颈软，双侧瞳孔缩小，有时不等大，膝反射活跃，巴氏征阳性，血象WBC 15.0×10<sup>9</sup>/L，N 0.75，L 0.25，脑脊液无色透明，WBC 120×10<sup>9</sup>/L，N 0.80，L 0.20，糖2.5mmol/L，氯化物119mmol/L，蛋白定量0.5g/L，可能的诊断为

A、流行性脑脊髓膜炎

B、结核性脑膜炎

C、化脓性脑膜炎

D、流行性乙型脑炎

E、脑型疟疾

120、女，32岁，2天前入院被确诊为肾病综合征出血热，现热退但症状加重，出血点增加，四肢厥冷，脉搏细弱，BP70/50mmHg，现最佳治疗原则是

A、以补充血容量为主

B、以应用血管活性药物为主

C、以应用激素为主

D、以纠正酸中毒为主



E、以输入胶体液为主

### 三、B1 型选择题（123~150 题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A、环境因素
- B、气候因素
- C、正气不足
- D、地域因素
- E、邪气侵害

121、疾病发生的重要条件是

122、疾病发生的内在根据是

- A、劳力过度
- B、劳神过度
- C、房劳过度
- D、过度饥饿
- E、饮食超量

123、可损伤心脾的因素是

124、可损伤肾精的因素是

- A、正治
- B、从治
- C、标本兼治
- D、反治
- E、治标

125、对大出血患者应采用的治疗原则是

126、高热患者应采用的治疗原则是

- A、大汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，神情淡漠，呼吸微弱，脉微欲绝
- B、形体消瘦，五心烦热，颧红盗汗，口燥咽干，皮肤干燥，脉象细数
- C、身热大汗，汗热质黏，面色潮红，躁扰不安，渴喜冷饮，脉细数疾
- D、高热肢厥，神识昏沉，胸腹灼热，口渴喜饮，面色紫暗，脉沉有力
- E、经常畏冷，四肢不温，渴喜热饮，常自汗出，尿清便溏，脉迟无力

127、真热假寒证的临床表现是

128、亡阳证的临床表现是

- A、身热不扬
- B、日晡潮热
- C、五心烦热
- D、身热汗出
- E、往来寒热

129、少阳病证发热的临床表现是

130、阳明病实证发热的临床表现是

- A、大黄配枳实
- B、枳实配芒硝
- C、大黄配附子
- D、附子配枳实
- E、大黄配芒硝

131、用于实热积滞，大便秘结的药对是

132、用于寒实积滞，便秘腹痛的药对是

- A、豨莶草
- B、防己
- C、威灵仙
- D、桑寄生
- E、蕲蛇

133、具有祛风湿、强筋骨功效的药物是

134、具有祛风湿、利水功效的药物是

- A、定喘汤
- B、止嗽散
- C、小青龙汤
- D、苓桂术甘汤
- E、苓甘五味姜辛汤

135、以温肺化饮为主要功用的方剂是

136、既散寒解表又温肺化饮的方剂是

- A、散寒解表，化湿和中
- B、解表散寒，理气和中
- C、祛暑解表，化湿和中
- D、祛湿化浊，理气宽中
- E、清暑益气，养阴生津

137、香薷散的功用是

138、清暑益气汤的功用是

- A. 瘧病
- B. 破伤风
- C. 脑血管疾病
- D. 中毒性痢疾
- E. 脑膜炎

139、抽搐伴高血压，肢体瘫痪，见于

140、抽搐伴苦笑面容，见于

- A、太溪、肾俞
- B、阴陵泉、外关
- C、太冲、血海
- D、气海、脾俞
- E、关元、归来

141、针灸治疗气血虚弱痛经，宜加用

142、针灸治疗肾气亏损痛经，宜加用

- A、氨茶碱
- B、沙丁胺醇
- C、哌仑西平
- D、色甘酸钠
- E、二丙酸倍氯米松

143、抢救哮喘持续状态宜选用

144、伴有心脏功能不全的哮喘急性发作患者，宜选用

- A、异烟肼
- B、链霉素
- C、阿米卡星
- D、利福平
- E、庆大霉素

145、对结核杆菌和麻风杆菌作用强的药物是

146、对结核杆菌有高度选择性的药物是

A、医患双方不是双向作用，而是医生对患者单向发生作用

B、医患双方在医疗活动中都是主动的，

医生有权威性，充当指导者

C、医生和患者具有近似同等的权利

D、长期慢性病患者已具有一定医学知识水平

E、急性病患者或虽病情较重但他们头脑是清醒的

147、指导-合作型的特点是

148、主动-被动型的特点是

A、在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施

B、互相尊重，维护自身权益，应当遵守有关法律、法规的规定

C、对其医务人员进行医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范、常规的培训，并加强职业道德教育

D、遵守医疗秩序和医疗机构有关就诊、治疗、检查的规定，如实提供与病情有关的信息，配合医务人员开展诊疗活动

E、改善医疗服务，提高医疗质量

149、预防医疗纠纷，医疗机构应当

150、预防医疗纠纷，医务人员应当

1. 急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

A. 普通感冒

B. 急性咽结膜炎 C.

急性病毒性咽炎D.

急性支气管炎

E. 急性咽-扁桃体炎

2. 左心衰竭出现的最早的症状是

A. 呼吸困难

B. 心律增快

C. 嗜睡

D. 紫绀

E. 少尿

3. 风湿性心脏瓣膜病中，最容易并发脑栓塞的是

A. 二尖瓣关闭不全

B. 主动脉瓣狭窄

C. 主动脉瓣关闭不全

D. 三尖瓣狭窄

E. 二尖瓣狭窄伴心房颤动

4. 中医学认为引起高血压病的病机关键是

A. 肝肾阴阳失调

B. 肝脾疏泄失调

C. 肺肾吐纳失调

D. 心肾交济失调

E. 心肺相辅失调

5. 胃溃疡最主要的症状是

A. 嗝气，反酸

B. 恶心，呕吐

C. 呕吐，黑便

D. 上腹疼痛 E.

食欲减退

6. 下列各项中，不符合淤胆型肝炎临床表现的是

A. 黄疸深

B. 自觉症状重

C. 皮肤瘙痒

D. 大便颜色变浅

## 第二单元

一、A<sub>1</sub>型选择题（1～45题）

答题说明：每一道考试题下面有

A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

E. 血清胆固醇升高

7. 尿路感染的主要病机是

- A. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利
- B. 湿热蕴结中焦，膀胱气化失司
- C. 湿热蕴结肝胆，肝胆疏泄失常
- D. 肾气亏虚，肾失蒸化开合
- E. 肾阴亏虚，湿热蕴结

8. 有助于再障与急性白血病鉴别的是

- A. 感染发热
- B. 皮肤黏膜出血
- C. 贫血苍白
- D. 胸骨压痛
- E. 网织红细胞减少

9. 下列哪一项不属于过敏性紫癜的好发部位

- A. 下肢
- B. 臀部
- C. 上肢
- D. 躯干
- E. 面部

10. 治疗甲亢危象应首选

- A. 普萘洛尔
- B. 氢化可的松
- C. 控制感染 D. 碘化钠
- E. 抗甲状腺药物增量

11. 平胃散合桃红四物汤适用于治疗糖尿病的证型是

- A. 痰瘀互结
- B. 气阴两虚
- C. 阴虚燥热
- D. 阴阳两虚
- E. 脉络瘀阻

12. 甲亢的水肿特点是

- A. 胫前黏液性水肿
- B. 胫后黏液性水肿
- C. 下垂性水肿
- D. 向心性水肿

E. 离心性水肿

13. 类风湿关节炎的基本病理改变是

- A. 皮炎
- B. 滑膜炎
- C. 心包炎
- D. 血管炎
- E. 心肌炎

14. 下列是继发性高尿酸血症或痛风鉴别要点的是

- A. 儿童、青少年、女性和老年人更少见
- B. 高尿酸血症程度较轻
- C. 0%患者 24 小时的尿酸排出量减少
- D. 痛风性关节炎症状往往较轻或不典型
- E. 无明确的相关用药史

15. 导致血脂异常发病的关键因素是

- A. HDL-C 升高
- B. HDL-C 降低
- C. TG 升高
- D. LDL-C 升高
- E. LDL-C 降低

16. 中医泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块为

- A. 结核
- B. 瘤
- C. 瘰
- D. 疽
- E. 岩

17. 下列哪项不属于麻醉前用药的目的

- A. 解除病人精神紧张
- B. 使麻醉过程平稳 C. 增强麻醉效果
- D. 促进肌肉松弛 E. 减轻病人疼痛感

18. 下列哪项不属于输血适应证

- A. 凝血机制异常和出血性疾病

- B. 重症感染
- C. 黄疸
- D. 器官移植 E.
- 低蛋白血症

19. 因脾虚感染疔病的中医治法是

- A. 清热利湿解毒
- B. 托毒生肌
- C. 补益气血
- D. 祛风清热
- E. 健脾和胃，清化湿热

20. 下列哪项不属于脑挫裂伤的诊断要点

- A. 脑脊液呈血性改变
- B. 伤后昏迷在半小时以内
- C. CT 检查显示脑挫伤区有点片状高密度或高低混杂密度影像
- D. 头部外伤史
- E. 出现局灶症状与体征

21. 单发的乳腺肿块，且无疼痛，腋窝淋巴结不大，无周期性改变，可诊断为

- A. 乳腺导管扩张症
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

22. 下列哪项不属于急性穿孔的诊断要点

- A. 有溃疡病史，且近期有溃疡病活动症状
- B. 突然发生的持续性上腹部剧烈疼痛，迅速发展到全腹
- C. 检查时有明显的腹膜刺激征，并多有肝浊音界缩小或消失
- D. X 线检查发现膈下有游离气体
- E. 墨菲氏征阳性

23. 我国原发性肝癌最常见的病因是

- A. 长期饮酒
- B. 肝炎

- C. 肝硬化
- D. 肝血管瘤
- E. 肝吸虫

24. 下列哪项不是肿瘤的转移途径

- A. 血道转移
- B. 远位转移 C.
- 接种转移 D.
- 淋巴道转移 E.
- 直接蔓延

25. 恶性程度最高的甲状腺癌是

- A. 鳞状上皮癌
- B. 滤泡状腺癌
- C. 髓样癌
- D. 未分化癌 E.
- 乳头状腺癌

26. 下列关于女性骨盆的叙述，错误的是

- A. 骨盆入口呈横椭圆形
- B. 入口横径长于前后径
- C. 耻骨弓较宽
- D. 坐骨棘间径小于 10cm
- E. 骶骨切迹呈圆形

27. 子宫内膜从增殖期变成分泌期，其最直接的原因是

- A. 促性腺激素释放激素的作用
- B. 促性腺激素的作用
- C. 雌激素的作用
- D. 孕激素的作用
- E. HCG 的作用

28. 女子婚后同居 1 年，未避孕而从未受孕，应诊断为

- A. 断 绪
- B. 断 产
- C. 五不女
- D. 全不产
- E. 暗产

29. 下列各项，属产褥感染的是

- A. 产褥期所发生的感染

- B. 分娩后生殖道的感染
- C. 分娩及产褥期生殖道感染
- D. 分娩后体温升高，达到或超过 38°C
- E. 产后所发生的一切感染

30. 妇科疾病的发生，主要涉及的脏腑是

- A. 肾、肝、脾
- B. 脾、肺、肾
- C. 心、肺、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 肺、脾、心

31. 下列各项，属确诊宫颈癌最可靠的方法是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 阴道镜检查
- C. 宫颈锥切术
- D. 宫颈活组织检查
- E. 碘试验检查

32. 下列关于女性生殖系统炎症的叙述，错误的是

- A. 滴虫阴道炎患者其性配偶也应检查
- B. 生殖器炎症常为需氧菌及厌氧菌混合感染
- C. 衣原体支原体所致生殖器炎症属性传播疾病
- D. 滴虫阴道炎治疗一疗程后复查阴性即为治愈
- E. 外阴阴道念珠菌病久治不愈，应查血糖

33. 下列各项，不属妊娠剧吐临床表现的是

- A. 择食、食欲不振
- B. 恶心呕吐频繁
- C. 呕吐物中有胆汁或咖啡渣样物
- D. 脉搏增快
- E. 体温升高

34. 下列各项，不属热伤冲任所致病证的是

- A. 月经先期

- B. 月经过多
- C. 月经过少
- D. 崩漏
- E. 经行吐衄

35. 下列关于新产后和哺乳期的生理特点的叙述，错误的是

- A. 有恶露的排出，1 月左右干净
- B. 体温在产后 24 小时内略升高
- C. 产褥早期，产妇血液处于高凝状态
- D. 12 小时可开始哺乳
- E. 生理性闭经

36. 小儿开始更换恒牙的年龄是

- A. 2~3 岁
- B. 4~5 岁
- C. 6~7 岁
- D. 8~9 岁
- E. 10 岁以后

37. 卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的疾病是

- A. 心理性疾病
- B. 急性传染病
- C. 营养性疾病
- D. 结缔组织病
- E. 肠寄生虫病

38. 符合幼儿期特点的是

- A. 体格发育最快
- B. 识别危险的能力强
- C. 语言思维和交往能力增强
- D. 不易发生营养缺乏和消化紊乱
- E. 自身免疫力增强，传染病发生率低

39. 2 岁小儿的头围大约是

- A. 42cm
- B. 46cm
- C. 48cm
- D. 50cm
- E. 54cm

40. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A 产后 5~6 天出现, 30~35 天完全消退
- B 产后 1~2 天出现, 3~7 天完全消退
- C 产后 3~4 天出现, 15~20 天完全消退
- D 产后 3~4 天出现, 21~28 天完全消退
- E 产后 2~3 天出现, 10~14 天完全消退

41. 下列各项, 不属肺炎合并心力衰竭诊断要点的是

- A 心率突然超过 180 次/分
- B 呼吸突然加快, 超过 60 次/分
- C 突然极度烦躁不安, 发绀
- D 心音低钝, 颈静脉怒张
- E 左肋缘下可扪及脾脏

42. 肺炎喘嗽痰热闭肺证的治则是

- A 清热涤痰、开肺定喘
- B 辛凉开肺、清热化痰
- C 清心开肺、化痰止咳
- D 清热解毒、泻肺开闭
- E 宣肺化痰、止咳平喘

43. 9 岁患儿, 男, 哮喘病史三年余, 现症见咳嗽痰多, 食少脘痞, 面色欠华, 大便不实, 肌肉痿弱, 倦怠乏力, 舌淡苔白, 脉缓无力。治疗首选方剂是

- A 补中益气汤
- B 六君子汤
- C 健脾丸
- D 理中汤
- E 参苓白术散

44. 鹅口疮的病原体是

- A 白色念珠菌
- B 柯萨奇病毒
- C 葡萄球菌
- D 链球菌
- E 流感杆菌

45. 中医认为病毒性脑炎的病情演变

总不离热、痰、风的相互转化, 其始动因素是

- A 风
- B 痰
- C 热
- D 瘀
- E 寒

二、A<sub>2</sub> 型选择题 (46 ~ 113 题)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

46. 患者, 男, 29 岁, 因寒战、高热、咳嗽 4 天入院。查体: 血压 110/70mmHg, 口唇发绀, 呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音。X 线示: 肺段大片、均匀炎症浸润阴影, 血象: 白细胞  $19 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 0.76。可诊断为

- A 支原体肺炎
- B 病毒性肺炎
- C 衣原体肺炎
- D 真菌性肺炎
- E 肺炎链球菌肺炎

47. 患者, 男, 49 岁。患支气管哮喘 20 年, 急性发作 1 周, 昨夜气急突然加重。体检: 发绀, 大汗, 两肺叩诊过清音, 两肺闻及哮鸣音, 左肺呼吸音减弱, 心率 120 次/分, 律齐。用氨茶碱、激素后哮鸣音改善, 但气急无好转。病情加重的原因最可能是

- A 严重支气管痉挛
- B 并发左心衰
- C 并发气胸
- D 继发肺部感染
- E 并发呼吸衰竭

48. 患者, 女, 58 岁。患急性心肌梗死后第 2 天出现少尿, 血压 75/50mmHg, 烦躁不安, 面色苍白, 表情淡漠, 皮肤湿冷, 大汗淋漓, 脉细弱无力。应首先考虑的是

- A. 左心衰竭
- B. 低血糖反应
- C. 心源性休克
- D. 急性肾衰竭
- E. 心肌梗死后综合征

49. 患者，女，28岁。以心悸，气短，下肢水肿入院。检查：颈静脉怒张，心尖部舒张期杂音，肝肋缘下3cm轻度压痛。肝颈静脉回流征(+)。其肝脏病变可能是

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 肝炎后肝硬化
- C. 慢性肝淤血
- D. 肝脂肪变性
- E. 肝细胞肝癌

50. 一患者因2小时胸痛来诊，心电图示V1~V3导联QRS波呈QrS型，ST段呈弓背向上抬高伴倒置T波，诊断心肌梗死的部位是

- A. 下壁
- B. 间壁
- C. 前间壁
- D. 前壁
- E. 侧壁

51. 患者，女，32岁。饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐，呕后腹痛反而加重，服解痉剂无效。检查：体温39℃，心率120次/分，腹部紧张。有压痛、反跳痛，血清淀粉酶350U，血钙1.63mmol/L。应首先考虑的是

- A. 急性心肌梗死
- B. 溃疡病穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性肠梗阻

52. 患者，男，48岁。上腹部无规律胀痛3年余，常因饮食不当而发作，偶有反酸，嗝气，心血管检查无异常。应首先考虑的是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 心绞痛

- C. 胃溃疡
- D. 胃癌
- E. 慢性胃炎

53. 慢性胃炎患者，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 生脉饮
- C. 滋水清肝饮
- D. 益胃汤
- E. 玉女煎

54. 患者，男，50岁。肝硬化腹水，症见：腹膨大，按之坚满，脘闷腹胀纳呆，大便溏泄，小便不利，舌苔白腻，脉弦缓。其治法是

- A. 疏肝理气，利湿散满
- B. 运脾利湿，化气行水
- C. 活血化瘀，利水消肿
- D. 调脾行气，清热利湿
- E. 温补肾阳，通阳利水

55. 患者，女，38岁。高热寒战，腰痛，恶心、呕吐，尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状。尿沉渣镜检白细胞>5个/HP。其诊断应首先考虑的是

- A. 尿道炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

56. 患者，女，24岁。患再生障碍性贫血，症见：面色及唇甲苍白，食欲下降，精神萎靡，腰膝酸软，形寒肢冷，月经色淡，舌胖有齿痕苔白，脉沉细。其证型是

- A. 气血两虚
- B. 肾虚血瘀
- C. 脾气虚弱
- D. 肾阳亏虚
- E. 脾胃虚寒



57. 患者因胸骨疼痛、发热就诊，血液检查见到幼稚细胞增多，骨髓检查见到核细胞增生活跃，原始细胞占 40%。应首先考虑的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 白血病
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 传染性淋巴细胞增多症

58. 康某，女性，28 岁，患功能性子宫出血多年，就诊时面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。血常规检查：血红蛋白 102g/L，血清铁浓度为  $8.1 \mu\text{mol/L}$ ，骨髓铁染色显示：骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红细胞为 12%。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 缺铁性贫血+心脾两虚证
- B. 再生障碍性贫血+脾胃虚弱证
- C. 缺铁性贫血+脾胃虚弱证
- D. 肾性贫血+脾肾阳虚证
- E. 再生障碍性贫血+脾肾阳虚证

59. 某男，35 岁，易疲劳，怕冷，少汗，动作缓慢，食欲减退而体重增加，记忆力减退，实验室检查显示： $\text{FT}_4$  降低，TSH 正常。其可能的诊断为

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 继发性甲状腺功能减退症
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 甲状腺瘤

60. 王某，颈前肿胀 5 个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 逍遥散
- C. 天王补心丹
- D. 柴胡疏肝散

E. 镇肝息风汤

61. 刘某，因发热、淋巴结肿大就诊，骨穿诊断为急性白血病，给以化疗药物治疗。现低热，自汗，盗汗，气短，乏力，面色不华，头晕，腰膝酸软，手足心热，皮肤瘀点、瘀斑，鼻衄、齿衄，舌淡有齿痕，脉沉细。其中医治法是

- A. 益气养阴，清热解毒
- B. 清热化痰，活血散结
- C. 清热解毒，利湿化浊
- D. 清热解毒，凉血止血
- E. 益气养阴，利湿化浊

62. 癫痫患者，发则突然跌仆，目睛上视，口吐白沫，手足抽搐，喉间痰鸣，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 左归丸
- E. 定痫丸

63. 女性患者，72 岁。1 天前上午发现口角右偏，左手不能持物，左下肢不能行走，说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅，伸舌稍向左偏，左侧上下肢肌力 4 级。今晨醒来说话正常，鼻唇沟对称，伸舌居中，四肢运动灵活有力。其诊断是

- A. 右侧大脑中动脉血栓形成
- B. 椎-基底动脉血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

64. 患者突然发生神昏，半身不遂，口噤不开，四肢不温，痰涎壅盛，舌质暗淡，苔白腻，脉沉滑。西医诊断为脑出血。治疗应首选的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 安宫牛黄丸合羚羊角汤

- C. 涤痰汤送服苏合香丸
- D. 镇肝息风汤
- E. 真方白丸子

65. 患者，男，68岁。3年来无诱因逐渐出现行动缓慢，行走时前倾屈曲体态，伴头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，大便秘结。查体：面具脸，双手震颤，双侧肢体肌张力增高。无智力和感觉障碍，无锥体束损害征。舌红苔少，脉弦细。最可能的诊断是A. 帕金森病  
B. 血管性痴呆 C. 阿尔兹海默病D. 肝豆状核变性E. 脑梗死

66. 某男，被人发现时躺在公园一角落，呈半昏迷状态，遂急送医院。查体：体温 37℃，血压 130/70mmHg，神志不清，两侧瞳孔针尖大小，口角流涎，口唇紫绀，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率 60 次/分，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。其诊断是 A. 有机磷杀虫药中毒  
B. 酒精中毒  
C. 一氧化碳中毒  
D. 中暑  
E. 安定中毒

67. 患者，30岁，煤气中毒，经过积极抢救后苏醒，2天后又出现神志不清，右侧肢体偏瘫，体温、血压正常，两肺呼吸音粗。应首选的治疗措施是  
A. 高压氧舱  
B. 地塞米松输注  
C. 甘露醇输注 D. 维生素 C 输注E. 脑营养物质

68. 患者女性，65岁，腹痛拘急，遇寒痛甚，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。应首选的治疗方法

- 是
- A. 消食导滞，理气止痛
  - B. 温中补虚，缓急止痛
  - C. 散寒温里，理气止痛
  - D. 疏肝解郁，理气止痛
  - E. 活血化瘀，和络止痛

69. 男性患者，49岁，大便不干，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。其中医治法为  
A. 益气通便  
B. 温阳通便  
C. 补火助阳  
D. 回阳救逆  
E. 润肠通便

70. 顾某，男，35岁。两天来腹中结块，时聚时散，攻窜胀痛，脘肋胀闷不适，苔薄，脉弦。其诊断是  
A. 聚证，肝气郁结证  
B. 聚证，食滞痰阻证  
C. 积证，气滞血阻证  
D. 积证，肝气郁结证  
E. 积证，正虚瘀结证

71. 童某，女，48岁。两肋下积块5年，积块坚硬，隐痛，饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力，面色黧黑，舌质淡紫，脉细数。治疗此病证首选的方剂是  
A. 木香顺气散  
B. 膈下逐瘀汤合六君子汤  
C. 柴胡疏肝散合失笑散 D. 逍遥散合鳖甲煎丸  
E. 八珍汤合化积丸

72. 某患者，身目俱黄，色泽鲜明，发热口渴，腹部胀满，口干，口苦，恶心呕吐，肋胀痛而拒按，小便赤黄、短少，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉弦滑。治疗此证应首选的方剂是  
A. 甘露消毒丹  
B. 茵陈蒿汤 C. 茵陈四苓散

- D. 茵陈术附汤
- E. 黄芪建中汤

73. 张某，男性，36岁。体检时发现蛋白尿阳性，24小时定量为1.3g，下肢轻度浮肿，血压150/96mmHg，血肌酐 $124\mu\text{mol/L}$ 。其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

74. 患者，女，40岁。3年前发现患有风湿性心脏病，近半年来，体力活动明显受限，轻度活动即出现心悸，气短。其心功能为

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. 0级

75. 患者，男，50岁。咳痰带血二月余，近一个月食少，体重减轻。有吸烟嗜好，按肺炎治疗无效。X线检查见右肺近肺门处有一团块状阴影，痰脱落细胞检查找到癌细胞。本例患者的首选治疗方案是

- A. 放射治疗
- B. 手术切除
- C. 化学药物治疗
- D. 抗生素治疗
- E. 免疫治疗

76. 患者小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 无比山药丸

- D. 知柏地黄丸
- E. 补中益气汤

77. 患者因乏力就诊，骨穿示增生减低，考虑为再障。现症见面色苍白，倦怠乏力，头晕心悸，手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷，齿鼻衄血，舌质淡，苔白，脉细无力。其中医治法是

- A. 滋阴助阳，益气补血
- B. 补肾助阳，益气养血
- C. 滋阴补肾，益气养血
- D. 清热凉血，解毒养阴
- E. 补肾活血

78. 患者，男，50岁。高血压病史15年，未坚持服药。2小时前因情绪激动突然意识不清，双侧瞳孔不等大。应首先考虑的是

- A. 酒精中毒
- B. 药物中毒
- C. 高血压性脑出血
- D. 脑血栓
- E. 心功能不全

79. 患者，女性，28岁，手术后出现表情淡漠，嗜睡，烦躁，腹胀，心跳加快，心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和U波出现，属

- A. 轻度缺水
- B. 中度缺水
- C. 重度缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

80. 患者，男性，35岁，出现局部隆起，红肿热痛明显，压之剧痛，有波动感，应首先考虑的诊断是

- A. 丹毒
- B. 蜂窝织炎
- C. 脓肿
- D. 疔
- E. 疖

81. 患者，男，60岁，鼻唇沟毛囊处出现红肿热痛小结节，逐渐肿大隆起3天，近两天中央部坏死，出现脓栓，红肿热痛加重。处理不当容易引起

A. 面部蜂窝织炎  
B. 化脓性海绵状静脉窦炎  
C. 脑脓肿  
D. 化脓性脑膜炎  
E. 败血症

82. 患者，男，55岁，因砖头砸伤右侧头顶部，后出现昏迷，CT检查示：右侧脑顶叶内高密度影。应首先考虑的诊断是

A. 脑内血肿  
B. 硬膜外血肿  
C. 硬膜下血肿  
D. 蛛网膜下腔出血  
E. 脑干出血

83. 患者，男，汽油烧伤前臂，表皮剥脱，散在水疱，疱皮下创面微湿，红白相间，痛觉迟钝。烧伤深度为

A. I°  
B. 浅II°  
C. 深II°  
D. III°  
E. IV°

84. 患者，男，50岁。夜间右足背蛇咬伤8小时，蛇种类不清，局部疼痛不剧烈，逐渐出现头昏、胸闷、恶心、四肢乏力、眼睑下垂、语言不利等。最可能所咬的蛇毒种类为

A. 火毒  
B. 风毒  
C. 风火毒  
D. 热毒  
E. 湿毒

85. 患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考

虑的诊断是

A. 皮脂腺囊肿  
B. 神经纤维瘤病  
C. 皮样囊肿  
D. 脂肪瘤  
E. 淋巴管瘤

86. 患者，女，23岁，发现颈前区单一肿块3个月，随吞咽上下活动，边界清楚，应首先考虑的诊断是

A. 甲状腺瘤  
B. 结节性甲状腺肿  
C. 甲状腺肿  
D. 甲状腺癌  
E. 甲亢

87. 患者，女，42岁，颈部弥漫性肿大，伴四肢困乏，气短，纳呆体瘦；舌苔薄，脉弱无力。治疗应首选的方剂是

A. 仙方活命饮  
B. 海藻玉壶汤  
C. 四海舒郁丸  
D. 柴胡疏肝散  
E. 龙胆泻肝汤

88. 1. 患者，男，70岁。吸烟史40年，咳痰带血1个月，伴消瘦，无明显发热，应首先考虑的诊断是

A. 肺癌  
B. 肺炎  
C. 支气管扩张症  
D. 肺结核  
E. 肺纤维瘤

89. 患者，女性，26岁，产后1个月双乳出现红肿热痛，可触及包块，应首先考虑的诊断是

A. 积乳囊肿  
B. 乳腺癌  
C. 乳腺纤维腺瘤  
D. 乳腺增生症  
E. 急性乳腺炎

90. 患者，女，30岁，双乳内多发肿块，

为确定肿块为实性或囊性，最好的检查方法是

- A. 钼靶 X 线摄片
- B. CT
- C. B 超
- D. 近红外线透照检查
- E. 热图像检查

91 患者，男，35 岁，消化性溃疡反复发作 10 年，突然剧烈腹痛 3 小时，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，X 线检查可见膈下游离气体，应首先考虑的诊断是

- A. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- B. 急性腹膜炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性肠梗阻
- E. 急性胆囊炎

92 产妇临产 8 小时，肛诊检查头先露，宫口已开全，先露+4，此时产力的组成是

- A. 子宫收缩力
- B. 子宫收缩力+腹肌收缩力
- C. 子宫收缩力+膈肌收缩力
- D. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
- E. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力

93 初产妇，24 岁。从分娩后第 3 天体温在 38.5℃ 左右，子宫收缩好，无压痛，会阴伤口无肿胀及压痛，恶露淡红色，无臭味，双乳肿胀且硬。首先应考虑的诊断是

- A. 会阴伤口感染
- B. 乳腺炎
- C. 产褥感染
- D. 上呼吸道感染
- E. 泌乳热

94 患者，女，30 岁。妊娠 47 天，恶心呕吐，多为食物，呕不能食，或食入即吐，脘腹胀满，不思饮食，头晕

乏力，倦怠思睡，舌淡，苔白，脉缓滑无力。治疗应首选的方剂是

- A. 加味温胆汤
- B. 香砂六君子汤
- C. 小半夏加茯苓汤
- D. 干姜人参半夏丸
- E. 苏叶黄连汤

95. 患者，女，24 岁，G<sub>1</sub>P<sub>1</sub> 现孕 36 周，“先兆子痫”入院。入院后 2 天，经治疗血压持续在 165/120mmHg，感视物模糊，现自数胎动减少，做 NST 为无反应型，再做 B 型超声生物物理评分为 4 分。应首选的治疗措施是

- A. 立即终止妊娠
- B. 继续治疗妊娠高血压病至妊娠 37 周
- C. 次日复查 NST
- D. 吸氧观察
- E. 做 OCT

96 患者，女，25 岁。产后恶露过期不止，量较多，色红质稠，大便干燥，舌红，脉滑数。

其中医证型是

- A. 血瘀型
- B. 气虚型
- C. 阴虚型
- D. 血热型
- E. 湿热型

97 患者，女，34 岁。自然分娩，产后第 3 天午后体温 37.8℃，大小便正常。检查：子宫底脐下 3 指，无压痛，乳房胀硬。首先应考虑的诊断是

- A. 产褥热
- B. 流行性感
- C. 伤口感染
- D. 泌尿系感染
- E. 乳汁淤积

98 患者，女，48 岁。外阴瘙痒逐渐加重 3 年，抓破后伴有局部疼痛。查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕，黏膜变白，皮肤变薄、干燥、失去弹

性。首先应考虑的诊断是

- A. 外阴增生型营养不良
- B. 外阴硬化性苔藓
- C. 外阴白癜风
- D. 外阴银屑病
- E. 外阴湿疹

99 患者，女，31 岁。月经周期不规则，周期、经期延长，量偏多，婚后 4 年不孕，双合诊检查子宫后倾后屈，基础体温呈单相。首先应考虑的诊断是

- A. 子宫位置异常
- B. 黄体萎缩不全
- C. 无排卵性异常子宫出血
- D. 黄体发育不全
- E. 子宫内膜修复延长

100 患者，女，20 岁。近半年来出现月经提前，甚则半月一行，经量时多时少，色紫红，夹有瘀块，伴胸闷胁胀，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔薄，脉弦数。其中医证型是

- A. 阳盛血热型
- B. 气虚型
- C. 虚热型
- D. 血瘀型
- E. 肝郁血热型

101 患者，女，34 岁，已婚。近 3 年月经量少，渐至停闭，五心烦热，两颧潮红，骨蒸劳热，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 加减一阴煎
- C. 两地汤
- D. 人参养营汤
- E. 左归丸

102 患者，女，50 岁。因阴道不规则流血诊断为宫颈癌 IIa 期，其病变应累及的范围是

- A. 宫颈、阴道上 1/3 处，无明显宫旁浸润
- B. 宫颈、阴道上 1/3 处及宫旁浸润

C. 宫颈、阴道上 2/3 范围内，无明显宫旁浸润

- D. 宫颈、宫旁浸润，但未达盆壁
- E. 宫颈、阴道下 1/3 浸润但无宫旁浸润

103 患者，女，48 岁。月经周期正常，月经量多 5 年，子宫如孕 2 个半月大小，表面不平，宫体左侧可扪及直径约为 5cm 大小包块，质硬，与子宫体分不开，无压痛。首先应考虑的诊断是

- A. 多发性子宫肌瘤
- B. 卵巢实质性肿瘤
- C. 子宫腺肌瘤
- D. 盆腔炎性包块
- E. 子宫内膜异位囊肿

104 患者，女，31 岁。近 2 年经期或经后腹痛，喜温喜按，月经色淡、质稀，神疲乏力，舌淡暗，苔薄白，脉细无力，诊断为子宫内膜异位症。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 理冲汤

105 患儿，6 个月。每闻声响则啼哭不安。其病位是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 心
- D. 肺
- E. 肾

106 患儿，出生 7 天。面目皮肤发黄，色泽晦暗精神差，吮乳少，四肢欠温，腹胀便溏，舌淡苔白腻，指纹色淡。其诊断是

- A. 新生儿黄疸，瘀积发黄证
- B. 新生儿黄疸，湿热熏蒸证
- C. 新生儿，生理性黄疸

D. 新生儿寒冷损伤综合征 E.  
新生儿黄疸，寒湿阻滞证

17 患儿，4岁。发热咽痛，咽部充血，软腭上有2~4mm大小的疱疹，疱疹周围有红晕。心肺听诊正常。其可能的诊断是

- A. 咽结合膜
- B. 疱疹性咽峡炎
- C. 急性化脓性扁桃体炎
- D. 支气管炎
- E. 支气管肺炎

18 患儿，2岁。患肺炎喘嗽反复不愈2周余，低热起伏，咳嗽无力，多汗、四肢欠温，面色白，纳呆便溏，舌质偏淡，舌苔白滑，指纹淡红而滞，在风关，治疗应首选的方剂是

- A. 桂枝汤
- B. 人参五味子汤
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤
- E. 泻白散

19 患儿，18个月。腹泻时轻时重，已经3个月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色晄白，精神萎靡，睡时露睛，舌淡苔白，指纹色淡。治疗应首选的方剂是

- A. 附子理中汤合四神丸
- B. 保和丸合二陈汤
- C. 金匱肾气丸合人参乌梅汤
- D. 参苓白术散合理中丸
- E. 异功散合平胃散

20 患儿，6个月。母乳喂养，腹泻已两个半月，大便每日6~7次，便中含有奶瓣，曾服用妈咪爱无效。查体：神志清，体重6.3kg，化验：大便偶见脂肪滴。应首先考虑的诊断是

- A. 生理性腹泻
- B. 大肠杆菌性肠炎
- C. 霉菌性肠炎

D. 病毒性  
E. 过敏性肠炎

21 患儿，3岁。反复浮肿2月余。尿蛋白(+++)，镜检(-)，尿蛋白定量>10mg/

(kg·d)，血清白蛋白25g/L，胆固醇10.4mmol/L(40mg/dL)，血压正常。尿素氮正常。首先考虑的诊断是

- A. 急性肾炎 B.  
肾病综合征 C.  
尿路感染 D.  
肾盂肾炎 E.  
急进性肾炎

22 患儿，2岁。起病急骤，皮肤出现瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶见尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。其首选方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 桃仁汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 大补阴丸合茜根散
- E. 归脾汤

23 患儿，2岁。发热7天，壮热，体温40℃，昼轻夜重，唇干赤裂，烦躁不宁，肌肤斑疹鲜红，手足肿胀潮红，杨梅舌，指纹紫。诊断为皮肤黏膜淋巴结综合征，其病机是

- A. 邪在肺胃
- B. 卫气同病
- C. 气营两燔
- D. 邪在太阳
- E. 邪在少阴

24 患儿，2个月。足月顺产，母乳喂养，诊断佝偻病激期，为治疗服用维生素D，每日补充的合理剂量是

- A. 200IU
- B. 0IU
- C. 2000IU
- D. 4000IU

E. 1000IU

115 患儿，3岁。低热恶寒，鼻塞流涕，全身皮肤成批出疹，为红色斑疹和斑丘疹，继有疱疹，疱浆清亮，头面、躯干多见，舌红，苔薄白，脉浮数。其诊断是

- A. 猩红热，邪侵肺胃证
- B. 麻疹，见形期
- C. 水痘，邪郁肺卫证
- D. 风疹，邪郁肺卫证
- E. 幼儿急疹，肺卫蕴热证

116 患儿，2岁。生后至今不会站立与行走，头项歪斜。其病变脏腑主要是

- A. 心肝
- B. 心肾
- C. 肺脾
- D. 心肺
- E. 脾肾

117 新生儿，15天。生后母乳喂养。每次哺乳后易溢乳，应采取的措施是

- A. 哺乳后轻拍其背
- B. 两次喂哺时间相隔3小时
- C. 每次哺乳时间1小时
- D. 减少每次哺乳量
- E. 定时喂哺，每日6~8次

### 三、A<sub>3</sub>型选择题（118 ~ 132 题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设3道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

（118~122 题共用题干）

患者，男，58岁。高血压病史6年。近5个月来夜尿增多，伴有乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。查体：轻度贫血貌，血压170/110mmHg。舌淡红，苔白，有齿痕。脉沉细。肾功能检查：GFP50mL/min, Ccr 60mL/min, Scr256 μmol/L。

118 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 高血压肾病
- C. 肾病综合症
- D. 慢性肾衰竭
- E. 慢性肾小球肾炎

119 以下措施不合理的是

- A. 积极纠正贫血
- B. 使用ACEI和ARB降压
- C. 低蛋白、低磷饮食
- D. 蛋白尿控制在<0.5g/24h
- E. 使用噻嗪类利尿剂

120 中医治法是

- A. 温扶元阳，补益真阴
- B. 滋肾平肝
- C. 温补脾肾
- D. 补气健脾益肾
- E. 益气养阴，健脾补肾

121 治疗此证应首选的方剂是

- A. 参芪地黄汤加减
- B. 六君子汤加减
- C. 济生肾气丸加减
- D. 杞菊地黄汤加减
- E. 金匱肾气丸或全鹿丸加减

122 若脾虚湿困，恶心呕吐，胸闷纳呆者，可加

- A. 苍术、藿香、佩兰、薏苡仁
- B. 黄连温胆汤
- C. 四妙丸
- D. 五皮饮或五苓散
- E. 苏叶、赭石

（123~126 题共用题干）

患者，男，28岁。2天前被木刺刺伤手指，未进行消毒处理。现症见：指端剧烈跳痛，触之痛甚，畏寒、发热、头痛，体温38.7℃，食欲不振，疼痛造成夜眠不安，舌红，苔黄，脉数。123. 其诊断是

- A. 手部淋巴结炎
- B. 脓性指头炎
- C. 化脓性腱鞘炎
- D. 化脓性滑囊炎
- E. 脓毒症

124. 其证型是



- A. 风毒在表证
- B. 火毒结聚证
- C. 热盛肉腐证
- D. 风毒入里证
- E. 阴虚邪留证

125. 其治疗是

- A. 驱风镇痉
- B. 祛风镇痉，清热解毒
- C. 益胃养阴，疏风通络
- D. 补养气血，托毒透邪
- E. 清热解毒，透脓止痛

126. 治疗应首选

- A. 玉真散合五虎追风散加减
- B. 五味消毒饮加减
- C. 清营汤加减
- D. 托里消毒散加减
- E. 附子理中汤加减

(127~129 题共用题干)

患者，女，32岁。已婚5年，未避孕，未怀孕。患者平素月经量少，35~40天一行，带下量多，头晕头重，时有胸闷泛恶，四肢倦怠，体胖，体毛多，舌体胖大、色淡，苔白腻，脉滑。127. 其诊断是

- A. 异常子宫出血
- B. 闭经
- C. 多囊卵巢综合征
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病

128. 其证型是

- A. 肾阴虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 肝经湿热证
- D. 痰湿阻滞证
- E. 气滞血瘀证

129. 治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 苍附导痰丸合佛手散

(130~132 题共用题干)

患儿，男，4岁。大便秘结，脘腹胀痛，不思饮食，手足心热，小便黄，恶心呕吐，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。

130. 其诊断是

- A. 乳食积滞便秘
- B. 燥热内结便秘
- C. 气机郁滞便秘
- D. 气虚不运便秘
- E. 血虚肠燥便秘

131. 其治法是

- A. 消积导滞，清热和中
- B. 清腑泄热，润肠通便
- C. 疏肝理气，导滞通便
- D. 健脾益气，润肠通便
- E. 滋阴养血，润肠通便

132. 治疗应首选

- A. 麻子仁丸加减
- B. 六磨汤加减
- C. 黄芪汤加减
- D. 润肠丸加减
- E. 保和丸加减

四、B<sub>1</sub>型选择题(133~150题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(133~134 题共用备选答案)

- A. 长期、反复咳嗽、咯痰
- B. 反复咳嗽、咯痰，喘息，并伴有哮鸣音
- C. 咳嗽、咯痰，伴长期午后低热，消瘦，盗汗
- D. 发作性带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E. 夜间热睡后突然憋醒，伴咳嗽、咯痰

133. 支气管哮喘的临床表现是

134. 慢性支气管炎喘息型的临床表现是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 胸部刺痛，入夜尤甚
- B. 胸闷隐痛，时作时止
- C. 胸闷如窒，气短喘促
- D. 胸闷气短，畏寒肢冷
- E. 胸痛彻背，感寒痛甚

- 135. 胸痹气阴两虚证，其临床特点是
- 136. 胸痹阴寒凝滞证，其临床特点是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 右上腹疼痛，进食油脂食物常加重
  - B. 上腹压痛，板样强直，肝浊音界消失
  - C. 发作性上腹疼痛，有周期性和节律性
  - D. 脐周阵痛，伴有压痛，肠鸣音亢进，有肠型
  - E. 上腹部胀痛，伴有胃型和振水声
- 137. 胆石症和急性胆囊炎可见
  - 138. 消化性溃疡可见

(139~140 题共用备选答案)

- A. 噻嗪类利尿药
  - B. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
  - C. 糖皮质激素
  - D. 氨基糖苷类抗生素
  - E. 细胞毒药物
- 139. 钠水潴留容量依赖性高血压患者，治疗应首选的药物是
  - 140. 肾素依赖性高血压患者，治疗应首选的药物是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 桃仁四物汤合犀角地黄汤加减
  - B. 启膈散合逍遥散加减
  - C. 五汁安中饮加味
  - D. 二陈汤合旋覆代赭汤加减
  - E. 大补元煎加减
- 141. 食管癌痰气交阻证治疗首选
  - 142. 食管癌痰湿内蕴证治疗首选

(143~144 题共用备选答案)

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈

- D. 内旋转
  - E. 仰伸
- 143. 胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平称为
  - 144. 胎头沿骨盆轴前进的动作称为

(145~146 题共用备选答案)

- A. 肾气丸
  - B. 举元煎
  - C. 真武汤
  - D. 六味地黄丸
  - E. 内补丸
- 145. 滋补肾阴的代表方是
  - 146. 补中益气的代表方是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 42cm
- B. 46cm
- C. 48cm
- D. 50cm
- E. 54cm

(149~150 题共用备选答案)

- A. 驱蛔杀虫
- B. 散结下虫
- C. 安蛔定痛
- D. 调理脾胃
- E. 通腑排蛔