

2 0 2 1 中 医 助 理 医 师 考 试

模拟密押卷

2021 年

中医助理医师资格

考试专用

第一单元

A1

- 小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下，说明了湿邪
 - 湿性趋下
 - 湿性黏滞
 - 湿性重浊
 - 湿为阴邪
 - 易阻气机
- 津液的丢失往往伴有气的损耗，说明二者的关系是
 - 气能行津
 - 气能摄津
 - 气能生津
 - 津能生气
 - 津能载气
- 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是
 - 上午
 - 中午
 - 下午
 - 前半夜
 - 后半夜
- 阴液不足，日久不愈，影响阳气化生，引起阳也不足的病理变化是
 - 阴偏衰
 - 阳偏衰
 - 阳损及阴
 - 阴损及阳
 - 阴阳互损
- “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间存在何种关系
 - 对立制约
 - 互根互用
 - 互为消长
 - 平衡协调
 - 互相转化
- 下列情志相胜关系中，哪一项是错误的
 - 怒胜思
 - 思胜恐
 - 恐胜喜
 - 喜胜悲
 - 惊胜怒
- 具有“主治节”功能的脏是
 - 肝
 - 心
 - 脾
 - 肺
 - 肾
- 具有“水之上源”之称的脏是
 - 肝
 - 心
 - 脾
 - 肺
 - 肾
- 六腑中具有“太仓”之称的是
 - 小肠
 - 三焦
 - 脾
 - 大肠
 - 胃
- 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是
 - 肾精
 - 肾气
 - 肾阴
 - 肾阳
 - 肾血
- 有君相安位关系的两脏是
 - 心与肺
 - 心与肾
 - 肺与脾
 - 脾与肝
 - 肺与肝
- “中精之腑”指
 - 胆
 - 胃
 - 大肠
 - 小肠
 - 三焦
- 具有“喜润恶燥”生理特性的是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

14. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生飧泄”

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

15. 脑主司感觉运动，有赖于

- A. 脑髓充养
- B. 营血充养
- C. 肾精充养
- D. 肝血充养

16. 以下哪项不是寒痰阻肺证的特征

- A. 痰多
- B. 色白
- C. 咳喘
- D. 质稀
- E. 难咯

17. 热极的患者其唇的色泽可表现为

- A. 唇色深红
- B. 唇色青紫
- C. 口唇青黑
- D. 口唇赤肿而干
- E. 口唇呈樱桃红色者

18. 斑与疹的主要区别是

- A. 是否色红成片
- B. 是否时现时隐
- C. 是否抚之碍手
- D. 是否压之褪色
- E. 是否伴有身热

19. 症见胁肋胀痛，口苦，阴部瘙痒，带下色黄臭秽，脉弦数，此为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝火炽盛证
- C. 胆郁痰扰证
- D. 肝胆湿热证
- E. 湿热蕴脾证

20. 鼻流浊涕者，多属

- A. 外感风热
- B. 胆经湿热
- C. 阳气虚弱
- D. 外感风寒
- E. 阴虚肺燥

21. 眼窝凹陷多属

- A. 肺胀
- B. 吐泻伤津
- C. 肝胆火炽
- D. 脾胃虚衰
- E. 肾阴不足

22. 舌苔薄白而干者多见于

- A. 湿浊中阻
- B. 食积内停
- C. 脾肾阳虚
- D. 外感风热
- E. 燥热伤津

23. 症见口苦，咽干，寒热往来，胸胁苦满，脉弦，此为

- A. 太阳经证
- B. 太阳腑证
- C. 少阳病证
- D. 阳明经证
- E. 阳明腑证

24. 在 28 脉中，具有沉、实、大、弦、长特点的脉象是

- A. 紧脉
- B. 革脉
- C. 牢脉
- D. 芤脉
- E. 伏脉

25. 舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质

颗粒者称

- A. 花剥苔
- B. 地图舌
- C. 镜面舌
- D. 光滑舌
- E. 类剥苔

26. 下列不属肾精耗损证表现的是

- A. 手足心热
- B. 消瘦无力
- C. 口燥咽干
- D. 舌绛不鲜
- E. 手指蠕动

27. 下列哪项为下焦病证的临床表现A.

- 身热
- B. 颧红
- C. 手足心热甚于手足背
- D. 心中憺憺大动
- E. 以上均是

28. 具有清热燥湿作用的药物应具有的药味是

- A. 酸味
- B. 苦味
- C. 甘味
- D. 辛味
- E. 咸味

29. 下列配伍中属于“十九畏”配伍的药物是

- A. 大戟与甘草
- B. 贝母与乌头
- C. 乌头与瓜蒌
- D. 官桂与赤石脂
- E. 芍药与藜芦

30. 既能发汗解表，又能利水消肿的药物是

- A. 麻黄、荆芥
- B. 香薷、紫苏
- C. 麻黄、香薷
- D. 紫苏、生姜
- E. 荆芥、防风

31. 下列药物中可用于治疗巅顶头痛的是

- A. 藁本
- B. 防风
- C. 细辛
- D. 辛夷
- E. 荆芥

32. 治疗风热、肝热之目赤肿痛的最佳药对是

- A. 菊花、木贼
- B. 薄荷、柴胡
- C. 桑叶、菊花
- D. 桑叶、牛蒡子
- E. 蝉蜕、乌贼

33. 阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热、心烦等证，宜选用的药物是

- A. 天花粉、沙参
- B. 生石膏、黄柏
- C. 黄柏、知母
- D. 黄芩、地骨皮
- E. 牡丹皮、桑白皮

34. 治疗怀孕蕴热、胎动不安者，当选用的药物是

- A. 桑寄生
- B. 黄芩
- C. 紫苏
- D. 续断
- E. 砂仁

35. 以下哪项是芦根和淡竹叶共有的功效

- A. 止呕
- B. 利尿
- C. 止血
- D. 凉血
- E. 以上都不是

36. 具有润肺止咳，散结消痈功效的药物是

- A. 川贝母
- B. 旋覆花
- C. 百部
- D. 杏仁
- E. 紫菀

37. 既能清热解毒，又能疏散风热的药对是

- A. 桑叶、菊花
- B. 薄荷、牛蒡子
- C. 牛黄、水牛角
- D. 金银花、连翘
- E. 蒲公英、紫花地丁

38. 治疗风湿日久，累及肝肾的最佳药物组合是
- A. 羌活、独活
B. 五加皮、桑寄生
C. 秦艽、薏苡仁
D. 白术、苍术
E. 苍术、黄柏
39. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是
- A. 0.1~0.3g、0.5~1g
B. 1~2g、0.1~1g
C. 1~5g、1~2g
D. 5~15g、3~6g
E. 以上都不是
40. 下列除哪项外都是主治风湿热痹的药物
- A. 桑枝
B. 防己
C. 威灵仙
D. 薏苡仁
E. 络石藤
41. 既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是
- A. 大蓟
B. 小蓟
C. 白茅根
D. 地榆
E. 槐花
42. 可用于养血安胎的药物是
- A. 狗脊
B. 砂仁
C. 乌梢蛇
D. 五加皮
E. 桑寄生
43. 桂枝汤中外可解肌发表，内可调和营卫、调和阴阳的配伍是
- A. 桂枝与生姜
B. 桂枝与芍药
C. 大枣与甘草
D. 生姜与甘草
E. 芍药与大枣
44. 银翘散中体现去其性而取其用之法的配伍是
- A. 银花、连翘
B. 芦根、芥穗
C. 竹叶、薄荷
D. 牛蒡子、苦桔梗
E. 荆芥穗、淡豆豉
45. 麻子仁丸的组成药物中不含
- A. 大黄
B. 枳实
C. 当归
D. 杏仁
E. 芍药
46. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是
- A. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
B. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
C. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
D. 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草
E. 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
47. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是
- A. 当归
B. 附子
C. 桂枝
D. 干姜
E. 甘草
48. 防风通圣散的功用是
- A. 疏风清热，宣肺止咳
B. 疏风解表，清热通便
C. 和解少阳，内泻结热
D. 辛凉宣肺，清热平喘
E. 解表散寒，温肺化饮
49. 酸枣仁汤的组成药物中含有
- A. 远志
B. 知母
C. 茯神
D. 柏子仁
E. 龙眼肉
50. 左归丸组成中含有而右归丸组成中不含有的药物是
- A. 枸杞子
B. 龟板胶
C. 鹿角胶
D. 山茱萸
E. 菟丝子
51. 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是
- A. 温阳散寒
B. 温肾纳气

- C. 温通经脉
D. 鼓舞气血
E. 散寒止痛
52. 下列各项中, 不属于独活寄生汤组成药物的是
A. 杜仲、牛膝、肉桂
B. 白术、羌活、苍术
C. 细辛、防风、秦艽
D. 川芎、当归、生地
E. 人参、芍药、甘草
53. 属感染性发热的疾病是
A. 风湿热
B. 广泛性皮炎
C. 肝癌
D. 斑疹伤寒
E. 白血病
54. 急性心梗患者常有发热, 其主要机制是
A. 变态反应
B. 代谢障碍
C. 体温调节中枢失常
D. 神经功能障碍
E. 吸收热
55. 在非感染性发热中, 属抗原-抗体反应性疾病的是
A. 血清病
B. 中暑
C. 重度安眠药中毒
D. 大面积烧伤
E. 急性心肌梗死
56. 发热 10 天, 每天体温最高达 39.6°C ~ 40.1°C , 最低 37.6°C , 试问该热型属于
A. 波状热
B. 稽留热
C. 弛张热
D. 不规则热
E. 间歇热
57. 吸气性呼吸困难表现为
A. 明显的哮鸣音
B. 深大呼吸
C. 桶状胸
D. 三凹征
E. 胸部一侧呼吸减弱
58. 反复发作的呼气性呼吸困难, 主要见于
A. 气道异物
B. 支气管哮喘
C. 大叶性肺炎
D. 肺不张
E. 气胸
59. 肺气肿时, 呼吸困难的主要特点是
A. 呼气费力
B. 吸气和呼气均感费力
C. 呼吸浅快
D. 吸气费力
E. 呼吸深慢
60. 肾源性水肿常见于
A. 肝硬化
B. 各型肾炎
C. 右心衰竭
D. 低蛋白血症
E. 妊娠高血压综合征
61. 下列可以表现为局部性水肿的是
A. 创伤
B. 丝虫病
C. 局部炎症
D. 血栓性静脉炎
E. 以上都是
62. 关于腹痛部位, 下列叙述正确的是
A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
E. 肝脓肿疼痛多在中下腹
63. 三焦经在上肢的循行部位是
A. 外侧前缘
B. 内侧中线
C. 外侧后缘
D. 内侧前缘
E. 外侧中线
64. 下列哪组经脉没有按照气血循行流注顺序排列
A. 胆经、肝经、肺经
B. 心经、小肠经、肾经
C. 大肠经、胃经、脾经
D. 肾经、心包经、三焦经
E. 三焦经、胆经、肝经
65. 手足三阴经在四肢肘膝关节以上的分布规律是
A. 太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后

- B. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
 C. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
 D. 少阴在前，厥阴在中，太阴在后
 E. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
66. 手阳明大肠经的主治特点是
 A. 后头、神志病
 B. 侧头、肋肋病
 C. 侧头、耳病、肋肋病侧
 D. 前头、鼻、口、齿病
 E. 气喘、咽喉病、胃肠病
67. 八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是
 A. 列缺
 B. 内关
 C. 照海
 D. 公孙
 E. 大陵
68. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是
 A. 井穴
 B. 荥穴
 C. 输穴
 D. 经穴
 E. 合穴
69. 病在胃者及以饮食不节得病者，适用的特定穴为
 A. 井穴
 B. 荥穴
 C. 输穴
 D. 经穴
 E. 合穴
70. 肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是
 A. 1.5 寸
 B. 3 寸
 C. 4 寸
 D. 6 寸
 E. 8 寸
71. 循行“入下齿中”的经脉是
 A. 小肠经
 B. 大肠经
 C. 胃经
 D. 脾经
 E. 肝经
72. 经脉循行中，不与目内眦或目外眦发生联系的是
 A. 手少阳三焦经
 B. 手太阳小肠经
 C. 手阳明大肠经
 D. 足太阳膀胱经
 E. 足少阳胆经
73. 在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉是
 A. 足太阴脾经
 B. 手厥阴心包经
 C. 足少阴肾经
 D. 足阳明胃经
 E. 手太阴肺经
74. “起于大指之端…夹咽，连舌本，散舌下”的经脉是
 A. 手少阴心经
 B. 足厥阴肝经
 C. 足太阴脾经
 D. 足少阴肾经
 E. 手厥阴心包经
75. 下列腧穴中，治疗便秘效果较好的是
 A. 关冲
 B. 中渚
 C. 阳池
 D. 支沟
 E. 外关
76. 以下哪项不是得气的感觉或反应
 A. 针刺部位有酸胀、麻重感
 B. 针刺部位出现热、凉、痒、痛、抽搐、蚁行等感觉
 C. 患者出现循经性肌肤瞤动、震颤
 D. 医者刺手体会到针下空松、虚滑
 E. 医者刺手体会到针体颤动
77. 仰靠坐位适宜取哪些部位的腧穴
 A. 头、面、胸背部腧穴和上、下肢部分腧穴
 B. 身体侧面腧穴和上、下肢部分腧穴
 C. 头、项、脊背、腰骶部的腧穴
 D. 前头、颜面和颈前等部位的腧穴
 E. 后头和项、背部的腧穴
78. 人体实验类型中，无需承担道德代价的是
 A. 天然实验
 B. 自愿实验
 C. 欺骗实验
 D. 强迫实验

- E. 自我实验
79. 国家卫生部关于《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》的制定时间是
- A. 1990 年
B. 1995 年
C. 2000 年
D. 2003 年
E. 2005 年

80. 依据美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念中，不能确诊“脑死亡”的是
- A. 自主肌肉运动和自主呼吸消失
B. 诱导反射消失
C. 脑电波平直或等电位
D. 体温低于 32.2℃
E. 对外部刺激和内部需要无接受者

A2

81. 患者，男，59 岁，久病，因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出，称为
- A. 子暗
B. 金破不鸣
C. 金实不鸣
D. 少气
E. 短气
82. 患者男性，60 岁。平素眩晕病史，因恼怒而突发头痛而胀，继则昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。此证候属
- A. 气结
B. 气逆
C. 气郁
D. 气脱
E. 气陷
83. 患儿，男，4 岁。因发热，腹泻来诊。脉浮，大小不齐，应考虑为
- A. 痰食
B. 风痰
C. 寒湿
D. 积滞
E. 风热
84. 患者，男，58 岁，近日生气后胸膈痞闷，

脘腹胀痛，嗳腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消，治疗应首选

- A. 藿香正气散
B. 平胃散
C. 半夏厚朴汤
D. 半夏泻心汤
E. 越鞠丸

85. 患者素有水饮，复感风寒，水寒相搏，以致肺寒气逆，喘咳痰多而稀，恶寒发热无汗，面部与四肢浮肿，身体重痛，舌苔白滑，脉浮。治疗应选用

- A. 小青龙汤
B. 五苓散
C. 苓桂术甘汤
D. 麻黄汤
E. 藿香正气散

86. 患者节律性上腹痛伴有恶心、呕吐、反酸等，胃镜检查诊断为胃溃疡，提示处于活动期的内镜下表现是

- A. 溃疡基底部有白色厚苔
B. 溃疡表浅苔变薄
C. 黏膜皱襞向溃疡集中
D. 溃疡基底部呈现红色瘢痕
E. 溃疡基底部呈现白色瘢痕

87. 男性，52 岁，胃溃疡病史 10 年，近 1 个月来疼痛的节律性消失，食欲减退，体重减轻，粪便隐血试验持续(+++)，应首先考虑的诊断为

- A. Hp 感染
B. 消化道出血
C. 癌变
D. 慢性穿孔
E. 幽门梗阻

88. 患者，男性，35 岁，咽喉红肿疼痛，吞咽困难，口渴喜饮，大便秘结，舌红苔黄，脉数。针灸治疗应选取

- A. 鱼际、合谷、少商、照海
B. 关冲、合谷、尺泽、列缺
C. 关冲、少商、鱼际、内庭
D. 太溪、照海、鱼际、列缺
E. 少商、曲池、鱼际、尺泽

89. 患者，男，45 岁。大便秘结不通，排便艰难，伴腹胀痛，身热，口干口臭，喜冷饮，舌红，苔黄，脉滑数。治疗除取主穴外，还

应选用的穴位是

- A. 中脘、太冲
- B. 神阙、关元
- C. 足三里、脾俞
- D. 合谷、曲池
- E. 气海、脾俞

90. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

- A. 肾俞、关元
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 膈俞、关元
- E. 膈俞、血海

- A. 母病及子
- B. 相乘传变
- C. 子病犯母
- D. 相侮传变
- E. 制化传变

91. 水气凌心属于

92. 木火刑金属于

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

93. “在液为涎”的脏是

94. “在液为泪”的脏

- 是 A. 脾胃
- B. 肝胆
- C. 心肾
- D. 肝肾
- E. 肝肺

95. 与气机调节关系密切的是

96. 气机升降之枢指的是

- A. 目
- B. 舌
- C. 口
- D. 鼻
- E. 耳

97. 脾在窍为

98. 肺在窍为

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 阴阳维脉

99. 具有约束纵行诸经功能的是

100. 称为“十二经脉之海”的是

- A. 胖大舌
- B. 瘦薄舌
- C. 点刺舌
- D. 老舌
- E. 强硬舌

101. 气血两虚的舌象是

102. 水湿内停的舌象是

- A. 汗出肤冷，倦卧不语，脉虚和缓
- B. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉弦而数
- C. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉象急数
- D. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉虚而缓
- E. 汗出肤冷，倦卧不语，脉象细数

103. 战汗后邪退气虚正安的主要表现为

104. 战汗后气脱的主要表现为

- A. 热扰心神
- B. 痰热扰心
- C. 心气不足
- D. 脏气衰微
- E. 宗气大虚

105. 导致自言自语，见人便止，首尾不续的病因是

106. 导致语言时有错乱，语后自知言错的病因是

- A. 心肾不交
- B. 胆郁痰扰
- C. 心脾两虚
- D. 心阳亏虚
- E. 心脉痹阻

107. 睡眠时时惊醒，不易安卧多见于

108. 不易入睡，甚至彻夜不眠，兼心烦不寐多见于

- A. 证候相兼
- B. 虚实真假
- C. 寒热真假
- D. 证候错杂
- E. 证候转化

109. 麻疹麻毒外透属于

110. 寒包火证属于
- 妊娠恶阻，胎动不安证
 - 妊娠胎漏下血，胎动欲坠
 - 妊娠胎热，胎动不安证
 - 妊娠肝肾亏虚，胎动不安证
 - 妊娠脾虚气弱，胎动不安证
111. 白术的主治病证是
112. 桑寄生的主治病证是
- 开窍醒神，活血通经，消肿止痛
 - 开窍醒神，清热止痛
 - 开窍醒神，清心化痰
 - 开窍醒神，化湿和胃，宁神益智
 - 开窍醒神，辟秽止痛
113. 苏合香的功效是
114. 冰片的功效是
- 金樱子
 - 覆盆子
 - 桑螵蛸
 - 鸡内金
 - 海螵蛸
115. 既能固精止带，又能收敛止血的药物是
116. 既能固精缩尿，又能涩肠止泻的药物是
- 既能收敛固涩，又能补肾宁心
 - 既能敛肺止咳，又能生津安蛔
 - 既能敛肺止咳，又能固精缩尿
 - 既能敛肺止咳，又能收敛止血
 - 既能敛肺止咳，又能利咽开音
117. 五味子的功效是
118. 诃子的功效是
- 太子参
 - 白术
 - 山药
 - 人参
 - 甘草
119. 治疗脾虚水肿宜选用的药物是
120. 治疗心气虚、脉结代，宜选用的药物是
- 宣畅气机，清利湿热
 - 清热化湿，理气和中
 - 清热泻火，利水通淋
 - 利湿化浊，清热解毒
 - 利水渗湿，温阳化气
121. 八正散的功用
122. 三仁汤的功用
- 玉液汤
 - 炙甘草汤
 - 麦门冬汤
 - 养阴清肺汤
 - 清燥救肺汤
121. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用
122. 治疗气阴两亏之肺痿，宜用
- 大黄、芒硝、赤芍
 - 桃仁、丹皮、芒硝
 - 大黄、桃仁、甘草
 - 赤芍、丹皮、甘草
 - 大黄、赤芍、丹皮
123. 大黄牡丹汤的组成中含有药物是
124. 桃核承气汤的组成中含有药物是
- 归脾汤
 - 酸枣仁汤
 - 朱砂安神丸
 - 甘麦大枣汤
 - 天王补心丹
125. 心脾两虚，气血不足而心悸怔忡者，治宜选用
126. 心肾两虚，阴亏血少而心悸怔忡者，治宜选用
- 安神定惊，化痰开窍
 - 化浊开窍，清热解毒
 - 辟秽解毒，化痰开窍
 - 清热解毒，开窍醒神
 - 清热解毒，开窍安神
127. 安宫牛黄丸的功用是
128. 至宝丹的功用是
- 结核病
 - 急性喉炎
 - 疟疾
 - 败血症
 - 伤寒
129. 稽留热可见于
130. 弛张热可见于
- 白血病
 - 传染性单核细胞增多症
 - 急性胆囊炎
 - 钩端螺旋体病
 - 流行性感冒

131. 发热伴寒战常见于
132. 发热伴结膜充血常见于
- A. 高血压脑病
- B. 有机磷中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 脑外伤
- E. 尿毒症
133. 意识障碍伴发热见于
134. 意识障碍伴高血压见于
- A. 水肿
- B. 甲状腺肿
- C. 反甲
- D. 爪形手
- E. 梭状关节
135. 类风湿性关节炎时出现
136. 贫血时出现
- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足
137. 足三阳经的循行走向规律是
138. 手三阴的循行走向规律是
- A. 下腕
- B. 建里
- C. 中极
- D. 上腕
- E. 关元
139. 位于前正中线上，脐上 3 寸的腧穴是
140. 位于前正中线上，脐上 5 寸的腧穴是
- A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长
- B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短
- C. 病人吸气时进针，呼气时出针
- D. 出针时摇大针孔而不按压
- E. 出针后迅速按压针孔
141. 属于提插补法操作的是
142. 属于开阖补法操作的是
- A. 手太阴、手太阳经穴
- B. 手太阴、足太阴经穴
- C. 手太阴、手阳明经穴
- D. 手太阴、足太阳经穴
- E. 手太阴、手少阳经穴
143. 外感咳嗽，宜选用
144. 内伤咳嗽，宜选用
- A. 陷下则灸之
- B. 热则疾之
- C. 寒则留之
- D. 标本同治
- E. 三因制宜
145. 以上哪项属于补虚泻实的治疗原则
146. 以上哪项属于治病求本的治疗原则
- A. 瘰疬、初起的肿疡
- B. 哮喘、肺癆、瘰疬
- C. 吐泻并作、中风脱证
- D. 因寒而致的呕吐、腹痛
- E. 命门火衰而致的阳痿、早泄
147. 隔蒜灸的适应病证是
148. 隔姜灸的适应病证是
- A. 要有急病人所急的紧迫感
- B. 要有敢担风险团结协作的使命感
- C. 要有深厚的同情感
- D. 抢救前了解诊疗经过
- E. 要有经济头脑，保证少花钱多办事
149. 在抢救危重病人时，保证抢救成功的前提条件是
150. 不属于抢救危重病人时优先考虑的是

第二单元

第二单元

一、A1 型选择题 (1~60 题)

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪项不是时行感冒的特征

- A. 传染性大
- B. 病情较重
- C. 发病急
- D. 易于流行
- E. 不传变

2. 咳嗽初起，忌用

- A. 黄芩、冬花

- B. 沙参、麦冬
C. 双花、连翘
D. 诃子、五味子
E. 半夏、陈皮
3. 哮病的宿根
A. 寒
B. 热
C. 痰
D. 气
E. 火
4. 喘咳气急，胸部胀闷，不得卧，痰稀白量多，恶寒发热，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。其治疗应首选
A. 麻黄汤
B. 木防己汤
C. 苓桂术甘汤
D. 越婢加半夏汤
E. 葶苈大枣泻肺汤
5. 《千金》苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合
A. 肺痈
B. 肺痿
C. 肺胀
D. 肺消
E. 肺癆
6. 肺癆虚火灼肺，咳血较著者，在辨证方中宜加入
A. 当归、三七
B. 泽兰、红花
C. 黑山栀、紫珠草
D. 冬虫夏草、蛤蚧
E. 木蝴蝶、诃子
7. 小青龙汤治疗肺胀哪一型
A. 外寒内饮
B. 痰热郁肺
C. 痰蒙神窍
D. 肺肾气虚
E. 阳虚水泛
8. 下列关于肺痿治疗的各项叙述中，错误的是
A. 重视调理肝肾
B. 以补肺生津为原则
C. 不可妄投燥热，以免助火伤津
D. 忌苦寒滋腻碍胃
E. 慎用祛痰峻剂
9. 下列哪项不是惊悸与怔忡的鉴别要点
A. 致病多由外因或内因引起
B. 诱因常与惊恐、恼怒或劳累有关
C. 全身情况较好或较差
D. 病性属实或属虚
E. 病位在肝或在心
10. 胸痹心痛发作时，疼痛可以放射到
A. 右胸
B. 肩背
C. 左肋下
D. 右肋下
E. 背正中
11. 不寐的辨证，应首辨的要点是
A. 寒热
B. 久暂
C. 病位
D. 虚实
E. 标本
12. 下列哪项不是外感头痛的特征
A. 灼痛
B. 掣痛
C. 重痛
D. 胀痛
E. 空痛
13. 眩晕的病变脏腑为
A. 心、肝、肾
B. 肺、脾、肾
C. 肝、脾、肾
D. 心、肺、脾
E. 心、肝、肺
14. 补阳还五汤适用于中风何证型

- A. 气血亏虚
- B. 肝肾阴虚
- C. 气虚络瘀
- D. 风痰阻络
- E. 肾虚精亏

15. 下列各项中不属劳伤虚损的是

- A. 过度劳力
- B. 食伤
- C. 过度劳神
- D. 妇女生育过多
- E. 房事过度

16. 阳证的皮肤颜色主要是

- A. 红赤
- B. 晦暗
- C. 青紫
- D. 苍白
- E. 皮色不变

17. 痒的常见病因是

- A. 风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚
- B. 风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚
- C. 风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚
- D. 风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚
- E. 风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜

18. 具有腐蚀性的膏药是

- A. 千捶膏
- B. 太乙膏
- C. 咬头膏
- D. 阳和解凝膏
- E. 红油膏

19. 以下哪一项为淋病临床特点

- A. 龟头红肿，包皮内有多量脓性分泌物
- B. 外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿
- C. 尿道分泌物少，为黏液状
- D. 尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物
- E. 外生殖器多为单个无痛性溃疡

20. 白秃疮的西医病名是

- A. 黄癣

- B. 白癣
- C. 手癣
- D. 脚癣
- E. 股癣

21. 下列哪项不属于月经病的临床表现

- A. 月经周期缩短，不及 20 天
- B. 月经周期正常，经量明显增多
- C. 月经 40~60 天一行，或 3~5 个月一行
- D. 行经期不足 2 天或超过 7 天以上
- E. 月经常每两月来潮一次，无不适

22. 半夏白术天麻汤用于治疗经行头痛的证型为

- A. 血瘀证
- B. 肝火证
- C. 痰火上扰证
- D. 痰湿中阻证
- E. 肝阳上亢证

23. 经行泄泻主要责之于

- A. 肝脾虚弱
- B. 脾胃虚弱
- C. 脾肾虚弱
- D. 肝胃虚弱
- E. 肝肾虚弱

24. 下列各项，属产后三病的是

- A. 产后血晕、产后发热、产后腹痛
- B. 产后痉病、产后大便难、产后郁冒
- C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛
- D. 产后呕吐、泄泻、盗汗
- E. 产后冲心、冲肺、冲胃

25. 痛经气滞血瘀证的腹痛特点是

- A. 冷痛拒按
- B. 灼痛不适
- C. 隐隐作痛
- D. 胀痛拒按
- E. 绵绵作痛

26. 经行乳房胀痛胃虚痰滞证治法为

- A. 健胃祛痰，和胃通络

- B. 健胃祛痰，活血止痛
C. 燥湿化痰，和胃通络
D. 理气化痰，化瘀止痛
E. 养胃益阴，活血止痛
27. 胎儿期易发生先天畸形的是
A. 妊娠早期 4 周
B. 妊娠早期 12 周
C. 妊娠中期 10 周
D. 妊娠中期 15 周
E. 妊娠晚期 13 周
28. 小儿易产生感冒、咳喘，原因主要是
A. 脾常不足
B. 肺脏娇嫩
C. 肾常虚
D. 稚阳未充
E. 稚阴未长
29. 新生儿中药用量应为成人量的
A. 1 / 6
B. 1 / 3
C. 1 / 2
D. 2 / 3
E. 等量
30. 前囟关闭的时间为出生后
A. 2~4 个月
B. 4~6 个月
C. 6~12 个月
D. 12~18 个月
E. 18~24 个月
31. 下列属于病理性黄疸的是
A. 生后 24h 以内出现黄疸
B. 生后第 2~3 日出现黄疸，第 4~6 日达高峰
C. 足月儿在生后 2 周消退，早产儿可延迟至 3~4 周消退
D. 足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol} / \text{L}$
E. 小儿一般情况良好，除偶有轻微食欲不振外，不伴有其他临床症状
32. 反复呼吸道感染，营卫失调证的主治方
A. 桂枝汤
B. 麻黄汤
C. 小青龙汤
D. 黄芪桂枝五物汤
E. 玉屏风散
33. 对肺炎链球菌肺炎诊断价值大的是
A. 起病急，有寒战、高热、胸痛、咳嗽
B. 血白细胞总数升高
C. 痰涂片或培养有肺炎球菌
D. 局部出现明显的湿啰音
E. X 线检查呈肺叶分布的密度均匀影
34. COPD 急性加重期的重要治疗措施是
A. 止咳、祛痰
B. 解痉、平喘
C. 控制感染
D. 避免及减少各种诱因
E. 抗过敏
35. 二尖瓣关闭不全的体征，说法不正确的是
A. 心尖搏动增强呈抬举性
B. 偶可触及收缩期震颤
C. 心浊音界向左下扩大
D. 心尖区可闻及吹风样杂音
E. 心浊音界向左扩大，心腰消失而呈梨形心
36. 心绞痛发作的典型部位是
A. 胸骨下段后
B. 剑突下
C. 胸骨上中段之后
D. 心尖部
E. 心前区向颈咽部放射
37. 查体闻及“大炮音”，患者最可能发生的心律失常是
A. 二度房室传导阻滞
B. 三度房室传导阻滞
C. 窦房传导阻滞
D. 窦性停搏
E. 一度房室传导阻滞

38. 心绞痛发作时心电图 ST 段抬高可能是
- 变异型心绞痛
 - 卧位型心绞痛
 - 劳累性心绞痛
 - 稳定型心绞痛
 - 恶化型心绞痛
39. 支气管哮喘的典型表现主要是
- 先兆症状后出现吸气困难
 - 发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
 - 伴哮鸣音的混合性呼吸困难
 - 伴哮鸣音的呼吸困难，粉红色泡沫痰
 - 哮喘发作 24 小时以上，伴咯血
40. 肝硬化最常见的并发症是
- 自发性腹膜炎
 - 肝肺综合征
 - 急性上消化道出血
 - 肝性脑病
 - 肝肾综合征
41. 不属溃疡性结肠炎主要临床表现的是
- 里急后重
 - 腹部包块
 - 腹痛
 - 腹泻
 - 黏液脓血便
43. 流感的症状最主要的是
- 全身中毒症状
 - 发热
 - 呼吸道症状
 - 消化道症状
 - 循环系统症状
44. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期
- 潜伏期
 - 初期
 - 极期
 - 缓解期
 - 恢复期
45. 慢性乙型肝炎的治疗关键是
- 休息
 - 保肝
 - 降酶
 - 抗病毒
 - 调节免疫
46. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期
- 潜伏期
 - 初期
 - 极期
 - 缓解期
 - 恢复期
47. 有关隔离的描述，错误的是
- 是控制传染病流行的重要措施
 - 便于管理传染源
 - 可防止病原体向外扩散给他人
 - 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
 - 某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察
48. 《中华人民共和国药品管理法》规定的药品是指用于
- 防病、治病的特殊商品
 - 预防、治疗人的疾病的物质
 - 预防、诊断人的疾病的物质
 - 预防、治疗、诊断人的疾病的物质
 - 预防、治疗、诊断人及动物疾病的物质
49. 下列各项中，在整个卫生法律体系中享有最高法律效力的规范性文件是
- 《中华人民共和国刑法》
 - 《中华人民共和国宪法》
 - 《中华人民共和国民法通则》
 - 《中华人民共和国食品安全法》
 - 以上均不是
50. 下列关于卫生民事责任的特征叙述错误的是
- 主要是财产责任
 - 是补偿当事人的损失

- C. 是一方当事人对另一方的责任
- D. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系
- E. 在法律允许的条件下，民事责任可以由当事人协商解决

二、A2 型选择题 (61~102 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

51. 一患者男性，久居岭南，寒战，壮热，发作时热多寒少，汗出不畅，头痛，骨节酸痛，口渴引饮，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数。

治法宜

- A. 解毒除瘴，芳化湿浊
- B. 祛邪截疟，和解表里
- C. 清热解表，和解祛邪
- D. 和解表里，温阳达邪
- E. 解毒除瘴，清热保津

52. 患者因皮肤疮痍破溃而引发水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，恶风发热，咽红，舌红苔薄黄，脉滑数。治疗应首选

- A. 越婢加术汤合桑白皮汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C. 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散
- D. 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤
- E. 实脾饮合五味消毒饮

53. 患者小便热涩疼痛，尿色深红，或夹有血块。应首先考虑的是

- A. 热淋
- B. 石淋
- C. 气淋
- D. 血淋
- E. 劳淋

54. 患者男性，65 岁，排尿不畅 3 年，加重 1 个月，小便点滴而出，小腹胀痛，腰膝酸痛，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白，脉沉细无力，应诊为

- A. 淋证
- B. 关格

- C. 少尿
- D. 腰痛
- E. 癃闭

55. 患者精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，时时欠伸，舌淡苔薄白，脉弦细。其治法是

- A. 益气养血
- B. 补肾宁心
- C. 养心安神
- D. 解郁化痰
- E. 疏肝解郁

56. 患者男，65 岁，患痰饮病，症见喘促，动则尤甚，气短，咳而痰多，食少胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，小便不利，足跗浮肿，舌体胖大，质淡，苔白润，脉沉细而滑，辨证应属

- A. 支饮寒饮伏肺证
- B. 溢饮表寒里饮证
- C. 痰饮脾阳虚弱证
- D. 支饮脾肾阳虚证
- E. 悬饮饮停胸胁证

57. 患者烦渴多饮半月余，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红，苔黄，脉洪数有力。治则宜用

- A. 清热润肺，生津止渴
- B. 养阴润肺，生津止渴
- C. 清胃泻火，养阴保津
- D. 滋阴固肾，生津止渴
- E. 滋养胃阴，生津止渴

58. 患者午后或夜间发热，自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不欲多饮，肢体疼痛，面色萎黄，舌有瘀点，脉弦。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

59. 患者午后或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，

舌质红，苔少，脉细数。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

60. 患者大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则汗出短气，便后疲乏，面色苍白，舌淡嫩苔薄，脉虚。其治法是

- A. 补脾和胃
- B. 温阳通便
- C. 益气补肺
- D. 温中健脾
- E. 益气润肠

61. 某患者，肢体关节疼痛较剧，部位固定，遇寒痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，舌质淡，苔薄白，脉弦紧，治疗方剂宜选

- A. 防风汤
- B. 双合汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 乌头汤
- E. 宣痹汤

62. 患者肢体关节酸楚，重着，疼痛，关节活动不利，麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选

- A. 独活寄生汤
- B. 蠲痹汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 乌头汤
- E. 白虎加桂枝汤

63. 李某，女性，75岁。头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂是

- A. 地黄饮子
- B. 黄连温胆汤
- C. 龟鹿二仙膏合大定风珠
- D. 导痰汤合羚角钩藤汤
- E. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减

64. 腰痛患者，腰部冷痛重着，转侧不利，静卧痛不减，遇阴雨天疼痛加重，舌苔白腻，脉沉缓。其证候是

- A. 寒湿腰痛
- B. 风寒腰痛
- C. 瘀血腰痛
- D. 湿热腰痛
- E. 肾虚腰痛

65. 患者一侧臀部结块，肿胀疼痛，皮肤灼热，红肿以中心为著，边界不清，步行困难，身热头痛，病前有局部肌肉注射史。应诊断为

- A. 丹毒
- B. 流注
- C. 臀疔
- D. 环跳疽
- E. 附骨疽

66. 患者女性，26岁，产后第三周出现恶寒发热，右乳肿胀疼痛，体温38.7℃，检查见右乳红肿，无波动感，口渴，舌红，苔薄黄，脉数。此时的治疗方法是

- A. 切开引流
- B. 疏肝理气，化痰散结
- C. 疏肝清胃，通乳消肿
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 泻火解毒利湿

67. 患者白疮初起，皮损遍身，多呈点滴状，颜色鲜红，层层银屑，瘙痒剧烈，抓之有点状出血，伴口干舌燥，便干溲黄，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。证属

- A. 火毒炽盛证
- B. 湿毒蕴阻证
- C. 气血瘀滞证
- D. 血热内蕴证
- E. 以上均不是

- A. 八珍汤
- B. 大补阴丸
- C. 通窍活血汤
- D. 六味地黄汤
- E. 七宝美髯丹

68. E

69. 患者，女性，40岁。无意中发现背部肿块，无自觉症状，查：局部皮色不变，肿块触之柔软，呈分叶状，推之可移动，无压痛。该患者最可能的诊断是

- A. 痈
- B. 背疽
- C. 血瘤
- D. 脂瘤
- E. 肉瘤

70. 患者肛旁肿痛1周，近3天加重，伴发热恶寒，坐卧不宁。检查肛门左侧饱满，高于右侧，压痛明显，有波动感，最可能的诊断是

- A. 直肠后间隙脓肿
- B. 骨盆直肠间隙脓肿
- C. 肛门旁皮下脓肿
- D. 坐骨直肠间隙脓肿
- E. 坐骨直肠间隙脓肿传向肛提肌

71. 患者，男，38岁。患急性子痈2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系（精索），舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选

- A. 透脓散
- B. 滋阴除湿汤
- C. 萆薢化毒汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 枸橘汤加减

72. 患者，女，26岁。多次发生经间期出血，此次阴道出血量稍多，色深红，质粘腻，无血块，平素带下量多色黄，时现异味，小腹隐痛，神疲乏力，胸闷烦躁，纳呆腹胀，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数辨属何证

- A. 脾虚证
- B. 血瘀证
- C. 肝郁证
- D. 血热证
- E. 湿热证

73. 患者经行量多，色淡红，质清稀，神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色㿔白，舌淡，苔薄，脉细弱。最佳治法为

- A. 益气清热，固冲止血
- B. 清热凉血，固冲止血
- C. 养阴清热止血
- D. 活血化瘀止血
- E. 补气摄血固冲

74. 一孕妇，孕6月余，小便频数，艰涩刺痛，尿少色黄，伴面赤心烦，喜冷饮，舌上溃疡，舌红欠润，少苔，脉细数，治疗首选

- A. 五苓散
- B. 导赤散
- C. 保阴煎
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 知柏地黄丸

75. 某患者停经50天，阴道少量出血3天；伴小腹隐痛，腰酸，恶心，纳差；舌淡红，苔白，脉细滑；妊娠试验阳性。应诊断为

- A. 胎漏
- B. 胎动不安
- C. 胎死不下
- D. 胎堕难留
- E. 激经

76. 患者，女，25岁，自诉3天来带下量多，赤白相兼，质黏腻，臭秽难闻，小腹疼痛，腰酸酸痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄，脉滑数。治疗首选方

- A. 五味消毒饮
- B. 完带汤
- C. 易黄汤
- D. 知柏地黄丸
- E. 止带方

77. 一产妇分娩数日后，肢体关节疼痛，屈伸不利或痛无定处或冷痛剧烈，宛如针刺，得热则舒，伴恶寒怕风，脉濡细。最佳选方是

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 独活寄生汤
- C. 生化汤

D. 身痛逐瘀汤

E. 养荣壮肾汤

78. 某妇人月经错后，经血量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟。应选方

A. 生化汤

B. 《金匱》温经

汤 C. 《良方》温

经汤 D. 乌药汤

E. 大补元煎

79. 患儿，2岁。发热3~4天出疹，疹形细小，状如麻粒，口腔黏膜出现“麻疹黏膜斑”者，为

A. 口疮

B. 鹅口疮

C. 麻疹

D. 疔腮

E. 发颐

80. 患儿，出生32天。症见面目皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神萎靡，四肢欠温，纳呆，大便溏薄色灰白，小便短少，舌质淡，苔白腻。其证候是

A. 寒湿阻滞

B. 气滞血瘀

C. 湿热郁蒸

D. 胎黄动风

E. 胎黄虚脱

81. 患儿，3岁。平素反复外感。面白少华，形体消瘦，肌肉松软，鸡胸龟背，腰膝酸软，形寒肢冷，发育落后，动则气喘，少气懒言，多汗易汗，食少纳呆，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。其治法是

A. 调和营卫，益气固表

B. 温补肾阳，健脾益气

C. 养阴润肺，益气健脾

D. 补肺固表，健脾益气

E. 健脾益气，养阴益胃

82. 患儿，5岁。咳嗽喘促半天。证见气喘，喉间哮鸣，咳嗽，胸闷，痰稀色白有泡沫，喷嚏鼻塞，流清涕，唇青，形寒肢凉，无汗，口不渴，小便清长，大便溏薄，咽不红，舌

质淡红，苔薄白，脉浮紧，指纹红。其治法是

A. 温肺散寒，涤痰定喘

B. 清肺涤痰，止咳平喘

C. 解表清里，定喘止咳

D. 泻肺补肾，标本兼顾

E. 健脾温肾，固摄纳气

83. 患儿，7岁。反复咳嗽喘促3年余。证见咳嗽喘促，动则喘甚，胸闷气短，面色欠华，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白，脉细弱。治疗首选方

A. 苏葶九

B. 华盖散

C. 苏子降气汤

D. 小青龙汤

E. 金匱肾气丸

84. 痫证患儿，发作时突然仆倒，神志不清，颈项及全身强直，继而四肢抽搐，两目上视，牙关紧闭，口吐白沫，口唇及面部色青，舌苔白，脉弦滑。治疗应首选方剂是

A. 定痫丸

B. 远志丸

C. 定魄丸

D. 镇惊丸

E. 涤痰汤

85. 患儿，7岁，面红耳赤，烦躁易怒，皱眉眨眼，张口歪嘴，摇头耸肩，发作频繁，抽动有力，日出异声秽语，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。应诊断为

A. 惊风

B. 癫痫

C. 抽动障碍

D. 注意力缺陷多动症

E. 痉挛症

86. 张某，60岁，干咳、胸痛、发热、消瘦1个月，经检查诊断为小细胞肺癌，其治疗首选

A. 化疗

B. 手术治疗

C. 放射治疗

D. 干扰素

E. 集落刺激因子

87. 女性, 26 岁, 支气管哮喘病史 13 年, 今晨上班途中因吸入汽车尾气突然发作, 以喘憋、呼吸困难为主, 伴心悸、乏力, 遂急诊, 为控制发作应首选的药物是

- A. 沙丁胺醇气雾剂
- B. 溴化异丙托品气雾剂
- C. 泼尼松口服
- D. 色甘酸钠 E. 茶碱缓释片

88. 男性, 37 岁, 十二指肠溃疡病史 6 年余, 近日劳累后频发上腹疼痛, 食欲不振, 乏力, 2 小时前突感恶心, 随后呕吐暗红色血性液体, 量较大而急诊, 应立即应用的止血药物是

- A. 止血环酸 B. 垂体后叶素
- C. 安络血
- D. 奥美拉唑 E. 血小板悬液

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 联合瓣膜病变
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

- A. 高血压性动脉硬化
- B. 血液病
- C. 动脉瘤
- D. 脑血管畸形
- E. 脑动脉炎

91. 患者胃溃疡病史 12 年, 因上腹痛、呕吐、消瘦就诊, 经胃镜检查确诊为进展期胃癌, 治疗最好的方法是

- A. 免疫疗法
- B. 放射治疗
- C. 手术治疗
- D. 内镜下治疗
- E. 化疗

92. 患者十二指肠溃疡病史 7 年, 饮酒后突发上腹剧痛, 查体呈板状腹, 拟诊为急性穿孔, 确诊最重要的检查是

- A. 粪便隐血试验
- B. 腹腔穿刺
- C. 腹部 X 线透视
- D. 钡餐透视

- E. 血常规
- A. 动脉粥样硬化
- B. 细菌性血管炎
- C. 心脏病
- D. 糖尿病
- E. 高血压病

94. 患者王某, 因水肿、高血压、蛋白尿就诊, 经查拟诊为慢性肾炎, 需与慢性肾盂肾炎鉴别, 需要做何检查

- A. 肾功能检测
- B. 静脉肾盂造影
- C. 尿细菌培养

三、A3 型选择题 (103~120 题)

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。95. 该病病机分析是

- A. 气血亏损, 心虚胆怯, 心神失养
- B. 心血亏耗, 心失所养, 心神不宁
- C. 脾肾阳虚, 水饮内停, 上凌于心, 扰乱心神
- D. 心阳虚衰, 无以温养心神
- E. 肝肾阴虚, 水不济火, 心火内动, 扰动心神

96. 该病选方为

- A. 炙甘草汤
- B. 桃仁红花煎
- C. 安神定志丸
- D. 苓桂术甘汤
- E. 归脾汤

97. 若热病后期损及心阴而心悸者, 以

- A. 生脉散
- B. 炙甘草汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 苓桂术甘汤
- C. 清胃泄热, 降逆止呃
- D. 顺气解郁, 和胃降逆
- E. 养胃生津, 降逆止呃

100. 若呃声难续, 气短乏力, 中气大亏者, 可改用

- A. 参苓白术散

- B. 理中丸
C. 生脉散
D. 人参养荣汤
E. 补中益气汤
101. 其病证候是
A. 风燥伤肺证
B. 痰热伤肺证
C. 肝火犯肺证
D. 风寒袭肺证
E. 风热犯肺证
102. 其治法是
A. 疏风清肺, 润燥止咳
B. 疏风散寒, 宣肺止咳
C. 疏风清热, 宣肺止咳
D. 清肺泻肝, 顺气降火
E. 清热肃肺, 豁痰止咳
103. 治疗应首选
A. 三拗汤合止嗽散加减
B. 黛蛤散合黄芩泻白散加减
C. 桑杏汤加减
D. 清金化痰汤加减
E. 桑菊饮加减
104. 根据题干分析, 该证型首选方剂是
A. 复方大柴胡汤
B. 阑尾化瘀汤
C. 藿香正气散加减
D. 大承气汤加减
E. 大黄牡丹汤合红藤煎
105. 根据题目分析, 其治则是
A. 行气活血, 通腑泄热
B. 通腑泻热, 利湿透脓
C. 通腑排脓, 养阴清热
D. 温阳散寒, 活血通络
E. 清热利湿, 解毒活血
106. 根据题干分析, 关于该病的外治法说法正确的是
A. 无论脓已成或未成, 均可选用金黄散、玉露散或双柏散
B. 脓已未成者可选用冲和膏、红灵丹油膏外敷
C. 早期直接采取手术治疗
D. 用6%~8%的明矾溶液入直肠黏膜下层
E. 以上说法均属于正确
107. 其证是
A. 寒凝血瘀证
B. 阳虚内寒证
C. 脾肾阳虚证
D. 气血虚弱证
E. 肾气亏损证
108. 其治法是
A. 理气行滞, 化瘀止痛
B. 温经散寒, 化瘀止痛
C. 益气养血, 调经止痛
D. 温经扶阳, 暖宫止痛
E. 补肾益精, 养血止痛
109. 治疗应选的方剂是
A. 温经汤(《金匮要略》)
B. 艾附暖宫丸
C. 温经汤(《妇人大全良方》)
D. 少腹逐瘀汤
E. 膈下逐瘀汤
110. 其治法是
A. 补益气血, 佐以运脾
B. 养血柔肝, 活血化瘀
C. 滋阴生津, 养血安神
D. 健脾温阳, 利水消肿
E. 调脾健运, 开胃进食
111. 其选方是
A. 防己黄芪汤合五苓散
B. 黄芪桂枝五物汤合真武汤
C. 五皮饮合胃苓汤
D. 实脾饮合五苓散
E. 麻黄连翘赤小豆汤
112. 根据材料分析, 判断该患儿的生长发育状况
A. 体重正常, 身高正常
B. 体重偏低, 身高偏低
C. 体重偏低, 身高正常
D. 体重偏高, 身高偏低
E. 体重偏低, 身高偏高
- A. 肺部感染
B. 呼吸衰竭
C. 肺性脑病
D. 支气管哮喘
E. 慢性支气管炎
114. 目前的治疗, 哪项措施欠妥
A. 吸氧
B. 氨茶碱

- C. 抗菌药物
D. 呼吸机治疗
E. 氨溴索
115. 此患者的诊断为
- A. 二尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
B. 二尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭
C. 二尖瓣狭窄、房颤、左心衰竭
D. 三尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
E. 三尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭
116. 治疗应首选
- A. 口服地高辛
B. 静注西地兰
C. 肌注呋塞米
D. 皮下注射吗啡
E. 静注普萘洛尔
117. 根据以上资料，最有可能的诊断是
- A. 克隆病
B. 溃疡性结肠炎
C. 结肠癌
D. 慢性细菌性痢疾
E. 慢性阿米巴痢疾
118. 为明确诊断，最有价值的诊断方法是
- A. 临床症状及体征
B. 大便常规与培养
C. X 线钡剂灌肠
D. 结肠镜检查
E. 血清免疫球蛋白测定

四、B1 型选择题（119~150 题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 病起发热，皮肤干燥，咳呛少痰
B. 肢体困重，手足麻木，喜凉恶热
C. 神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言
D. 腰膝酸软，眩晕耳鸣，舌咽干燥
E. 手足麻木不仁，四肢青筋显露，舌痿不能伸缩

119. 痿证之湿热浸淫证症见
120. 痿证之脉络瘀阻证症见
- A. 玉屏风散
B. 补中益气汤
C. 再造散
D. 桂枝汤
E. 加减葳蕤汤
121. 气虚感冒的代表方宜首选
122. 阳虚感冒的代表方宜首选
- A. 二陈汤合三子养亲汤
B. 清金化痰汤
C. 桑杏汤
D. 黛蛤散合黄芩泻白散
E. 三拗汤合止嗽散
123. 治疗肝火犯肺型咳嗽的代表方剂是
124. 治疗痰湿蕴肺型咳嗽的代表方剂是
- A. 千金苇茎汤合如金解毒散
B. 银翘散
C. 葶苈大枣泻肺汤
D. 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎
E. 加味桔梗汤
125. 肺痈初期应选
126. 肺痈成痈期应选
- A. 内发丹毒
B. 赤游风
C. 流火
D. 抱头火丹
E. 类丹毒
127. 患者躯干部皮肤突然发红成片，色如丹涂的急性感染性疾病称
128. 患者头面部皮肤突然发红成片，色如涂丹的急性感染性疾病称
- A. 脓疱疮
B. 疥疮
C. 蛇串疮
D. 湿疮
E. 以上均不是
129. 侧腰部皮肤有成簇状的丘疱疹，呈带状分布，疼痛剧烈。应诊断为
130. 皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，易转为慢性。诊断为

- A. 痛经
B. 带下过少
C. 胎动不安
D. 子晕
E. 滑胎
131. 肝气郁结，血为气滞，冲任不畅，可发生
132. 肝阴不足，肝阳偏亢，可发生
- A. 异位妊娠已破损稳定型
B. 异位妊娠已破损休克型
C. 异位妊娠已破损不稳定型
D. 异位妊娠已破损包块型
E. 异位妊娠已破损腑实证
133. 哪种类型首选宫外孕 I 号方
134. 哪种类型首选宫外孕 II 号方
- A. 脾
B. 肝
C. 肺
D. 大肠
E. 肾
135. 感冒夹滞的病位在肺和
136. 感冒夹惊的病位在肺和
- A. 黄芪桂枝五物汤
B. 生脉散
C. 玉屏风散合牡蛎散
D. 清营汤
E. 桂枝汤
137. 治疗肺卫不固型汗证的首选方为
138. 治疗营卫失调型汗证的首选方为
- A. 虚证
B. 实证
C. 寒证
D. 热证
E. 虚实夹杂证
139. 紫癜起病急，病程短，紫癜颜色鲜明者辨证属
140. 紫癜起病缓，病程长，紫癜颜色暗淡者辨证属
- A. 铁锈色痰
B. 粉红色乳样或脓性痰
C. 大量脓臭痰
D. 粉红色泡沫痰
E. 红棕色胶冻样痰
141. 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是
142. 急性肺脓肿的典型痰液是
- A. 下垂性压陷性水肿
B. 脾肿大
C. 劳力性呼吸困难
D. 咳嗽、咳痰
E. 咯血
143. 左心衰竭时最早出现的症状是
144. 右心衰竭时典型的体征是
- A. 超声波
B. 洗手
C. 碘类消毒
D. 电离辐射
E. 紫外线
145. 属高效消毒法的是
146. 属灭菌法的是
- A. 新药
B. 麻醉药
C. 进口药
D. 处方药
E. 非处方药
147. 必须持有医师开具的处方才能进行销售、调剂和使用的药品是
148. 消费者可根据自行判断并进行购买和使用的药品是
- A. 以人为本，践行宗旨
B. 遵纪守法，依法执业
C. 尊重患者，关爱生命
D. 廉洁自律，恪守医德
E. 优质服务，医患和谐
149. 弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物所属的行为规范范畴是
150. 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨，以病人为中心，全心全意为人民健康服务所属的行为规范范畴是