

主管备考测评第二天

答案与解析（内 2）

1、答案：B

解析：肺炎球菌肺炎治疗首选青霉素 G，80 万 U 肌内注射，每 4~6 小时一次，热退后继续用药 3 天，一般疗程 7~10 天。

2、答案：A

解析：肺炎链球菌肺炎患者起病急骤，有寒战、高热呈稽留热、胸痛、呼吸困难、咳嗽、咳痰。一般初为刺激性干咳，咳少量黏液痰，典型者痰液可呈铁锈色。

3、答案：A

解析：肺炎球菌肺炎治疗首选青霉素 G，80 万 U 肌内注射，每 4~6 小时一次，热退后继续用药 3 天，一般疗程 7~10 天。

4、答案：C

解析：“干性支气管扩张”病人仅表现为反复咯血，平时无咳嗽、脓痰等呼吸道症状。

5、答案：B

解析：右心衰竭体征：可有发绀、颈静脉怒张，肝-颈静脉回流征阳性，肝大和压痛，心率快，可出现心律失常，剑突下可闻收缩期杂音。下肢乃至全身水肿，甚至可有腹水。

6、答案：C

解析：维持呼吸道通畅，纠正缺氧和二氧化碳的潴留，给予持续低流量、低浓度氧。

7、答案：D

解析：慢性肺心病病人一般经积极抗感染，改善呼吸功能后，心衰便可缓解，无效者，可适当应用利尿剂，但需避免大量利尿引起血液浓缩、痰液黏稠，加重气道阻塞及低血钾症。肺心病使用利尿剂是以缓慢、小量、间歇为原则。当感染控制和呼吸功能改善后，心衰控制仍不满意时可加用强心药。最佳答案 D。

8、答案：E

解析：肺、心功能失代偿期：多由于急性呼吸道感染而使上述症状加重，并相继出现呼吸衰竭和（或）心力衰竭，以右心衰竭为主。

9、答案：A

解析：常用短效 β_2 受体激动剂有沙丁胺醇、特布他林和非诺特罗，作用时间约为 4~6 小时。长效 β_2 受体激动剂有丙卡特罗、沙美特罗和福莫特罗，作用时间约为 12~24 小时。

10、答案：E

解析：色甘酸钠：通过抑制炎症细胞，预防变应原引起速发和迟发反应，对预防运动和过敏原诱发的哮喘最有效。

11、答案：B

解析：临床上根据咳嗽、咳痰或伴喘息，每年发病持续3个月，连续2年或以上，并排除其他心肺疾患（如肺结核、肺尘埃沉着症、支气管哮喘、支气管扩张、心功能不全等）者，可做出慢性支气管炎的诊断。如每年发病持续<3个月，而有明显的X线检查、呼吸功能异常等客观依据者，也可诊断。

12、答案：B

解析：慢性支气管炎急性发作期治疗以控制感染为主，适当应用祛痰、镇咳、解痉和平喘药物。

13、答案：E

解析：喘息型慢性支气管炎合理使用支气管扩张剂后，仍有明显的呼吸道阻塞或反复发作时，应使用肾上腺皮质激素。

14、答案：A

解析：普通感冒初有咽干、喉痒，继而出现打喷嚏、鼻塞、流涕，开始流清水样鼻涕，2~3天后变稠，可伴咽痛。有时由于耳咽管炎使听力减退，可有流泪、呼吸不畅、声嘶、干咳或咳少量黏液。全身症状轻且短暂，轻度畏寒或头痛，食欲减退，便秘或腹泻，鼻和咽部黏膜充血和水肿。如无并发症，5~7天左右痊愈。所以A不正确。

15、答案：B

解析：普通感冒：成人多由鼻病毒、副流感病毒等感染引起，潜伏期短（1~3天），起病急。

16、答案：C

解析：细菌性咽、扁桃体炎：多由溶血性链球菌感染引起。起病急，有明显咽痛、畏寒、发热，体温可达到39℃以上。

17、答案：B

解析：支气管扩张：慢性咳嗽伴大量脓痰约有90%的病人有此症状。晨起或卧床时咳嗽，痰量增多；呼吸道感染急性发作时，黄绿色脓痰每天可达数百毫升；伴有厌氧菌混合感染时痰有恶臭。

18、答案：E

解析：分层特征：上层为泡沫，泡沫下为脓性部分，中层为黏液，底层为坏死组织沉淀物。

19、答案：D

解析：咯血常出现在肺癌早期和中期，血量不多，为鲜红色或与泡沫混为一体。出现这种现象的原因是肿瘤表面血管丰富，咳嗽损及表层，导致血管破裂所致。

20、答案：D

解析：慢支并发阻塞性肺气肿患者随病情发展，甚至在静息时也感到呼吸困难。发生感染时胸闷、气急、呼吸困难明显加重，晚期可出现呼吸衰竭。