

2021年执业/助理医师资格考试

21年真题搜集版

口腔执业(助理)医师



金英杰医学教育



1. 氟的急救量是多少，氟的中毒量是多少
 2. 用于评价大规模的口腔流行病学的指数
 3. 品红溶液浓度是多少
 4. 牙本质过敏牙膏选什么
 5. 牙髓活力检查，热测试敏感，冷测试缓解，诊断是
 6. 分析性的临床试验最多用的是
 7. 中度高度危险器械
 8. 除了四环素，还有什么药物可引起四环素牙
-
1. 最早口腔检查人员是
 - A. 婴儿
 - B. 幼儿
 - C. 月龄儿童
 - D. 成人
 - E. 老年人
 2. 3天前做完牙髓治疗，逐渐出现咬合痛，X线正常，没有超出根管。
 - A 遗漏根管
 - B 超预备
 - C 药物刺激
 - D 残髓炎
 3. 上中切牙外伤脱落后处理
 - A. 直接放进牙槽窝
 - B. 冲洗干净再放入牙槽窝
 - C. 自来水冲洗干净后放入自来水瓶内
 - D. 冲洗擦干后放卫生纸内包裹
 4. 致龋最弱的糖是
 - A. 底糖
 - B. 葡萄糖
 - C. 麦芽糖
 - D. 淀粉
 - E. 果糖
 - 5 用于评价大规模的口腔流行病学指数
 - A 牙龈出血、牙菌斑、软垢
 - B 龈沟出血、牙周袋、牙石
 - C 牙石、软垢、菌斑
 - D 牙周袋深度、牙龈出血
 - E 菌斑、牙石、牙周袋

(共用备选答案)

- A. 2.5mg



- B. 5mg
- C. 7.5mg
- D. 10mg
- E. 15mg

1 氟的急救量

2 氟化物可能中毒计量

(共用题干)

初一 200 人，患龋率 20%，初二 200 人，患龋率 22.5%，初三 100 人，患龋率 25%

- 1. 全初中患龋率
- 2. 龋指数是多少
- 3. 低，很低，高，很高

(共用备选答案)

- A. 模型雕刻刀
 - B. 蜡刀
 - C. 口镜
 - D. 拔牙钳
 - E. 锤子
- 1. 高危器械是
 - 2. 中危器械是

(共用备选答案)

- A. 菌斑生物膜
 - B. 结合上皮分泌的防御素
 - C. 合创伤
 - D. 食物嵌塞
 - E. 跟沟液分泌的 PMN
- 1. 在牙周炎发展中具有致炎和抗炎双作用的是
 - 2. 单独存在时，牙龈组织炎症不受影响的是
 - 3. 单个牙松动，骨吸收不同于其他，可能的原因是

命中题

- 1. 分析性流行病学的研究方法之一是
- A. 横断面研究
 - B. 常规资料分析
 - C. 纵向研究



D. 群组研究

E. 现况调查

【答案】D。

2. 哪种制剂不能作为菌斑染色剂

A. 2% 碱性品红

B. 2% 甲紫

C. 2% ~ 5% 藻红

D. 4% 酒石黄

E. 1.0% ~ 2.5% 孔雀绿

【答案】B

3. 急性化脓性牙髓炎有特点的症状是

A. 自发痛阵发性加重

B. 冷刺激可缓解疼痛

C. 热刺激可缓解疼痛

D. 痛向对侧面部放散

E. 刺激除去痛立即消失

【答案】B

5. 能引起四环素牙的药物有

A. 先锋霉素和四环素

B. 土霉素和地美环素

C. 链霉素和氯霉素

D. 林可霉素和庆大霉素

E. 先锋霉素和米诺环素

【答案】B

6. 出生后，第一次需做口腔检查的时间是：

A. 3 个月，乳牙未萌出

B. 6 个月，第一颗乳牙萌出

C. 1 岁，下中、侧切牙萌出

D. 2 岁，多数乳牙已萌出

E. 2 岁半，乳牙全部萌出

【答案】B

(共用备选答案)

- A 单端固定桥
 - B 半固定桥
 - C 种植固定桥
 - D 复合固定桥
 - E 双端固定桥
1. 完全固定桥又称为
 2. 适用于基牙倾斜，难于取得共同就位道的是
 3. 易引起基牙牙周组织损伤的
- E B A

(共用备选答案)

- A. 新生牙
 - B. 双生牙
 - C. 结合牙
 - D. 融合牙
 - E. 诞生牙
1. 婴儿出生时 30 天内萌出的牙称为
 2. 两个正常牙胚的牙釉质或牙本质融合在一起称为
- A D

(共用备选答案)

- A 罗格列酮
 - B 格列奇特
 - C 吡格列酮
 - D 阿卡波糖
 - E 二甲双胍
1. 促进胰岛素分泌的药物是
 2. 延缓肠道碳水化合物吸收的药物是
 3. 主要药理作用是通过抑制肝葡萄糖输出而降低血糖的是
- B E D

(共用备选答案)

- A 龈导斜度
 - B 切导斜度
 - C 补偿曲线曲度
 - D 定位平面斜度
 - E 牙尖斜度
1. 全口义齿修复时，不能改变的是
 2. 上中切牙近中切角与上颌两侧第二磨牙的颊尖相连而成的三角平面的斜度称
- A D



(共用备选答案)

- A. 回力卡环
 - B. 倒钩卡环
 - C. 联合卡环
 - D. 圈形卡环
 - E. 对半卡环
- 1. 有辅助臂的卡环
 - 2. 非游离缺隙的前方为基牙，颊侧为二型观测线，卡环应选
 - 3. 用于非缺隙侧后牙的卡环
 - 4. 用于远中游离缺失末端基牙，卡体不与鞍基直接相连的卡环

D B C A

(共用备选答案)

- A. 舌背部脑回状或叶脉状皱褶
 - B. 舌背中部丝状乳头增生呈波浪状
 - C. 舌背乳头萎缩与增生并存呈婉婷状
 - D. 舌背丝状乳头萎缩甚至消失
 - E. 舌背后部似菱形的舌乳头萎缩
- 1. 地图舌临床表现
 - 2. 沟纹舌临床表现

C A

(共用备选答案)

- A. 0.5mm
 - B. 1.0mm
 - C. 1.5mm
 - D. 2.0mm
 - E. 3.0mm
- 1. 牙本质肩领的厚度应大于
 - 2. 舌杆上缘距余留牙舌侧龈缘的距离不小于
 - 3. 牙本质肩领高度应尽量不小于

B E C

56 接触区再颊 1/3 与中 1/3, 67 是中 1/3

乳牙早失的原因

种植覆盖义齿上 4 下 2

扁平苔藓是全身疾病还是口腔表征

Ramsay-Hunt 的临床表现

命中题

(1~3 题共用备选答案)



- A.对半卡环
- B.圈形卡环
- C.三臂卡环
- D.回力卡环
- E.联合卡环

1.前后均有缺牙间隙的孤立后牙上的卡环宜采用

【答案】A

2.单侧牙缺失较多，需对侧辅助固位的卡环是

【答案】E

3.用于最后孤立磨牙且向近中舌侧或近中颊侧倾斜牙上的卡环是

【答案】B

4.联合卡环适用于

- A.单个前牙缺失
- B.双侧后牙缺失
- C.前后牙缺失
- D.单侧牙弓缺失
- E.单侧个别牙缺失

【答案】D

5.以下说法错误的是

- A.前腭杆应位于腭皱襞之后，上腭硬区之前
- B.后腭杆位于上颌硬区之后，颤动线之前
- C.后腭杆的两端弯向前至第一磨牙与第二磨牙之间
- D.侧腭杆与龈缘的关系是离开龈缘 4~6 mm
- E.舌杆与龈缘的关系是离开龈缘 4~6 mm

【答案】E

6.根据全口义齿平衡理论，前伸髁突斜度大者应

- A.减小牙尖斜面斜度
- B.减小定位平面斜度
- C.减小补偿曲线曲度
- D.增大补偿曲线曲度
- E.增大前伸切导斜度

【答案】D

(7~8题共用备选答案)

- A.双端固定桥
- B.种植体固定桥
- C.应力中断式固定桥
- D.复合固定桥
- E.粘结固定桥



7.有中间基牙的多单位固定桥，近中末端无基牙其称为

【答案】D

8.缺隙两端各有一基牙，且两侧均为不动连接体的固定桥称为

【答案】A

9.牙发育过程中，单个牙胚未完全分裂会形成

- A. 双生牙
- B. 融合牙
- C. 结合牙
- D. 牙内陷
- E. 畸形中央尖

【答案】A



执业

1、上+下颌突：横面裂

2、上颌突+侧鼻突：斜面裂

3、囊壁内衬假复层纤毛柱状上皮，外层囊壁为纤维结缔组织：甲状舌管囊肿

4、牙龈内囊肿是：

5、蛤蟆肿是什么层的上皮

6、梅克尔细胞在哪里？基底层

7、下颌哪个髓角高？近中舌尖髓角高

8、IgG、IgM 的特点

萌出囊肿

(共用备选答案)

A 学龄前

B 学龄期

C 婴儿期

D 幼儿期

9、易发生意外的是

10、容易营养障碍的是

(共用备选答案)

A 上颌第一磨牙

B 上颌第二磨牙

C 下颌第一前磨牙

D 上颌第一前磨牙

E 下颌第二磨牙

11. 两相对三角嵴相连成

12. 以下那个牙有横嵴

命中题

1、上颌突与下颌突未联合或联合不全形成()

A . 单侧唇裂

B . 斜面裂

C . 横面裂

D . 腭裂

E . 颌裂

答案:C

2、上颌突与侧鼻突未联合将形成()

A、唇裂

B、颌裂

C、腭裂

D、横面裂



E、斜面裂

答案:E

3、关于甲状舌管囊肿，描述不正确的是（）。

- A . 是甲状腺舌导管残余上皮发生的囊肿
- B . 胚胎第 10 周时，甲状舌管不消失或发育异常而致
- C . 可发生在舌盲孔与甲状腺之间
- D . 内容物为清亮液体，可含胆固醇结晶
- E . 上皮衬里为假复层柱状上皮

答案： D

4、萌出囊肿的发生是由于（）

- A . 缩余釉上皮与牙釉质表面之间液体积聚而致
- B . 成釉器星网状退变，液体潴留
- C . 炎症刺激未萌牙冠部缩余釉上皮而致
- D . 未萌牙或萌出牙附近口腔黏膜异常增生种植而致
- E . 以上均是

答案： A

5、俗语称“蛤蟆肿”是指

- A. 黏液腺囊肿
- B. 舌下腺囊肿
- C. 皮样囊肿
- D. 表皮样囊肿
- E. 甲状舌管囊肿

【答案】B

6、梅克尔细胞(Merkelcell)

- A、位于上皮基底层，可能来自神经嵴或上皮细胞，可能起触觉受体的作用，与口腔黏膜感觉功能有关
- B、位于上皮深层，为一层立方形或矮柱状的细胞，有分裂繁殖能力
- C、位于上皮基底层，来自于神经嵴细胞，胞浆有细长的突起
- D、位于上皮棘层及基底层，细胞呈树枝状，是一种抗原呈递细胞，与门腔黏膜免疫功能有关
- E、位于颗粒层的深部，呈多边形，由增生的基底细胞发育而来

【答案】A



7、下颌第一磨牙髓角的高度是

- A、近中舌侧髓角最高
- B、近中颊侧髓角最高
- C、远中舌侧髓角最高
- D、远中颊侧髓角最高
- E、四个髓角高度相同

正确答案:A

8、关于 IgG 的叙述，下列哪项是错误的（）

- A . 是一种球蛋白
- B . 能通过胎盘
- C . 血清中含量最多
- D . IgG₁、IgG₂、IgG₄的Fc段能与SPA结合
- E . 其作用与抗体完全一样

答案： E

9、下列关于 IgM 的特性的描述，正确的包括（）

- A、是分子量最大的 Ig，称为巨球蛋白
- B、无铰链区
- C、主要在血液中发挥抗感染作用
- D、是最早合成的 Ig
- E、激活补体的能力比 IgG 强

正确答案:A, B, C, D, E

10、最容易造成小儿发生意外事故的时期为（）。

- A . 新生儿期
- B . 婴儿期
- C . 幼儿期
- D . 学龄前期
- E . 学龄期

参考答案： C



执业

- 1 眼部用什么皮瓣？
- 2 植皮用什么样的？
- 3 腭咽成型术？
- 4 皮瓣法，II°唇腭裂
- 5 腭裂修复后，腭咽闭合不全怎么修复？
- 6 隐形唇裂，腭咽闭合不全怎么修复？
- 7 先侵犯神经的是？
- 8 中央性骨髓炎
- 9 在热影像下表现冷结节热结节是什么肿瘤或者囊肿？
- 10 下颌下腺样囊肿性瘤术后会引起哪里麻木
A 眶下
B 上唇
C 上唇患侧舌
11. 第一磨牙麻醉啥神
12. 初期缝合最晚多长时间
13. 上颌窦什么缝合选多长时间
14. 青春期重要指标什么？

(1~4题共用备选答案)

- A. 刃厚皮片 (0.2~0.25mm)
- B. 中厚皮片 (0.35~0.8mm)
- C. 薄中厚皮片 (0.37~0.5mm)
- D. 厚中厚皮片 (0.62~0.75mm)
- E. 全厚皮片

1. 口腔植皮常用

【答案】C

2. 感染的肉芽创口植皮应用

【答案】A

3. 成活率最高的是

【答案】A

4. 植皮后色素沉着最少的是

【答案】E

命中题

- 1、患者，女，34岁。右侧眉因外伤缺失，拟采用皮肤移植方法行眉再造手术。应选用的是
A. 表层皮片
B. 薄中厚皮片
C. 厚中厚皮片
D. 全厚皮片
E. 轴型皮瓣



【答案】D

2. 为缩小咽腔，增进腭咽闭合，目前最常用的手术方法为

- A. 传统兰氏术
- B. Millard 岛状瓣术
- C. 咽后壁组织瓣转移术
- D. 腭帆提肌重建术
- E. 单瓣后推术

【答案】C

3. 患儿，男性，1岁，先天性双侧完全性唇裂、双侧完全性腭裂，现拟行唇裂修复术，目前常用的方法是

- A. 前唇加长法修复术
- B. 前唇原长法修复术
- C. 下唇阿贝氏瓣修复术
- D. 双侧鼻唇沟瓣修复术
- E. 上唇直线缝合法

【答案】B

4. 以下哪项不是腺样囊性癌的特征

- A. 好发于腮腺和下颌下腺
- B. 肿瘤沿神经血管束生长
- C. 浸润性极强
- D. 区域淋巴结转移率低
- E. 可带瘤生存

【答案】A

5. 化脓性颌骨骨髓炎根据临床病理特点，病变始于颌骨骨松质和骨髓者称为



- A. 边缘性骨髓炎
- B. 放射性骨髓炎
- C. 中央性骨髓炎
- D. 婴幼儿上颌骨骨髓炎
- E. 根尖周致密性骨炎

【答案】C

6. 除左上第一磨牙残冠时应麻醉的神经是
- A. 眶下神经+腭前神经
 - B. 上牙槽后神经+鼻腭神经
 - C. 上牙槽后神经+腭前神经
 - D. 上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经
 - E. 上牙槽后神经+上牙槽中神经+鼻腭神经

答案：D

7. 如果确定腭根已入上颌窦，经去除牙槽间隔后扩大牙槽窝将其冲出，此时上颌窦底黏膜破裂口约8mm，此时应
- A. 用邻位组织瓣关闭创口
 - B. 牙槽窝填塞碘仿纱条
 - C. 可不予处理
 - D. 两侧牙龈拉拢缝合
 - E. 术后牙槽窝内放置碘仿海绵

答案：A

8. 青春期开始的重要标志是
- A. 下丘脑和垂体促性腺激素分泌量增加
 - B. 第二性征发育
 - C. 月经来潮
 - D. 雌激素水平的上升
 - E. 身高体重明显增加

答案：C



真题：

1. 急性坏死性溃疡性龈炎的主要致病菌是

- A. 黏性放线菌和牙龈二氧化碳嗜纤维菌
- B. 金黄色葡萄球菌和链球菌
- C. 梭形杆菌和奋森螺旋体
- D. 牙龈卟啉单胞菌和放线共生放线杆菌
- E. 变性链球菌和嗜酸乳杆菌

【答案】C

2 人的头部上唯一一块能活动的骨是（ ）

- A . 脑颅骨
- B . 面颅骨
- C . 上颌骨
- D . 下颌骨

【答案】D

命中题

1. 患儿，3岁半，因牙列不齐前来就诊，这一年龄阶段正常的特征有

- A. 牙排列紧密无间隙，切缘及面有显著磨耗
- B. 牙排列紧密无间隙，上下颌第二乳磨牙的远中面彼此相齐
- C. 牙排列不紧密前牙有间隙，上下颌第二乳磨牙的远中面彼此相齐
- D. 牙排列不紧密，前牙有间隙，下颌第二乳磨牙移至上颌第二乳磨牙的牙前方



E. 牙排列由紧密到牙间隙逐渐形成

【答案】B

【解析】2.5~4岁的特征：牙排列紧密无明显缝隙，切缘及面尚无显著磨耗；乳牙位置较正，没有明显的近远中向或唇舌向的倾斜；覆较深，覆盖较小，曲线不明显；上下颌第二乳磨牙的远中面彼此平齐，成一垂直平面称为齐平末端。

2.男，10岁，因前牙排列不齐，有间隙来医院检查。发现口内乳牙和恒牙都存在对于错。关系的判断，哪个不是暂时性错

- A. 恒侧切牙向侧方倾斜
- B. 中切牙间存在间隙
- C. 上下第一恒磨牙出现偏远中关系
- D. 下颌前牙位于上颌前牙的唇侧
- E. 上前牙拥挤

【答案】D

【解析】考点替牙特征：上唇系带位置过低；中切牙间间隙；上中切牙侧切牙牙冠偏远中；暂时性前牙拥挤；暂时性远中；暂时性深覆。

3. 关于不完全抗原（半抗原）描述正确的是

- A. 有免疫原性
- B. 有免疫反应性
- C. 是蛋白质大分子



D.与抗原决定簇无关

E.与载体的含义相似

【答案】 B

4.不属于隐蔽抗原的组织成分的是

A.脑组织

B.晶状体蛋白

C.精子

D.甲状腺球蛋白

E.关节滑膜

【答案】 E

5.下列有关朗格汉斯细胞的描述哪项是错误的()

A. 有处理抗原能力

B. 能分化为成熟的树突状细胞

C. 具有抗原呈递能力

D. 分布于基底层

【答案】 D

6.牙周炎的组织破坏特点：

A、持续性破坏

B、长时间静止、短时间破坏



- C、长时间破坏、短时间静止
- D、进行性破坏
- E、渐进性破坏

答案：B

7 患儿 8 岁，右下第一恒磨牙深龋，去除大块腐质，近髓处留少许软化牙本质，上方用氢氧化钙盖髓后充填。二次去腐质应在什么时间复诊

- A.1~2 周
- B.3~4 周
- C.6~8 周
- D.10~12 周
- E.15 周

答案：D

8. 解剖牙冠是指

- A.牙体暴露于口腔的部分
- B.牙体被牙釉质包被的部分
- C.牙体被牙骨质包被的部分
- D.牙本质分布的部分
- E.牙尖与窝沟分布的部分

【答案】B

9 妊娠期龈炎的直接病因是



- A . 妊娠
- B . 牙石
- C . 不良卫生习惯
- D . 牙菌斑
- E . 不良修复体

参考答案：D

参考解析：[解析] 妊娠期龈炎的最根本的病因是牙菌斑，而不是牙石、不良修复体、不良卫生习惯和妊娠等促进因素，只是妊娠时性激素水平的变化，导致牙龈对局部刺激的反应加强。因此本题的正确答案为 D

10 下列哪项属于食物中毒（）

- A . 伤寒
- B . 暴饮暴食引起的急性胃肠炎
- C . 寄生虫病
- D . 误食亚硝酸盐
- E . 水俣病

【答案】D

11.有关新冠肺炎疑似患者解除隔离标准，下列哪项是正确的（）

- A、连续两次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 1 天)
- B、连续三次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 1 天)
- C、连续两次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 12h)



D、连续三次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 12h)

12 关于新冠肺炎的治疗，以下哪项表述不正确()。

- A、建议联合使用广谱抗生素
- B、不建议同时应用 3 种或以上抗病毒药物
- C、对于双肺广泛病变者及重型患者，且实验室检测 IL-6 水平升高者，可试用托珠单抗治疗
- D、对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的患者，酌情短期内(3-5 天)使用糖皮质激素



真题

1. 可摘局部义齿铸造金属基托的平均厚度为（）（原题）

- A. 0.8mm
- B. 2.0mm
- C. 0.5mm
- D. 1.5mm
- E. 1.0mm

答案：C

2. 儿童行舌系带矫正术时，最好的年龄是

- A. 4~6个月
- B. 7~12个月
- C. 1~2岁
- D. 3~4岁
- E. 4~5岁

【答案】C

【解析】儿童行舌系带矫正术应在学说话之前进行，在1~2岁期间最佳，故C正确。

3. 患儿男性，1岁。先天性双侧完全性唇裂伴双侧完全性腭裂，现拟行唇裂修复术，目前常用的方法是（）

- A. 前唇加长法修复术
- B. 前唇原长法修复术
- C. 下唇阿贝氏瓣修复术
- D. 双侧鼻唇沟瓣修复术
- E. 唇腭裂修复术

答案：B

4. 能够真实地反映牙槽嵴顶骨吸收程度，适用于早期牙周炎的影像学检查方法是

- A. 根尖片
- B. 牙合翼片
- C. 曲面体层片
- D. 片
- E. 根尖片数字减影技术

【答案】B

【解析】牙合翼片可以显示上、下颌多个牙的牙冠部影像，还可较清晰地显示牙槽嵴顶，用于观察牙槽嵴顶有无骨质破坏。

5. 拔除上颌第一磨牙时需要麻醉的神经为（还问了下8）

- A. 上牙槽中神经
- B. 上牙槽中神经、上牙槽后神经
- C. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经
- D. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经



E. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经、腭后神经

【答案】C.

6. 附着龈宽度是指()

- A. 龈缘到釉牙骨质界的距离
- B. 袋底到釉牙骨质界的距离
- C. 龈缘到袋底的距离
- D. 膜龈联合到袋底的距离
- E. 龈沟底到牙槽骨嵴顶的距离延伸

A. 髂突经咽侧位片

B. 曲面体层片

C. 许勒位片

D. 头颅侧位

E. 经咽侧位片

1. 观察颞下颌关节间隙变化，应选择的是

2. 观察上颌骨，颧骨骨折时，应选择的是

命中题

1. Garre 骨髓炎又称

- A. 慢性化脓性骨髓炎
- B. 慢性局灶性骨髓炎
- C. 致密骨炎
- D. 骨化性骨膜炎
- E. 结核性牙髓炎
- F. 参考答案：D

参考解析：颌骨骨髓炎可分为以下类型：①急性化脓性骨髓炎，大多来自于牙源性感染；②慢性化脓性骨髓炎，可由于治疗不当或毒力弱的细菌感染引起；③慢性骨髓炎伴增生性骨膜炎，又称为 Garre 骨髓炎或 Garre 慢性非化脓性硬化性骨炎或骨化性骨膜炎，是一种伴明显骨膜炎症反应的慢性骨髓炎亚型；④慢性局灶性硬化性骨髓炎，又称为致密性骨炎，是轻度感染导致骨的局灶性反应；⑤结核性骨髓炎，常为身体其他部位结核的继发病；⑥放射性骨髓炎，又称为放射性骨坏死，是头颈部恶性肿瘤放射治疗的严重并发症。因此，正确答案为 D。



2 前伸髁导斜度为 30°时，侧方髁导斜度应为 A . 5°B . 10°C . 15°D . 16°E . 24°

前伸髁导斜度为 30°时，侧方髁导斜度应为

- A . 5°
- B . 10°
- C . 15°
- D . 16°
- E . 24°

3. 颞下颌关节内强直的病因中哪一项是错误的

- A.化脓性中耳炎
- B.颞下颌关节紊乱
- C.颈部对冲性损伤
- D.外伤直接损伤颞下颌关节
- E.血源性化脓性关节炎和类风湿性关节炎

【答案】 B

4 关于预防亚硝酸盐中毒的措施不正确的是()

- A. 少吃或不吃隔夜剩饭菜
- B. 腌制时间过短或食盐用量不足 10% 时，亚硝酸含量会减少
- C. 腌制食品在腌制 15 天后吃比较适宜
- D. 少吃火锅

5 不属于牙源性角化囊肿多房性的 X 线表现是

- A . 囊腔大小相差悬殊
- B . 囊腔大小相近似
- C . 常沿颌骨长轴生长
- D . 牙根可有吸收
- E . 颌骨可向舌侧膨胀

原题问常沿颌骨长轴生长的是

6 以下哪项不是静脉畸形的临床特点

- A.体位试验阳性
- B.表浅肿瘤呈蓝色或紫色
- C.有时可扪到静脉石
- D.扪之柔软，有压缩性
- E.触诊有震颤感，听诊有吹风样杂音

【答案】 E

【解析】 E 是动静脉畸形的特点。



7. 葡萄酒斑状血管瘤属于

- A. 微静脉畸形
- B. 海绵状血管瘤
- C. 混合型血管瘤
- D. 蔓状血管瘤
- E. 杨梅状血管瘤

【答案】A

8. 单侧颞下颌关节强直患者可出现

- A. 颊点偏向健侧
- B. 颊点偏向患侧
- C. 患侧面部狭长
- D. 健侧面部丰满
- E. 下前牙反

【答案】B

A. 肯氏一类，第一亚类

B. 肯氏二类，第三亚类

C. 肯氏三类，第二亚类

D. 肯氏四类

E. 以上均不是

196. 余留牙为 743223567，按照肯氏分类法应属

【答案】C

197. 缺失牙为 87654125678，按照肯氏分类法应属

【答案】A

198. 余留牙为 8765445678，按照肯氏分类法应属

【答案】D

199. 缺失牙为 876521256，按照肯氏分类法应属

【答案】B

牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后

A. 1周

B. 2周

C. 3周

D. 6个月

E. 1~3个月

