

# 2022年临床医师资格执业押题

## 第二单元

### A1型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列尿蛋白主要为白蛋白的是

- A. 肾小管性蛋白尿
- B. 溢出性蛋白尿
- C. 肾小球性蛋白尿
- D. 分泌性蛋白尿
- E. 组织性蛋白尿

添加老师微信: j y j q q 6 6 6

2. 下列不属于肾小球源性病的主要临床表现的是

- A. 高血压
- B. 水肿
- C. 血尿
- D. 蛋白尿
- E. 颗粒管型

3. 下列哪项为肾病综合征出现大量蛋白尿的主要机制

- A. 肾小球滤过膜内皮窗孔径异常过大
- B. 肾小球基膜糖蛋白成分变化负电荷消失
- C. 肾小球上皮细胞足突裂隙增大
- D. 肾小球基膜受损
- E. 肾静脉回流障碍

4. 下列关于IgA肾病的说法错误的是

- A. 病理类型主要为系膜增生性肾小球肾炎
- B. 确诊有赖于肾活检病理检查
- C. 青少年好发
- D. 预后良好, 很少有肾功能恶化
- E. 常在感染后72小时以内发作肉眼血尿

5. 下列关于输尿管结石的描述正确的是

- A. 肾区疼痛, 有的无症状
- B. 肾绞痛, 腰部阵发性疼痛
- C. 排尿时突然疼痛
- D. 尿痛, 会阴部疼痛
- E. 肋脊角叩痛

6. 强烈提示患者左心功能衰竭的体征是

- A. 心尖部第一心音增强
- B. A2亢进
- C. 舒张早期奔马律

D. 开瓣音

E. 心包叩击音

7. 下列哪项为胸外心脏按压正确的部位

- A. 心前区
- B. 胸骨中下部
- C. 胸骨中上1/3交界处
- D. 胸骨中部
- E. 胸骨角

8. 冠心病稳定型心绞痛合并高血压首选药物是

- A. 钙离子拮抗剂
- B. 利尿剂
- C. 受体阻滞剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂
- E. 血管紧张素 受体阻滞剂

9. 下列哪项为最易引起低钾血症的降压药是

- A. 美托洛尔
- B. 卡托普利
- C. 哌唑嗪
- D. 硝苯地平
- E. 氢氯噻嗪

10. 下列哪项为二尖瓣狭窄患者最常见的心律失常

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 窦性心动过缓
- C. 心室颤动
- D. 室性心动过速
- E. 心房颤动

11. 不属于小细胞低色素性贫血的是

- A. 缺铁性贫血
- B. 慢性病贫血
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 铁粒幼细胞性贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

12. 下列有关再生障碍性贫血发病机制的检查结果, 错误的是

- A. 血清IL-2水平增高

- B. 血清TNF水平增高
- C. CD34+T细胞增高
- D. CD8+T细胞增高
- E. INF- 细胞增高

13. 巨幼红细胞贫血患者用下列哪种药物治疗

- A. 铁剂
- B. 叶酸
- C. 维生素C
- D. 维生素K
- E. 肝素

14. 绿色瘤常见于

- A. 急性单核细胞白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 急性粒细胞白血病
- E. 急性再生障碍性贫血

15. 淋巴瘤最有诊断意义的临床表现是[助理不做]

- A. 肝脾肿大
- B. 长期周期性发热
- C. 盗汗、体重减轻
- D. 无痛性淋巴结肿大
- E. 局限性淋巴结肿大并粘连

16. 怀疑有骨折时首选的检查是

- A. X线片
- B. 螺旋CT
- C. B超
- D. MRI
- E. PET-CT

17. 爪形手是由于骨折后产生的

- A. 创伤性关节炎
- B. 缺血性骨坏死
- C. 关节僵硬
- D. 缺血性肌挛缩
- E. 急性骨萎缩

18. 关于手部狭窄性腱鞘炎叙述错误的是

- A. 早期为晨起患指僵硬、疼痛
- B. 典型表现为弹响指和弹响拇
- C. 示、拇指多见
- D. 腱鞘内局部药物封闭疗效可
- E. 可在远侧掌横纹处扪及黄豆大小的痛性结节

19. 治疗骨关节炎的首选药物

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 非甾体抗炎药
- C. 糖皮质激素
- D. 氨基葡萄糖

E. 透明质酸钠

20. 关于骨软骨瘤临床表现的叙述, 正确的是

- A. 其为骨生长方向的异常
- B. 肿物与周围界限不清
- C. X线检查可见骨膜反应
- D. 肿胀明显, 皮肤有静脉怒张
- E. 生长较快, 伴明显疼痛

添加老师微信: j y j q q 6 6 6

21. 中枢性尿崩症患者控制多尿最适宜的药物是[助理不做]

- A. 去氨加压素
- B. 卡马西平
- C. 氢氯噻嗪
- D. 氯磺丙脲
- E. 螺内酯

22. 判断多尿是否为尿崩症的试验

- A. 禁水(禁饮) 试验
- B. 测定尿渗透压和血钠
- C. 测定尿渗透压和比重
- D. 测定血浆和尿渗透压
- E. 垂体后叶素试验

23. 具有典型Whipple三联征的疾病是

- A. 胰岛素瘤
- B. 胃泌素瘤
- C. 肠肽瘤
- D. 高血糖瘤
- E. 生长抑素瘤

24. 下列不属于内分泌腺体功能减退常见原因的是

- A. 肿瘤
- B. 增生
- C. 感染
- D. 药物
- E. 遗传象

25. 等渗性缺水的临床表现为

- A. 短期内体液的丧失达体重3%时有休克
- B. 休克常伴有代谢性酸中毒
- C. 明显口渴
- D. 化验检查见血清Na<sup>+</sup>降低
- E. 化验检查见尿比重在1.010 以下

26. 符合室性期前收缩心电图的特征是

- A. 多数代偿间歇不完全
- B. QRS波群时限 0.12s
- C. 可见ST段下移
- D. T波低平
- E. 提前出现的QRS 波群, 形态宽大畸形

27. 成人心肺复苏抢救时胸外按压与人工呼吸通气的比例:

- A. 30: 2
- B. 15: 2
- C. 30: 1
- D. 15: 2
- E. 15: 1

28. 转复长QT 期间所致尖端扭转型室速的最适宜药物是

- A. 肾上腺素
- B. 利多卡因
- C. 普罗帕酮
- D. 硫酸镁
- E. 胺碘酮

29. 变异型心绞痛的治疗宜选用

- A. 普罗帕酮
- B. 地尔硫草
- C. 美托洛尔
- D. 普萘洛尔
- E. 胺碘酮

添加老师微信: jyj qq666

30. 风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于

- A. 肺毛细血管破裂
- B. 合并肺结核
- C. 支气管静脉破裂
- D. 急性肺水肿
- E. 合并心力衰竭

31. 心包穿刺术的绝对禁忌症是

- A. 心脏压塞
- B. 化脓性心包炎
- C. 肿瘤性心包炎
- D. 急性心包炎
- E. 主动脉夹层

32. 不属于急性病毒性心肌炎常见的临床表现是

- A. 先有发热, 然后出现心悸、胸闷
- B. 恶心、呕吐等消化道症状
- C. 不发生心律失常
- D. 心动过速与发热程度不平行
- E. 常出现器质性心脏杂音

33. 引起急性肾小球肾炎最常见的病原体为

- A. 结核分枝杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 寄生虫
- D. 柯萨奇病毒
- E. 溶血性链球菌

34. 影响尿培养结果呈假阳性是

- A. 近1周内使用过抗生素
- B. 饮水过多, 尿液稀释
- C. 留取标本时有消毒液混入
- D. 标本未能及时接种
- E. 尿液在膀胱停留时间不足6小时

35. 需血浆置换的疾病是

- A. 急性肾炎
- B. 急性肾小管坏死
- C. ANCA相关性血管炎伴肺出血
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. Ⅱ型狼疮性肾炎

36. 我国泌尿系肿瘤中常见的是

- A. 膀胱癌
- B. 肾癌
- C. 肾细胞癌
- D. 前列腺癌
- E. 输尿管癌

37. 老年性膀胱结石最常见的诱因

- A. 前列腺癌
- B. 前列腺增生
- C. 前列腺炎
- D. 前列腺息肉
- E. 前列腺肥大

38. 下列不会出现缺铁性贫血的是

- A. 月经过多
- B. 急性失血
- C. 反复鼻出血
- D. 胃及十二指肠切除
- E. 慢性萎缩性胃炎

39. 有关铁的描述, 正确的是

- A. 食物中的铁以三价铁为主
- B. 肠黏膜吸收的铁为三价铁
- C. 转铁蛋白结合的铁为二价铁
- D. 体内铁蛋白中结合的铁为二价铁
- E. 血红蛋白中的铁为三价铁

40. 口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血者, 下列化验最先上升的是

- A. 网织红细胞
- B. 血红蛋白
- C. MCV
- D. MCH
- E. MCHC

41. 如果骨髓中找到R-S细胞, 诊断的疾病是

- A. 霍奇金淋巴瘤
- B. 非霍奇金淋巴瘤

- C. 急性粒细胞白血病
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 急性单核细胞白血病

42. Schonlein型过敏性紫癜的临床表现中,除皮肤紫癜外,还有

- A. 关节肿痛
- B. 便血
- C. 尿血
- D. 视网膜出血
- E. 虹膜炎

43. 洋地黄最适合治疗哪种疾病所致的心衰

- A. 心肌炎合并心衰
- B. 肺心病并发心衰
- C. 甲亢心并发心衰
- D. 房颤并发心力衰竭
- E. 预激综合征合并心房颤动

44. 下列心律失常,表现为心律不整齐的是

- A. 室性期前收缩
- B. 一度房室传导阻滞
- C. 窦性心动过速
- D. 窦性心动过缓
- E. 阵发性室速

添加老师微信: jyj qq666

45. 阵发性室上性心动过速的发生机制主要是

- A. 高血压病
- B. 心肌缺血
- C. 折返机制
- D. 感染性心内膜炎
- E. 洋地黄中毒

46. 心脏骤停最主要的病因

- A. 冠心病
- B. 心肌炎
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 心肌病
- E. 二尖瓣脱垂

47. 严重冠状动脉狭窄是指冠脉狭窄程度达

- A. 65%以上
- B. 75%以上
- C. 85%以上
- D. 95%以上
- E. 25%以上

48. 肾病综合征常见的并发症是

- A. 感染和电解质紊乱
- B. 肾静脉栓塞
- C. 心力衰竭

- D. 肾衰竭
- E. 高血压脑病

49. 附睾结核多继发于

- A. 淋巴结核
- B. 肺结核
- C. 肾结核
- D. 肠结核
- E. 骨结核

50. 腹部平片不易显影的尿结石是

- A. 磷酸盐结石
- B. 草酸盐结石
- C. 碳酸盐结石
- D. 胱氨酸结石
- E. 混合结石

51. 诊断肾癌最常见的检查方法是

- A. IVU
- B. 肾穿刺活检
- C. 逆行肾盂造影
- D. KUB
- E. CT(平扫+增强)

52. 导致慢性肾衰患者死亡的最常见原因是

- A. 高钾血症
- B. 钙磷代谢紊乱
- C. 代谢性酸中毒
- D. 心血管并发症
- E. 严重贫血

53. 类风湿关节炎最常累及的关节是

- A. 腕关节
- B. 远端指间关节
- C. 肘关节
- D. 近端指间关节
- E. 掌指关节

54. 急性痛风性关节炎的主要临床特点不包括

- A. 秋水仙碱治疗可迅速缓解关节炎症状
- B. 常伴高尿酸血症
- C. 单侧第一掌指关节肿痛最为常见
- D. 在偏振光显微镜下,关节液内发现呈双折光的针形尿酸结晶
- E. 多在午夜或清晨突然起病

55. 缺铁性贫血实验室检查不符合的是

- A. 红细胞内游离原卟啉下降
- B. 细胞中央淡染区扩大
- C. 总铁结合力升高
- D. 血清铁蛋白低于正常
- E. 红细胞内游离原卟啉升高

56. 关于再生障碍性贫血的诊断, 不正确的是
- A. 发热、出血、贫血
  - B. 一般无肝、脾和淋巴结肿大
  - C. 中性粒细胞碱性磷酸酶阳性率和积分减低
  - D. 骨髓可呈灶性增生, 但巨核细胞减少
  - E. 末梢血淋巴细胞比例增高
57. 下列疾病中, 骨髓有核红细胞出现"老浆幼核"现象的是
- A. 巨幼红细胞性贫血
  - B. 急性红血病
  - C. 缺铁性贫血
  - D. 骨髓增生异常综合征
  - E. 再障

添加老师微信: jyjqq666

58. 下列实验室检查结果支持阵发性睡眠性血红蛋白尿诊断的是
- A. 酸溶血(Ham) 试验阳性
  - B. 抗人球蛋白(Coombs) 试验阳性
  - C. 红细胞渗透脆性增高
  - D. 血红蛋白电泳异常

- E. 高铁血红蛋白还原试验阳性
59. 霍奇金淋巴瘤化疗首选的方案是
- A. ABVD方案
  - B. CHOP方案
  - C. MOPP方案
  - D. VDP方案
  - E. DA方案
60. 有功能的垂体腺瘤最常见的肿瘤是
- A. ACTH瘤
  - B. TSH瘤
  - C. GH瘤
  - D. PRL瘤
  - E. FSH/LH瘤
61. 不能列为甲状腺大部切除术适应证的是
- A. 继发性甲亢或高功能腺瘤
  - B. 中度以上的原发性甲亢
  - C. 青少年甲亢患者
  - D. 有压迫症状或胸骨后甲状腺肿并发甲亢
  - E. 抗甲状腺药物或碘治疗复发者

## A2型题

### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

62. 患者从事每天日常活动即出现心悸、气短症状, 休息后即缓解。其心功能分级应为
- A. 心功能I级
  - B. 心功能 II级
  - C. 心功能 III级
  - D. 心功能 IV级
  - E. 以上都不是
63. 女, 72岁。12年前因心肌梗死住院, 5年前出现活动后气短, 夜间憋醒, 近1年双下肢水肿, 少尿。查体: BP 140/90mmHg, 颈静脉怒张, 双下肺可闻及细湿啰音, 心界向两侧扩大, 心率110次/分, 肝肋下3cm, 质中, 压痛(+), 双下肢水肿。该患者可能的诊断是
- A. 左心衰竭
  - B. 全心衰竭
  - C. 心肌梗死
  - D. 右心衰竭
  - E. 心包积液
64. 一位风湿性心脏病病人, 因气急、全身水肿、肝大、颈静脉怒张, 服用地高辛半个月后出现室性期前收缩呈二

- 联律, 除立即停用洋地黄并补充钾盐外, 首选的抗心律失常药应为
- A. 维拉帕米静注
  - B. 胺碘酮口服
  - C. 苯妥英钠静注
  - D. 硝普钠静注
  - E. 普罗帕酮静注
65. 男, 65岁, 阵发性心悸1年, 加重1周。既往有高血压糖尿病病史。查体: 心率120次/分, 律不齐, 第一心音强弱不等, 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音, 超声心动图示左房内径60mm, 该患者最适宜的抗栓治疗药物
- A. 潘生丁
  - B. 氯吡格雷
  - C. 华法林
  - D. 普通肝素
  - E. 阿司匹林
66. 男, 45岁, 左下肢疼痛发凉半年, 既往有左下肢血栓性浅静脉炎病史, 无高血压、糖尿病病史, 吸烟30年, 20支/天。查体: 右下肢正常; 左足苍白, 皮温明

显降低,左足背动脉搏动消失,左股、腘动脉可触及搏动,Buerger 试验阳性。最有可能的诊断是左下肢

- A.急性动脉栓塞
- B.血栓闭塞性脉管炎
- C.原发性下肢静脉曲张
- D.动脉硬化性闭塞症
- E.深静脉血栓形成

67.女,20岁.镜下血尿伴蛋白尿3年,辅助检查:尿RBC: 11-20/HP,为异形红细胞,尿蛋白定量1.5g/d,血肌酐120umol/L,B超示双肾大小正常.为明确诊断需要进一步采取的检查是

- A.腹部X线平片
- B.尿培养
- C.ANCA
- D.肾盂造影
- E.肾活检

68.男孩,8岁.眼睑水肿伴少尿、血尿4天,3周前曾患猩红热。最主要的治疗是

- A.硝苯地平
- B.糖皮质激素
- C.环磷酰胺
- D.休息、限盐饮食
- E.霉酚酸酯

69.女,28岁,妊娠20周,因腰痛、发热、尿频、尿急、尿痛而求治.检查后诊断为大肠杆菌所致的泌尿系感染,应首选

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.诺氟沙星
- D.庆大霉素
- E.头孢菌素

70.女,30岁,尿频、尿痛、腰部胀痛3天.T37.4 .此时最有助于鉴别肾盂肾炎与膀胱炎的化验检查结果是

- A.尿培养及菌落计数阳性
- B.尿涂片革兰染色发现细菌
- C.尿有蛋白及白细胞
- D.尿中有脓细胞
- E.尿常规见白细胞及白细胞管型

71.男,70岁,直肠指诊前列腺有一硬结,血清PSA 20ng/ml。为明确诊断应采取的检查方法是

- A.MRI
- B.前列腺穿刺活组织
- C.经直肠B型超声
- D.检查 CT
- E.放射性核素扫描

72.男,70岁.不慎摔倒,左髌部着地,当即左髌剧痛.体检:左下肢短缩 2cm,极度外旋畸形,达90° .提示:

- A.左髌关节前脱位
- B.左髌关节后脱位
- C.左股骨转子间骨折
- D.左股骨颈骨折
- E.骨盆骨折

添加老师微信: jyj qq666

73.男,25岁,车祸致伤.查体见肋骨挤压分离试验阳性,下腹压痛,腹肌紧张.对腹腔脏器损伤诊断最有价值的检查方法

- A.腹部B超
- B.腹部X线片
- C.腹部 CT
- D.腹部 MRI
- E.腹腔穿刺

74.男,40岁.工地高空坠落受伤,出现血压下降、腹胀、腹痛。查体见肋骨挤压和分离试验阳性、双下肢不等长、会阴部瘀斑。首先考虑的诊断是

- A.股骨颈骨折
- B.股骨干骨折
- C.髌关节脱位
- D.耻骨骨折
- E.坐骨神经受损

75.女性,24岁.在颈丛麻醉下施行了甲状腺腺瘤切除术,手术顺利.术后病人出现饮水呛咳症状,最可能的原因是

- A.喉返神经损伤
- B.喉上神经内支损伤
- C.喉上神经外支损伤
- D.喉头水肿
- E.气管塌陷

76.男,60岁.因吞咽、饮水困难2周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊.查体: 血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷.该患者考虑为

- A.中度高渗性缺水
- B.重度等渗性缺水
- C.中度低渗性缺水
- D.重度高渗性缺水
- E.重度低渗性缺水

77.女性,40岁.反复呕吐2天,因消化道溃疡、幽门梗阻入院,测得血钾为3.2mmol/L,血钠为130mmol/L,血氯为70mmol/L,最可能的情况是

- A.低钾、高钠、低氯、碱中毒
- B.低钾、低钠、低氯、酸中毒

- C. 低钾、低钠、高氯、碱中毒
- D. 低钾、低钠、低氯、碱中毒
- E. 低钾、高钠、高氯、酸中毒

78. 男, 68岁, 高血压、糖尿病史多年, 5年前曾因脑血栓住院治疗, 持续性心房颤动3年. 查体: BP150/95mmHg, 心率150次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音, 该患者抗凝治疗的目标是使凝血酶原时间国际标准化比值(INR)达到:

- A. 1.0-2.0
- B. 2.0-3.0
- C. 3.0-4.0
- D. 1.5-2.0
- E. 3.0-5.0

79. 女, 26岁, 恶心呕吐、纳差4天就诊. 风心病10年, 心房颤动史3年, 长期服洋地黄治疗, 停经3个月, 诊断为早孕. 体检: 心脏增大, 心率70次/分, 律不齐, 心尖部第一心音减弱, 可闻及3/6级收缩期杂音, 向左腋下传导并可及舒张期杂音. 胸骨左缘2-4肋间收缩期杂音, P2亢进, 心电图示心房颤动、室性早搏. 该患者恶心、呕吐的原因可能是:

- A. 妊娠反应
- B. 洋地黄中毒
- C. 右心功能不全
- D. 洋地黄不足
- E. 低血钾

80. 在诊疗过程中, 患者突然意识丧失, 全身青紫, 肢体抽搐. 血压测不到, 心音消失. 心电图QRS、T波完全消失, 代之以大小不等、极不匀齐的低小波. 该患者需立即采取的治疗措施是:

- A. 心肺复苏
- B. 同步直流电转复
- C. 非同步直流电除颤
- D. 植入永久起搏器
- E. 植入临时起搏器

81. 男, 70岁, 既往陈旧心肌梗死和糖尿病病史30年. 今晨用力蹬车拉货时突然跌倒, 呼之不应. 诊断为心脏骤停, 给该患者施行心肺复苏, 下列哪项做法不正确

- A. 胸外按压的部位是胸骨下半部, 双乳头之间
- B. 按压时关节伸直, 放松时双手不要离开胸壁
- C. 按压胸骨的幅度至少为4cm
- D. 按压和通气的比例为30: 2
- E. 如使用单相波电除颤应选择 360J

82. 男, 28岁. 突发心脏骤停, 经心肺复苏后血压60/50mmHg, 心率46次/分, 该患者应选用的药物是:

- A. 胺碘酮

- B. 受体拮抗剂
- C. 阿托品
- D. 硫酸镁
- E. 利多卡因

83. 女, 56岁. 发现血压升高2年. 近期感头痛、恶心、视力模糊, 于门诊测血压为180/140mmHg, 眼底检查发现视乳头水肿, 最可能的诊断为

- A. 脑出血
- B. 高血压脑病
- C. 恶性高血压
- D. 脑梗死
- E. 急性视盘病变

添加老师微信: jyjqq666

84. 女, 56岁. 活动后心悸、气短4年, 突发憋喘2小时来诊. 高血压病史10年余, 平时血压波动于(130—160)/(70—90) mmHg. 查体: BP 230/110mmHg, 端坐位, 双肺底可闻及少量湿啰音, 心率115次/分. 该患者最适宜的治疗是

- A. 口服阿替洛尔
- B. 口服硝苯地平
- C. 口服哌唑嗪
- D. 肌内注射利血平
- E. 静脉滴注硝普钠

85. 女, 50岁, 慢性阻塞性肺疾病10年, 近来出现胸闷咳嗽, 体检发现心尖搏动范围加大, 双下肢水肿; 患者水肿最主要的原因

- A. 肾功能不全
- B. 下肢深静脉血栓形成
- C. 心脏每搏输出量降低
- D. 下肢肌肉收缩功能障碍
- E. 血管的静脉水压增高

86. 男, 72岁, 间断发热1个月, 咯血伴进行性少尿5天, 查体: BP 165/100mmHg, 双中下肺可闻及湿性啰音, 双下肢水肿, 尿常规: RBC 40—50/HP, 蛋白(++). 血Cr 455umol/L, BUN18.5mmol/L, B超示双肾增大. ANA(-), IgG及C3颗粒性沉积. 最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎 型
- B. 急进性肾小球肾炎 型
- C. 急性肾小球肾炎
- D. IgA肾病
- E. 急进性肾小球肾炎I型

87. 男性, 20岁, 高度水肿, 尿蛋白(++), 管型少许, 血清蛋白20g/L, 血胆固醇10mmol/L, 应用泼尼松4周, 尿量增加, 水肿消退, 尿蛋白(++), 此时应用哪项措施

- A. 加用清蛋白, 泼尼松开始减量

# 临床医师资格笔试各单元考试科目及分值

## 西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	基础100、少部分其他临床部分
第二单元	循环45、泌尿35、血液25、运动20、内分泌20、风湿5
第三单元	消化80、呼吸40、其他15、传染15
第四单元	妇产70、儿科50、精神30

## 西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	消化40、循环23、精神22、呼吸20、 运动15、血液13、内分泌12、风湿5
第二单元	基础60、妇产30、儿科25、泌尿15、其他10、传染10





- B.泼尼松开始减量
- C.泼尼松原剂量继续治疗
- D.加用ACTH,泼尼松减量
- E.加用吲哚美辛,泼尼松减量

88.女,30岁.尿频、尿急、尿痛3天,无发热及腰痛,既往无类似发作.查体:双肾区无叩击痛,血WBC  $6.0 \times 10^9/L$ ,尿WBC 35-50/HP,RBC 10-15/HP,亚硝酸盐(+),该患者抗感染治疗疗程至少应为

- A.4周
- B.3天
- C.5天
- D.14天
- E.7天

89.男,40岁.会阴部不适,双侧睾丸疼痛2年.社区医院按"前列腺炎"治疗效果不明显,近期症状加重,出现血精.查体:睾丸正常,左侧附睾尾部肿大,质地偏硬,左输精管增粗,呈"串珠状"改变.直肠指检:前列腺略大,有大小不等的结节,无压痛.为协助诊断,需补充的最重要的病史是

- A.不洁性生活史
- B.泌尿系感染史
- C.附睾炎病史
- D.睾丸炎病史
- E.结核病史

90.患者,女,25岁,左腰部受伤后出现腰痛.体检:血压118/90mmHg,P75次/分,左肾区叩痛,腹膜刺激征(-).尿常规检查:RBC5-10个/HP.该患者最可能的诊断是

- A.肾挫伤
- B.肾全层裂伤
- C.肾蒂损伤
- D.肾部分裂伤
- E.自发性肾破裂

91.男,55岁.3个月来乏力、面色苍白,体重下降6kg.腹部时有隐痛.化验检查:Hb60g/L,RBC $3.1 \times 10^{12}/L$ ,WBC  $8.2 \times 10^9/L$ ,Plt  $310 \times 10^9/L$ ,外周血涂片见红细胞中心淡染区扩大.为寻找贫血的原因,首选的检查

- A.骨髓检查
- B.血清铁蛋白
- C.尿常规
- D.大便潜血试验
- E.红细胞游离原卟啉

92.女,18岁.发热伴鼻出血5日.查体:全身淋巴结肿大,皮肤散在出血斑,肝肋下2cm,脾肋下3cm,血红蛋白80g/L,白细胞 $12 \times 10^9/L$ ,血小板 $40 \times 10^9/L$ ,骨

髓增生活跃,原始细胞占0.80,过氧化物酶染色阴性,非特异性酯酶阴性.首选的治疗方案是

- A.HA
- B.DA
- C.VP
- D.CHOP
- E.MOPP

93.女,25岁.面色苍白、乏力、心悸1周.实验室检查:Hb 60g/L,WBC  $9.4 \times 10^9/L$ ,PLT  $212 \times 10^9/L$ ,网织红细胞0.12,Coombs 试验阳性.该患者首选的治疗措施是

- A.输注红细胞
- B.应用环孢素A
- C.应用硫唑嘌呤
- D.脾切除
- E.应用糖皮质激素

添加老师微信: jyjqq666

94.女,40岁.乏力疲倦3月.体检:双下肢皮肤散在出血点,浅表淋巴结无肿大.血常规:Hb80g/L,WBC $3.0 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞45%,淋巴细胞46%,单核细胞9%,PLT $39 \times 10^9/L$ .骨髓穿刺检查提示:骨髓明显增生活跃,原始粒细胞15%,未见巨核细胞.本例最可能的诊断是

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血三系均减少
- C.阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D.慢性失血性贫血
- E.骨髓增生异常综合征

95.女,35岁.因急性粒细胞白血病入院.查体:四肢皮肤多处出血点和瘀斑.化验Plt $8 \times 10^9/L$ .给予单采血小板输注.输注4小时后,患者出现胸闷、呼吸困难,血氧饱和度 $<90\%$ .急查胸部X线片可见弥散性阴影.患者最可能发生的输血不良反应是

- A.循环超负荷
- B.输血相关急性肺损伤
- C.急性溶血反应
- D.急性过敏反应
- E.细菌性感染

96.男,65岁.急性心肌梗死4周,今晨再发胸痛,持续9小时不缓解,遂来急诊.查体:BP110/60mmHg,心率100次/分,心肺检查无异常.心电图:I、aVL导联ST段弓背向上抬高.血清肌钙蛋白升高.该患者胸痛最可能的原因是

- A.心脏破裂
- B.室壁瘤形成
- C.急性心包炎

- D.再发急性心肌梗死
- E. 变异性心绞痛

97. 男, 60岁. 持续胸痛3小时, 心电图提示 、 、 aVF导联ST段抬高0.2mV, 最可能出现的心律失常是

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 房室传导阻滞
- C. 室性期前收缩
- D. 房性期前收缩
- E. 心房颤动

添加老师微信: 1ryk123

98. 女, 50岁. 劳累后心悸、气促、下肢水肿10个月. 查体: 心界向两侧扩大, 心尖区闻及2/6级收缩期杂音, 两肺底有小水泡音。超声心动图示左心腔增大, 心电图提示完全性左束支阻滞。诊断为

- A. 心包炎
- B. 扩张型心肌病
- C. 急性病毒性心肌炎
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺部感染

9. 女, 50岁, 运动时胸闷2周. 就诊门诊查: 胸骨左缘第3-4肋间可闻及粗糙的喷射性收缩期杂音。心电图

示: II、 、 AVF导联出现病理性Q波。超声心动图示室间隔流出道部分向左心室内突出, 二尖瓣前叶在收缩期向前方运动。该患者最可能的诊断是

- A. 心绞痛
- B. 心肌梗死
- C. 肥厚型心肌病
- D. 室间隔缺损
- E. 主动脉瓣狭窄

100. 女, 30岁. 风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄10年, 进行性活动耐力减低, 近1年来, 每于剧烈运动中发生晕厥。无高血压、糖尿病、高脂血症病史。查体: BP 120/70mmHg. 心率80次/分, 律齐, 主动脉瓣区可闻及收缩期喷射样杂音. 超声心动提示左心室增大, LVEF 40% 主动脉瓣口面积1.1cm<sup>2</sup>, 平均压力阶差55mmHg, 跨瓣峰速度5.4m/s. 对该患者最恰当的处置是

- A. 每日口服单硝酸异山梨酯
- B. 晕厥时硝酸甘油急救
- C. 避免竞技性运动, 其他体力活动不受限
- D. 口服阿托伐他汀
- E. 主动脉瓣置换术

### A3型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(101~102题共用题干)

男, 40岁. 性欲降低及勃起功能障碍1年, 伴头痛, 无视野缺损和视觉障碍, 无乳腺增生, 无药物服用史. 查体: 睾丸质软。实验室检查: 血清泌乳素水平700ug/L (正常<15ug/L).

101. 为进一步明确诊断应行的影像学检查

- A. CT
- B. 胸片
- C. 鞍区MRI检查
- D. PET-CT
- E. B超

102. 经检查发现蝶鞍部有一2.5×2.0×1.5cm大小的肿瘤, 位于视神经交叉下方5mm, 并延伸进入双侧海绵窦. 最佳的处理措施为

- A. 开颅手术切除肿瘤
- B. 口服溴隐亭
- C. 经蝶窦手术切除肿瘤
- D. 放射治疗

E. 定期复查垂体MRI

(103~104题共用题干)

男, 45岁, 糖尿病10年, 每日皮下注射人混合胰岛素治疗, 早餐前30U, 晚餐前24U, 每日进餐规律, 主食量300g. 近来查空腹血糖12.5mmol/L, 餐后血糖7.6-9.0mmol/L:

103. 确定空腹高血糖的原因, 最有意义的检查

- A. 多次测定空腹血糖
- B. 多次测定餐后血糖
- C. 测定糖化血红蛋白
- D. 夜间血糖监测
- E. 口服葡萄糖耐量试验

104. 空腹高血糖最有可能的原因

- A. Somogyi效应或黎明现象
- B. 存在胰岛素抵抗
- C. 未加口服降糖药物
- D. 餐后血糖控制不佳
- E. 晚餐碳水化合物摄入过多

(105~106题共用题干)

男,27岁,腰背部疼痛10年,清晨为重,活动后可缓解.近来疼痛症状加重,活动受限.查体: 腰椎前屈、后伸受限,Schober 试验阳性,双侧"4"字试验阳性。

105.最有可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 痛风关节炎
- C. 风湿性多肌炎
- D. 化脓性关节炎
- E. 强直性脊柱炎

106.对该病诊断最有价值的检查是

- A. 类风湿因子
- B. 骶髂关节X线片
- C. 抗CCP抗体
- D. 右膝关节X片
- E. HLA-B27

(107~108题共用题干)

男,45岁.无痛性肉眼血尿3个月,IVP 见左肾盂内有不规则充盈缺损,膀胱镜检见左侧输尿管口喷血,应首先考虑

107.应考虑

- A. 肾结核
- B. 肾癌
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾盂癌
- E. 肾炎

108.肾盂癌手术切除范围是

- A. 患肾+同侧上段输尿管
- B. 患肾+同侧中段输尿管
- C. 患肾+同侧下段输尿管
- D. 患肾
- E. 患肾+同侧全长输尿管

(109~110题共用题干)

男,78岁.腰骶部疼痛2个月.直肠指检前列腺增大,有结节,质地坚硬且侵犯直肠.血清PSA 80.6ng/ml前列腺穿刺活检诊断前列腺癌.放射性核素骨显像见腰椎转移病灶。

109.者临床分期为

- A. T1期
- B. T2a期
- C. T2b期
- D. T3期
- E. T4期

110.应选择的最佳治疗方法是

- A. 根治性前列腺切除+内分泌治疗

B. 根治性前列腺切除术

C. 观察,对症处理

D. 双侧睾丸切除术

E. 药物去势+抗雄激素制剂

添加老师微信: jyj qq666

(11~114题共用题干)

女,80岁.陈旧性广泛下壁心肌梗死6年,活动后胸闷、心悸、气短2年,近2周出现夜间阵发性呼吸困难.体检: 端坐呼吸,血压165/90mmHg,脉搏118次/分.P2亢进,心脏各瓣膜区未闻及杂音.双肺底可闻及细湿啰音,双肺散在哮鸣音.腹平软,肝脾肋下未触及,双下肢无水肿.空腹血糖5.2mmol/L.心电图: 导联ST段压低0.05—0.1mV,血清肌钙蛋白正常.

11.该患者目前最可能的诊断是

- A. 气道梗阻
- B. 肺动脉栓塞
- C. 心绞痛
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性左心衰竭

112.该患者暂不宜立即使用的药物是

- A. 西地兰
- B. 卡维地洛
- C. 氨茶碱
- D. 硝酸甘油
- E. 速尿

113.该患者心功能分级为

- A. Killip分级 II级
- B. Killip分级 I级
- C. Killip分级 级
- D. NYHA分级 级
- E. NYHA分级 级

114.该患者血压控制目标至少是

- A. 160/90mmHg
- B. 120/80mmHg
- C. 140/90mmHg
- D. 130/80mmHg
- E. 100/70mmHg

(115~118题共用题干)

女,78岁.早晨排便时突然跌倒,意识丧失,呼吸断续.既往有陈旧性心肌梗死和糖尿病30年,无高血压病史诊断为心脏骤停。

115.该患者既往超声心动图检查未发现异常,其心脏骤停最可能的原因是

- A. 急性心肌梗死
- B. 主动脉夹层

- C. 预激综合征
- D. 急性心肌炎
- E. 梗阻性肥厚型心肌病

116. 心电图示心搏停顿此时首选的药物是

- A. 胺碘酮
- B. 肾上腺素
- C. 普罗帕酮
- D. 硝酸甘油
- E. 复方丹参滴丸

117. 最佳的给药途径是

- A. 肌肉注射
- B. 心内注射
- C. 静脉注射
- D. 气管内给药
- E. 肌肉注射

118. 患者复苏成功后治疗, 保证一切复苏措施奏效最重要的是

- A. 脑复苏
- B. 确保循环功能稳定
- C. 防治肾功能衰竭
- D. 防治感染
- E. 维持良好的呼吸功能

(119~122题共用题干)

男, 40岁. 反复发作腰痛伴右下肢放射痛, 与劳累有关, 咳嗽、用力排便时可加重疼痛。查体: 右直腿抬高试验40°阳性, 加强试验阳性。X线片示: L4—5椎间隙变窄。

119. 其最可能的诊断为

- A. 急性腰扭伤
- B. 腰3横突综合征
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 骨关节结核

120. 其右下肢麻木的区域可能为

- A. 小腿外侧或足内侧
- B. 大腿前侧
- C. 小腿前内侧
- D. 小腿后侧及足底
- E. 大腿内侧

121. 对诊断有定位、定性意义的检查方法是

- A. X线片
- B. CT
- C. ECT
- D. 肌电图
- E. 脑脊液检查

122. 如果病史3年, 并逐年加重, 已出现尿便障碍. 其治疗方法是

- A. 物理治疗
- B. 按摩
- C. 牵引
- D. 化学治疗
- E. 手术

(123~125题共用题干)

患儿女, 9岁. 左膝肿痛, 急骤加重, 活动剧痛, 伴有高热。检查左膝关节明显红、肿、热及压痛。X线片示关节间隙增宽,

123. 其诊断首先应考虑为

- A. 膝关节结核
- B. 风湿性关节炎
- C. 类风湿性关节炎
- D. 化脓性关节炎
- E. 骨髓瘤

124. 为早期确诊, 最有价值的方法是

- A. X线片
- B. CT
- C. MRI
- D. 关节液检查
- E. 血常规

添加老师微信: jyjqq666

125. 本例最佳的治疗方案

- A. 全身使用抗生素
- B. 合理有效的抗生素加石膏固定
- C. 足量有效抗生素加支持疗法
- D. 足量有效抗生素加关节切开引流
- E. 足量有效抗生素加关节穿刺抽液并注入抗生素

(126~128题共用题干)

男, 70岁. 乏力, 腰痛半个月. 既往体健. 查体: 轻度贫血貌, 第2-4腰部压痛, 实验室检查, Hb 80g/L, WBC  $5.6 \times 10^9/L$ , Plt  $156 \times 10^9/L$ , 血清总蛋白108g/L, 白蛋白30g/L, 血清肌酐175 $\mu\text{mol/L}$ , 骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占0.45, 腰椎X线片示第二腰椎压缩性骨折。

126. 为进一步明确诊断, 下一步最需做的检查是

- A. 血清 2微球蛋白测定
- B. 尿本-周蛋白测定
- C. 尿常规
- D. 血清钙测定
- E. 血、尿免疫球蛋白测定

127. 根据目前的临床资料及 Durieh-Salmon临床分期标准, 该患者最可能的临床分期是

- A. 期B组
- B. 期A组
- C. I期B组
- D. 期B组
- E. 期A组

128. 该患者疾病最可能的类型是

- A. 不分泌型
- B. IgG型
- C. 轻链型
- D. IgE型
- E. IgD型

## B型题

### 答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑，每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(129~132题共用备选选项)

- A. 抗 Sm抗体
- B. 抗RNP抗体
- C. 抗dsDNA抗体
- D. 抗 SSA抗体
- E. 抗ANA抗体

129. 系统性红斑狼疮发生雷诺现象相关的是

130. 诊断系统性红斑狼疮最有价值自身抗体是

131. SLE疾病活动性、肾损害有关检测指标是

132. 系统性红斑狼疮光过敏相关的自身抗体是

(133~135题共用备选选项)

- A. 放射碘治疗
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 甲硫氧嘧啶
- D. 普萘洛尔
- E. 手术

133. 支气管哮喘病史的原发性甲亢患者禁用

134. 治疗甲状腺危象时首选

135. 妊娠甲亢的治疗首选

(136~137题共用备选选项)

- A. 酚苄明
- B. 氨苯蝶啶
- C. 螺内酯
- D. 普萘诺尔
- E. 利多卡因

136. 原发性醛固酮增多症术前药物准备首选

137. 嗜铬细胞瘤术前药物准备首选

(138~141题共用备选选项)

- A. 血管损伤
- B. 神经损伤
- C. 骨折延迟愈合
- D. 骨筋膜室综合征

E. 急性骨萎缩

138. 胫骨上1/3骨折易导致

139. 胫骨中1/3骨折易导致

140. 胫骨中、下1/3骨折易导致

141. 腓骨颈的骨折易导致

(142~144题共用备选选项)

A. 骨囊肿

B. 骨巨细胞瘤

C. 骨软骨瘤

D. 骨肉瘤

E. 尤文肉瘤

142. X线显示日光放射状骨膜反应的疾病是

143. X线显示干骺端圆形边界清楚的透亮区，骨皮质变薄，无骨膜反应的疾病是添加老师微信：jyjqq666

144. X线呈葱皮现象的疾病是

(145~146题共用备选选项)

A. 非特异性酯酶染色阳性，可被NaF抑制

B. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高

C. Ph染色体阳性

D. Ph 染色体阴性

E. 骨髓细胞内可见 Auer 小体

145. 慢性粒细胞性白血病可见

146. 类白血病样反应可见

(147~148题共用备选选项)

A. 无痛性肉眼血尿

B. 终末血尿伴膀胱刺激症状

C. 排尿突然停止

D. 血尿+蛋白尿

E. 疼痛伴血尿

147. 泌尿系肿瘤血尿是

148. 泌尿系结石血尿是

(149~150题共用备选选项)

- A. 桑椹状
- B. 鹿角状
- C. 三角形
- D. 颗粒状

E. 蜡样

149. 草酸钙结石呈

150. 胱氨酸结石呈

